

## 2023 年临床执业第三单元考生回忆真题试卷

温馨提示:

题目源自考生回忆,内容的进一步完善还需要大家的积极参与,若有不同建议及补充请联系身边的金英杰老师,我们会根据大家的反馈综合评估后进行实时修订,祝大家顺利拿证!

1.抑郁自评量表是

- A.SDS
- BSAS
- C.MHT
- D.BDI
- E.HAMA

2.为了诊断胃癌患者的临床分期,首选的检查手段是

- A.PET-CT
- B.腹部增强 CT
- C.腹腔镜探查
- D.上消化道 X 线剂造影
- E.内镜超声

3.导致抗利尿激素分泌异常的肺癌类型是

- A.肉瘤样癌
- B.小细胞癌
- C.大细胞癌
- D.腺癌
- E.鳞癌

4.慢性阻塞性肺疾病最核心的特征是

- A.长期大量吸烟史
- B.气流持续受限
- C.受季节相关的症状反复发作
- D.慢性咳嗽、咳痰症状
- E.小气道功能障碍

5.全身性感染的治疗原则是

- A.应用广谱抗生素
- B.病理生化确诊后,再定项抗生素治疗
- C.抗生素联合糖皮质激素治疗
- D.细菌培养和药敏试验后治疗
- E.早期大量联合用药

6.肺动脉高压的诊断标准是

- A.静息状态下右心导管测量平均肺动脉压 $\geq 25\text{mmHg}$
- B.静息状态下超声心动测量平均肺动脉压 $\geq 25\text{mmHg}$
- C.静息状态下右心导管测量平均肺动脉压 $\geq 30\text{mmHg}$
- D.静息状态下超声心动测量平均肺动脉压 $\geq 30\text{mmHg}$
- E.静息状态下超声心动测量收缩期肺动脉压 $\geq 25\text{mmHg}$

7.下列关于消化性溃疡出血,说法正确的是

- A.生命体征平稳后行胃镜检查  
B.口服 PPI  
C.药物治疗无效行手术治疗  
D.出血时一般无明显腹痛  
E.胃溃疡一般比十二指肠溃疡容易发生
- 8.与强直性脊柱炎密切相关的遗传基因是  
A.HLA-DR2  
B.HLA-B27  
C.HLA-DR3  
D.HLA-DR4  
E. E.HLA-DR5
- 9.长期内痔患者肛门有肿块脱出，用手不能回纳，为几期  
A.I 期  
B.II 期  
C.III 期  
D.IV 期  
E.V 期
- 10.支气管哮喘早期发作时的血气改变是  
A.pH 值上升，PaO<sub>2</sub> 下降，PaCO<sub>2</sub> 下降  
B.pH 值上升，PaO<sub>2</sub> 下降，PaCO<sub>2</sub> 上升  
C.pH 值下降，PaO<sub>2</sub> 下降，PaCO<sub>2</sub> 下降  
D.pH 值下降，PaO<sub>2</sub> 下降，PaCO<sub>2</sub> 上升  
E.pH 值正常，PaO<sub>2</sub> 下降，PaCO<sub>2</sub> 上升
- 11.下列哪项不是急性胰腺炎手术指征  
A.直接胆红素进行性升高伴寒战高热  
B.合并大出血或假性囊肿  
C.急性腹膜炎不能排除其他急腹症  
D.血清淀粉酶>500U/L  
E.胰腺及胰周组织坏死发感染
- 12.关于判断胃食管反流病患者的症状与病理生理改变的相关检查是  
A.胃镜  
B.食管测压  
C.动态心电图  
D.24h 食管 pH 值检测  
E.上消化道 X 线钡剂检查
- 13.下列属于原发性腹膜炎的是  
A.胆管吻合术漏  
B.女性生殖道细菌上行感染  
C.小肠穿孔  
D.胃溃疡穿孔  
E.结肠穿孔
- 14.胃十二直肠溃疡穿孔首选检查是

A.立位 X 线腹平片

B.B 超

C.增强 CT

D.胃镜

E.PETCT

15.甲状腺癌颈部淋巴结最小的清扫范围是

A.VI

B.II

C.III

D.IV

E.V

16.急性上呼吸道感染患者拟行腹腔镜胆囊切除术，手术需延期至急性上呼吸道感染症状恢复后

A.5-7 天

B.14-21 天

C.7-14 天

D.1-3 天

E.3-5 天

17.目前常用于诊断支气管扩张的检查

A.肺功能

B.支气管镜

C.高分辨 CT

D.胸部 X 线

E.B 超

18.不属于乳腺癌高危因素的是

A.绝经年龄早

B.产后未哺乳

C.肥胖

D.一级亲属乳腺癌家族史

E.BRCA 基因突变

19.重度溃疡性结肠炎首选治疗

A.糖皮质激素

B.硫唑嘌呤

C.英夫利昔单抗

D.环孢素

E.大量抗生素

20.对于明确肺结核是否有传染性最有帮助的事

A.γ-干扰素释放试验

B.痰涂片抗酸染色

C.结核菌素试验

D.胸部 CT

E.抗结核抗体

- 21.肝硬化贲门周围血管断流术不包括哪个血管
- A.胃网膜左静脉
  - B.胃后静脉
  - C.左膈下静脉
  - D.冠状静脉
  - E.胃短静脉
- 22.结直肠中最常见的非肿瘤性息肉是
- A.增生性息肉
  - B.错构瘤性息肉
  - C.化生性息肉
  - D.炎性息肉
  - E.腺瘤性息肉
- 23.采取非手术方法治疗急性消化性溃疡穿孔时，错误的是
- A.静脉输液
  - B.胃肠减压
  - C.糖皮质激素
  - D.质子泵抑制剂
  - E.抗生素抗感染
- 24.功能性消化不良定义
- A.症状 12 个月，连续 3 个月
  - B.症状 6 个月，连续 2 个月
  - C.症状 12 个月，连续 2 个月
  - D.症状 6 个月，连续 3 个月
  - E.症状 12 个月
- 25.哪个部位的溃疡应特别注意卓艾综合征
- A.胃窦部
  - B.幽门部
  - C.十二指肠球部
  - D.十二指肠降部
  - E.回肠部
- 26.关于电烧伤，下列说法正确的是
- A.入口处较出口处损伤重
  - B.为局部损害
  - C.伤后坏死范围一般不会再扩大
  - D.局部渗出较一般烧伤轻
  - E.有明显坏死层面
- 27.甲状腺结节，纵横比 $>1$ ，有丰富血流信号，可能为哪种病理类型
- A.未分化癌
  - B.乳头状癌
  - C.滤泡状癌
  - D.髓样癌
  - E.低分化癌
- 28.继病因后肝硬化患者的肝功能异常的原因
- A.营养不良

- B.对激素灭活增加  
C.侧支循环形成  
D.脾功能亢进  
E.门静脉高压
- 29.食管胃底静脉曲张行手术治疗，需切断的血管不包括  
A.胃左静脉  
B.胃短静脉  
C.胃后静脉  
D.左下静脉  
E.脾静脉
- 30.属于慢性肛裂特点的是  
A.有弹性  
B.肉芽灰白  
C.无疤痕形成  
D.底部浅  
E.边缘整齐
- 31.烧骨下三分之一骨折合并尺骨小头脱位  
A.蒙氏骨折  
B.盖氏骨折  
C.Colles 骨折  
D.Smith 骨折  
E.尺骨骨折
- 32.男，14岁。午餐进食海鱼后，即出现头痛、头晕、胸闷、心跳呼吸加快，伴有眼结膜充血。颜面部及全身潮红，测体温正常，无呕吐、腹泻等症状。患者最可能是  
A.河豚鱼中毒  
B.肉毒梭菌毒素中毒  
C.麻痹性贝类中毒  
D.组胺中毒  
E.副溶血性弧菌中毒
- 33.女性，40岁，既往体健。突发胸痛肺压缩30%，经胸腔穿刺后肺压缩仍为30%。接下来应怎样治疗  
A.胸腔穿刺  
B.胸膜固定术  
C.胸腔闭式引流  
D.手术  
E.心包穿刺
- 34.女，28岁，孕28周，体温38.5度。转移性右下腹痛，有腹膜刺激征。下一步处理是  
A.剖腹产+阑尾切除术  
B.引产+阑尾炎手术  
C.抗生素  
D.急诊阑尾切除术  
E.保守治疗
- 35.女，54岁，腹痛腹胀低热2月，查体腹软，脐周压痛。B超示中等量腹水，腹水ADA65U/L。下列最有助于诊断的检查是

A.结肠镜

B. $\gamma$ -干扰素释放实验

C.腹部 CT

D.血沉

E.腹水

36.男性, 39 岁, 右上腹痛伴发热 1 天, 查体:T39.8°C, P105 次/分 BP85/55mmhg, 肝区叩诊+, B 超示胆囊多发结石, 胆总管直径 1.6cm, 肝总管下段有强回声光团伴声影, 以下最适宜的治疗是

A 急诊行开腹胆囊切除术

B.急诊行胆总管切开, T 管引流术

C.积极抗休克治疗, 禁食抗感染

D.急诊行腹腔镜胆囊切除术

E.积极抗休克治疗, 缓解后择期手术

37.患者胸痛、反酸 3 年, 加重伴干咳 3 天, 查体未见异常, 心电图、胸部 CT 未见异常。患者应用什么药物

A.硝酸甘油

B.倍氯米松

C.半托拉

D.硝苯地平

E.氢氯噻嗪

38.某一神经科医生在给学生上课时突然晕倒, 抽搐, 学生手足无措, 十几秒后老师跟学生解释他表演癫痫典型症状, 学生印象深刻, 该记忆方式是

A.有意识记

B.无意识记

C.机械识记

D.理解识记

E.形象识记

39.男, 40 岁。体重 60kg, 右上肢肩关节以下右下肢膝关节以下烧伤, 深度为浅 I 度至深 II 度, 右足部烧伤深度为 II 度。该患者第一个 24 小时的补液量应为

A.2500ml

B.1800m

C.2000ml

D.3700ml

E.4300ml

40.男, 50 岁。头晕、乏力伴腰痛 3 个月。血常规: Hb72g/L, WBC $6.4 \times 10^9$ /L, PLt $125 \times 10^9$ /L, ESR106mm/h, 血清蛋白电泳见 M 蛋白带。尿蛋白(+).骨髓细胞学检查:幼稚浆细胞占 0.42。腰椎 X 线检查见第 2、3 椎体压缩性骨折。最可能的诊断是

A 反应性浆细胞增多症

B.多发性骨髓瘤

C.慢性肾小球肾炎

D.骨转移癌

E.霍奇金淋巴瘤

41.男, 44 岁, 右下肢清创缝合术后 6 天, 发热疼痛 2 天。查体:见伤口处红肿, 少量红色液, 缝合处张力高, 最可能感染的细菌是

- A.破伤风
- B.厌氧菌
- C.溶血菌
- D.金葡菌
- E.链球菌

42.女, 35 岁, 因发热, 呕吐头疼 3 天入院, 查体:面色潮红, 腋下出血点, 尿常规有蛋白尿, 酱油色尿液, 血常规 WBC $23 \times 10^9/L$ , 异形淋巴细胞 0.12, PLT $48 \times 10^9/L$ , 该患者的诊断可能是

- A.流行性脑脊髓膜炎
- B.伤寒
- C.流行性出血热
- D.败血症
- E.钩端螺旋体病

43.男, 65 岁。间歇性乏力、腹胀 3 年, 加重 2 个月。限盐利尿治疗后腹胀无明显缓解。查体:T $36.8^{\circ}C$  BP $120/80mmHg$ 。巩膜黄染, 可见肝掌、蜘蛛痣。腹膨隆, 无压痛, 肝脾肋下未及, 移动性浊音阳性。双下肢可见非凹陷性水肿。血清白蛋白  $19g/L$ , 血钾  $3.7mmol/L$ , 血钠  $136mmol/L$ 。接下来最为恰当的治疗措施是

- A.腹腔置管持续引流腹腔积液
- B.静脉输注白蛋白后利尿
- C.继续利尿限盐
- D.腹水培养, 用敏感抗生素
- E.经颈静脉肝内门腔分流术

44.男子肛周红肿热痛, 查体: T $38^{\circ}C$  肛周红肿, 选用以下那种治疗

- A.局部理疗缓解
- B.抽吸脓肿
- C.切开脓肿
- D.抗生素治疗
- E.温水坐浴

45.男, 40 岁, 头痛伴视物模糊 3 个月在大便中发现虫卵, 喜食生肉, 此时眼底检查发现视乳头水肿, 最可能的诊断是

- A.病毒性脑膜炎
- B.脑囊虫病
- C.结核性脑膜炎
- D.脑肿瘤
- E.疟疾

46.患者有脓血便病史, X 线剂造影显示结肠多发病变, 后症状加重, 出现低血钾, 诊断考虑为

- A.肠结核
- B.直肠癌
- C.溃疡性结肠炎合并中毒性巨结肠
- D.肠易激综合症
- E.肠梗阻

47.女, 50 岁, 月经不规则 2 年余, 阴道不规则流血 20 天, 查体贫血貌, 子宫稍大, 无压痛,

稍软，为明确诊断，应选择的检查是

- A. 盆腔 CT
- B. 尿 HCG 测定
- C. 分段诊刮
- D. 盆腔 B 超
- E. 阴道镜检查

48. 女，25 岁，发现右乳肿块两年。无乳房红肿，疼痛，乳头溢液，无发热。查体：双乳外观无明显异常，右乳外上象限可触及大小 2.0cmx1.5cm 肿块，质地中等，光滑，活动，边界清楚。应如何治疗

- A. 局部理疗
- B. 密切观察
- C. 针灸治疗
- D. 手术切除
- E. 中药逍遥散

49. 男性，34 岁，肛门周围反复疼痛，红肿、流脓 5 个月，查体：缘 3cm 处有一直径 1cm 硬结，按压可有脓液流出，沿硬结往里可触及一条索物，延伸至肛管内 3cm，该病诊断为

- A. 皮脂腺囊肿
- B. 外痔
- C. 肛管癌
- D. 肛瘘
- E. 肛裂

50. 患者女性，16 岁，甲状腺 III 度肿大，甲状腺摄碘率 2 小时 15%，24 小时 35% 可能的疾病是

- A. 甲状腺功能减退
- B. 甲状腺功能亢进
- C. 桥本甲状腺炎
- D. 生理性甲状腺肿
- E. 结节性甲状腺肿

51. 女，35 岁，双手关节反复肿痛 1 年余。辅助检查：蛋白尿 (++)，抗 ds-DNA 抗体 (+)，补体 C3 下降。下面说法不正确的是

- A. 病情好转后可以继续妊娠
- B. 出现癫痫等脑部表现提示预后不良
- C. 肾活检可以判断预后
- D. 可以使用轻氯喹
- E. 会导致关节畸形

52. 男性，48 岁，右上腹胀痛 4 月，伴乏力，无恶心、呕吐、发热，自发病以来，尿色稍黄，既往饮白酒 10 年余约 150-200ml/d。查体：精神差巩膜轻度黄染，无肝掌、蜘蛛痣，心肺无异常，腹软，无压痛，肝脾未触及，移动性浊音 (-)，实验室检查 ALT35, AST25, HBsAg (-) 抗 HCV(-)，B 超：肝实质回声弥漫密集增强，远场回声明显衰减，最适宜的治疗是

- A. 泼尼松治疗
- B. 营养支持
- C. 抗肝纤维化治疗
- D. 戒酒
- E. 保肝药物治疗



53.男性，体温 39.1℃，心率 109 次/分咳嗽咳痰，CT 见液平，入院后予头孢联合峰诺酮抗感染，停药的指征是

- A.胸片恢复正常
- B.咳嗽咳痰症状消失
- C.血氧饱和度恢复正常
- D.体温恢复正常
- E.血常规正常

54.女，30 岁，阑尾切除术后 6 天，大量进食后面色苍白，烦躁气急，上腹饱胀呕吐胃内容物，既往消化性溃疡病史 6 年，查体:上腹膨隆，轻压痛，无反跳痛，粪隐血 (-)，最简单有效的处理措施是

- A.针灸理疗
- B.肌肉注射新斯的明
- C.应用广谱抗生素
- D.局部热敷
- E.胃肠减压

55.女，75 岁，咯血 10 天，每日咯血量约 20ml，既往发作两次，抗感染治疗后好转。患者肺 CT 如下所示，目前首选的治疗是

- A.手术治疗
- B.止血药物
- C.抗感染治疗
- D.肺动脉栓塞
- E.垂体后叶素

56.育龄期女性，产后 4 周，一直母乳喂养，乳房出现红肿，表面皮温升高，无波动感，以下处理首选

- A.切开引流
- B.立即停止哺乳
- C.立即使用抗生素
- D.热敷，按压乳房，促进乳汁排出
- E.等待药敏结果出来后再行抗生素治疗

57.男，35，上腹部不适，乏力，显瘦 3 年，查 Hb80g/L，胃泌素 80pg/ml，消化道造影示胃小弯侧 2.5cm 龛影，胃活动差。考虑诊断是

- A.胃溃疡
- B.早期胃癌
- C.复合型溃疡
- D.胃癌
- E.胃泌素瘤

58.女，32 岁。急性阑尾炎阑尾切除术后 5 天，体温升高至 39℃，大便频繁伴里急后重，黏液便，量少。查体:切口愈合可，无红肿，未触及明显压痛及里急后重。可能的原因是

- A.溃疡性结肠炎
- B.伪膜性肠炎
- C.阑尾残株炎
- D.盆腔脓肿
- E.粪瘘

59.患者，女性，28 岁，关节疼痛 1 年易脱发半年就诊。ESR110mm/1h，抗“O”正常，Hb86g/L，

PLT70X10<sup>9</sup>/L,ANA 呈颗粒型阳性,尿蛋白(+++),确诊为 SLE,在估计其预后方面,下列哪项说法不正确

- A.若合并妊娠出现下肢肿胀提示血栓形成
- B.肾脏病变是增殖型表现者,预后不良
- C.非缓解期妊娠可加重病情,应避免
- D.反复发作关节炎引起关节畸形和关节周围肌肉萎缩
- E.反复癫痫发作及器质性脑病表现者预后不良

60.女,27岁,确诊系统性红斑狼疮2年,妊娠28周。一周前检查:Hb109g/L,PLT209X10<sup>9</sup>/L。患者可以使用的药物是

- A.甲氨蝶呤
- B.环磷酰胺
- C.轻氯峰
- D.来氟米特
- E.大剂量糖皮质激素

61.男,70岁,左腹股沟包块1年,包块圆形,大小5X4cm,平躺消失,按住包块口深环,咳嗽后仍可突出,该包块可能为

- A.脂肪瘤
- B.腹股沟斜疝
- C.腹股沟直疝
- D.股疝
- E.精索鞘膜积液

62.男,25岁,因车祸伤致肝破裂腹腔出血,失血性休克,经急诊手术后,腹腔出血得到控制,并给予充分补液。但患者中心静脉压5cmH<sub>2</sub>O,血压90/60mmHg,并没有得到改善,接下来的处理是

- A.继续补液
- B.补液试验
- C.给予强心剂
- D.给予血管扩张剂
- E.给予糖皮质激素

63.男,23岁,外伤病人,左大腿被柴刀砍伤,8小时后送医院急诊,检查:左大腿外侧间长5cm,深1cm的伤口,边缘尚整齐,伤口内沾有较多泥土。最佳的处理是

- A.清创后一期缝合
- B.清创后延期缝合
- C.酒精消毒后缝合
- D.清创后等待自然愈合
- E.肥皂水清洗伤口

64.老年男性,体重减轻2kg,指检距肛门8cm处有一直径3cm肿块,结肠镜检查见距离肛门8-10cm处约3cm菜花样肿块,问此人首选治疗方法

- A.Miles术
- B.Dixon术
- C.Hartmann术
- D.请等待更新
- E.请等待更新

65.男,17岁。胸痛、气短2小时。2小时前,患者大笑后突发胸痛、气短,有少量咳嗽,

无发热。查体:左侧胸廓饱满,左肺叩诊鼓音,左肺呼吸音低,无罗音。心率 101 次/分,心电图示窦性心动过速最可能的诊断是

- A.自发性气胸
- B.肺栓塞
- C.支气管哮喘急性发作
- D.肺气肿
- E.急性心肌梗死

66.男,33岁,右上腹胀痛伴寒战、高热6小时。查体:T39.9℃,皮肤黏膜无黄染,右上腹压痛,轻度及紧张,无明显反跳痛。WBC $18 \times 10^9$ ,N0.85,腹部立位平片,右侧膈肌抬高。B超:肝右后下方可见8cm液性暗区。以下最有价值的检查

- A.肝核素扫描
- B.腹部CT
- C.肝动静脉造影
- D.超声下肝穿刺
- E.血培养

67.男,42岁,腹痛腹胀肛门停止排气排便2天,进行禁食补液治疗,近几天腹痛加重入院,既往有阑尾炎手术史,应进行

- A.空气通便
- B.手术探查
- C.持续性胃肠减压
- D.补液
- E.禁食

68.女,28岁,2周前因接触冷空气出现干咳,喘息,无发热,自服头孢类抗菌素无效。为明确诊断,应进一步做的检查

- A.支气管激发试验
- B.动脉血气分析
- C.特异性变应原检测
- D.嗜酸性粒细胞检测
- E.呼出气NO(FeNO)检测

69.男,23岁,右下腹痛,腹泻,消瘦5年,既往有肛瘘史,肠镜回示:回盲部充血、水肿,呈鹅卵石样改变,伴多发纵行溃疡,最有可能的是

- A.肠结核
- B.阿米巴肠炎
- C.缺血性肠病
- D.克罗恩病
- E.溃疡性结肠炎

70.男性2岁,哭闹、腹痛18天,果酱样大便2次,查体:右上腹触及“腊肠样”包块,轻微压痛,右下腹空虚,肠鸣音亢进。腹部B超:右上腹包块为“靶环征”。最佳诊断为

- A.急性阑尾炎
- B.基因肠系膜淋巴结炎
- C.小肠扭转
- D.肠套叠
- E.肠蛔虫

71.小儿患者,剧烈咳嗽,肌肉酸痛,宜用下列哪种药物治疗

- A.链霉素
- B.庆大霉素
- C.青霉素
- D.阿奇霉素
- E.异烟肼

72.男, 54 岁, 咳嗽伴间断低热半年, 胸部 ct 示: 右上肺, 多发小斑片状高密度影, 伴少许空洞, 右肺上叶体积减小, 最可能诊断是

- A.肺癌
- B.肺血管炎
- C.慢性肺脓肿
- D.肺结核
- E.肺结节

73.患者腹部手术行蛛网膜下腔麻醉后无不适, 意识清晰, 切口少许液体渗出采取什么体位

- A.低半坐位
- B.高半坐位
- C.15-30°头高脚低位
- D.下肢抬高 15-20°, 头部和躯干抬高 20-30°
- E.平卧位

74.女, 55, )反复腹痛, 乏力, 既往有乙肝病史 30 年。查体: 神志清, 肝肋下 3cm, 腹部移动性阴性。实验室: 总胆红素 30umol/L, ALB20g/L, PT19.1, B 超:肝右前叶见 4cmx3cm, 实性, 该如何治疗

- A.化疗
- B.动脉栓塞
- C.靶向治疗
- D.手术
- E.无水乙醇注射

75.男, 28 岁, 上腹胀痛不适, 伴恶心呕吐 2 天, 呕吐物为酸臭味的宿食, 进食后缓解, 常受凉后易发。该症状病因是

- A.胃角溃疡
- B.食管溃疡
- C.十二指肠降部溃疡
- D.胃体溃疡
- E.十二指肠球部溃疡

76.男, 40 岁, 腹胀 呕吐三天, 呕吐物为宿食, 既往十二指肠溃疡病史 10 年, 为纠正患者可能存在的水电解质代谢紊乱和酸碱平衡失调。应适用的液体是

- A.生理盐水
- B.5%葡萄糖盐水
- C.1.86%乳酸钠溶液+5%葡萄糖盐水
- D.10%氯化钾+5%葡萄糖盐水
- E.5%碳酸氢钠

77.男, 42 岁, 腹痛, 腹胀伴肛门停止排气排便 2 天。禁食, 补液治疗, 今晨突发腹痛加剧。既往行阑尾切除术 10 年余查体:全腹压痛, 反跳痛, 肌紧张, 肠鸣音消失。最好的处理方法是

- A.手术探查

- B.持续性胃肠减压
- C.解痉药物治疗
- D.足量抗生素
- E.空气灌肠

78.患者车祸后 4 小时，出现剧烈腹痛，查体：T36.8，P89 次/分 BP124/85mmHg，腹部有压痛、反跳痛。血淀粉酶 1200u/l。腹部立位平片未见明显异常。腹部 B 超示右侧腹部少量腹腔积液。最可能是哪个器官损伤

- A 肝破
- B.脾破裂
- C.胰腺破裂
- D.结肠破裂
- E.请等待更新

79.患者车祸后 4 小时，出现剧烈腹痛，查体：T36.8，P89 次/分 BP124/85mmHg，腹部有压痛、反跳痛。血淀粉酶 1200u/l。腹部立位平片未见明显异常。腹部 B 超示右侧腹部少量腹腔积液。接下来还要做什么检查

- A.开腹探查
- B.诊断性腹腔穿刺
- C 腹部 CT
- D.腹腔镜探查
- E.腹部 B 超

80.女 32 岁，4 小时前进食较多油腻食物导致突发持续上腹痛，伴呕吐进食物。查体：痛苦面容，巩膜无黄染，心肺查体无异常，腹软，左上腹压痛，无反跳痛，心肺查体未见异常，murphy (-)，肠鸣音 2 次/min。可考虑诊断

- A.急性胰腺炎
- B.急性胆囊炎
- C.急性阑尾炎
- D.心肌梗死
- E.胃溃疡

81.女 32 岁，4 小时前进食较多油腻食物导致突发持续上腹痛，伴呕吐进食物。查体：痛苦面容，巩膜无黄染，心肺查体无异常，腹软，左上腹压痛，无反跳痛，心肺查体未见异常，murphy (-)，肠鸣音 2 次/min。为确诊可行下列哪项检查

- A.立位腹平片
- B.腹部增强 CT
- C.心电图
- D.胃镜
- E.结肠镜

82.男，35 岁，低热一月余，咳嗽，痰中带血 3 天。2 年前患胸膜炎，经治疗后好转。胸片：左肺不规则阴影，左侧肋膈角变钝。血 WBC8.0x10<sup>9</sup>/L，NO.78ESR30mm/h。为明确诊断首选检查

- A.胸部 CT
- B.痰涂片抗酸染色
- C.支气管镜
- D.V-干扰素释放实验
- E.血清肿瘤标志物

83.男, 35 岁, 低热一月余, 咳嗽, 痰中带血 3 天。2 年前患胸膜炎, 经治疗后好转。胸片: 左肺不规则阴影, 左侧肋膈角变钝。血 WBC $8.0 \times 10^9/L$ , NO.78ESR30mm/h。为明确治疗方案, 需重点了解的情况是

- A.胸膜炎治疗情况
- B.家族遗传史
- C.青霉素过敏史
- D.体重变化情况
- E.此前健康体检情况

84.女, 44 岁。因右乳腺癌行改良根治术。术后病理:右乳浸润性癌, 非特殊型, 肿瘤大小 3cmx2cm, 组织学 II 级, ER80%强阳, PR90%强阳 HER2 (+), ki-67.50%。腋窝淋巴结(4/16) 见癌转移。全身检查其他器官未见转移。雌激素、孕激素受体均(-)。按照 TNM 分期, 该患者分期

- A.T<sub>1</sub>N<sub>1</sub>M<sub>0</sub>
- B.T<sub>1</sub>N<sub>2</sub>M<sub>0</sub>
- C.T<sub>2</sub>N<sub>1</sub>M<sub>0</sub>
- D.T<sub>3</sub>N<sub>2</sub>M<sub>0</sub>
- E.T<sub>2</sub>N<sub>2</sub>M<sub>0</sub>

85.女, 44 岁。因右乳腺癌行改良根治术。术后病理:右乳浸润性癌, 非特殊型, 肿瘤大小 3cmx2cm, 组织学 II 级, ER80%强阳, PR90%强阳 HER2 (+), ki-67.50%。腋窝淋巴结(4/16) 见癌转移。全身检查其他器官未见转移。雌激素、孕激素受体均(-)。该患者术后应采取何种综合治疗方案

- A.化疗+靶向治疗
- B.化疗+内分泌治疗
- C.化疗+靶向治疗+内分泌治疗+放疗
- D.化疗+放疗+内分泌治疗
- E.化疗+靶向治疗+内分泌治疗

86.男, 55 岁, 夜间阵发性疼痛, 进食后缓解, 近 3 个月来加重, 门诊收住入院现拟对其进行手术治疗, 治疗的手术方式不包括

- A.胃大部切除术
- B.胃修补手术
- C.迷走神经干切断术
- D.选择性迷走神经切断术
- E.全胃切除术

87.男, 55 岁, 夜间阵发性疼痛, 进食后缓解, 近 3 个月来加重, 门诊收住入院。手术后, 患者胆汁性呕吐, 呕吐后腹痛不缓解, 属于

- A.吻合口瘘
- B.输出端梗阻
- C.术后胃瘫
- D.倾倒综合症
- E.十二指肠吻合口破裂

88.男, 55 岁, 夜间阵发性疼痛, 进食后缓解, 近 3 个月来加重, 门诊收住入院。手术后患者有低血糖综合症, 此时表现为

- A.呕吐物为食物, 不含胆汁
- B.呕吐物为胆汁, 不含食物

- C.呕吐物既有胆汁也有食物
- D.呕吐物是隔夜宿食
- E.无呕吐

89.女, 46岁, 上腹部不适1年, 加重伴头晕, 乏力2月, 多为进餐前疼痛, 既往患有桥本甲状腺炎病史10年, 胃镜见胃粘膜变薄, 黏膜色泽变淡, 可透见血管型。为明确诊断应该首选检查

- A.胃镜
- B.C13 呼气实验
- C.碘 131 检查
- D.腹部 X 线片
- E.内因子抗体检查

90.女, 46岁, 上腹部不适1年, 加重伴头晕, 乏力2月, 多为进餐前疼痛, 既往患有桥本甲状腺炎病史10年, 胃镜见胃粘膜变薄, 黏膜色泽变淡, 可透见血管型。患者可能会出现

- A.血中胃蛋白酶原增多
- B.胃酸分泌增多
- C.维生素 B12 缺乏
- D.可见 Vir 淋巴结
- E.内因子增多

91.男性, 22岁, 9天前脚被铁钉刺伤两天前出现乏力, 伴头痛, 咀嚼困难吞咽困难, 1天前出现牙关紧闭, 肌肉痉挛, 全身抽搐。若疾病继续发展, 最威胁生命的是

- A.持续呼吸肌痉挛
- B.肌肉断裂
- C.骨折
- D.营养障碍
- E.尿潴留

92.男性, 22岁, 9天前脚被铁钉刺伤两天前出现乏力, 伴头痛, 咀嚼困难吞咽困难, 1天前出现牙关紧闭, 肌肉痉挛, 全身抽搐。首选治疗为

- A.破伤风类毒素
- B.破伤风抗毒素
- C.青霉素
- D.破伤风类毒素+青霉素
- E.破伤风抗毒素+青霉素

93.46岁男性, 多关节肿痛6月伴晨僵6小时。累及双腕关节, 近端指间关节掌指关节, 双侧颞颌关节。ESR49ASO89, RF-, 抗 CCP+, ana-, x线见骨质疏松, 双腕关节及近端指间关节关节间隙轻度狭窄。考虑诊断

- A.系统性红斑狼疮
- B.骨关节炎
- C.痛风
- D.类风湿性关节炎
- E.银屑病关节炎

94.46岁男性, 多关节肿痛6月伴晨僵6小时。累及双腕关节, 近端指间关节掌指关节, 双侧颞颌关节。ESR49ASO89, RF-, 抗 CCP+, ana-, x线见骨质疏松, 双腕关节及近端指间关节关节间隙轻度狭窄。首选治疗方式

- A.青霉素

B.IL-6 单抗

C.别嘌醇

D.甲氨蝶呤

E.布洛芬

95.女, 75 岁, 因胃癌晚期合并幽门梗阻行胃肠减压, 近 5 天来引出胃液约 900ml/d, 每天予葡萄糖盐水 1500m 静脉滴注, 查体:T:37.3C, P:108 次/分, BP:102/60mmHg 动脉血气分析:PH: 7.56, HCO<sub>3</sub>-46mmol/LBE+7mmol/L, 进一步治疗措施不正确的是

A 尿量超过 40ml/h 补充钾离子

B.中心静脉输注稀释盐酸溶液

C.择机行姑息性胃肠短路手术

D.每 4~6 小时监测血气分析和血电解质

E.静脉滴注碳酸氢钠溶液

96.女, 75 岁, 因胃癌晚期合并幽门梗阻行胃肠减压, 近 5 天来引出胃液约 900ml/d, 每天予葡萄糖盐水 1500m 静脉滴注, 查体:T: 37.3C, P: 108 次/分, BP:102/60mmHg 动脉血气分析:PH: 7.56, HCO<sub>3</sub>-46mmol/LBE+7mmol/L, 该患者最可能合并的酸碱平衡失调是

A 呼吸性酸中毒

B.呼吸性碱中毒

C.代谢性酸中毒

D 代谢性碱中毒

E.混合性酸中毒

97.女, 16 岁, 胸痛 3 个月, 血压

115/90mmHg, 呼吸 20 次/分, 查 X 线发现右侧胸部椭圆形肿物, 肺肋隔角尖锐 CT 显示前纵隔巨大肿物, 边缘清晰, 内有混杂高密度影。其余未见异常。考虑

A.肺错构瘤

B.前纵隔淋巴瘤

C.前纵隔畸胎瘤

D.肺癌

E.纵隔结核

98.女, 16 岁, 胸痛 3 个月, 血压

115/90mmHg, 呼吸 20 次/分, 查 X 线发现右侧胸部椭圆形肿物, 肺肋隔角尖锐 CT 显示前纵隔巨大肿物, 边缘清晰, 内有混杂高密度影。其余未见异常。考虑

A.手术切除

B.观察

C.化疗

D.介入栓塞

E.密切观察

99.男性剧烈咳嗽, 咽痛, 咳淡红色痰

全身见多发红色皮疹, 考虑诊断

A.支原体肺炎

B.金黄色葡萄球菌肺炎

C.链球菌肺炎

D.病毒性肺炎

E.克雷伯杆菌肺炎

100.男性剧烈咳嗽, [咽痛, 咳淡红色痰全身见多发红色皮疹, 应采取什么治疗



- A.阿奇霉素
- B.青霉素
- C.利巴韦林
- D.阿米卡星
- E.头孢

101.男, 45岁, 反复发作性干咳伴胸闷5年, 多于春季发病, 无发热, 咯血及夜间阵发性呼吸困难, 胸片检查无异常, 抗生素治疗不佳, 无高血压病史。疾病早期最常见的酸碱平衡是

- A.呼吸性酸中毒
- B.呼吸性碱中毒
- C.呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒
- D.呼吸性碱中毒合并代谢性酸中毒
- E.呼吸性碱中毒合并代谢性碱中毒

102.男, 45岁, 反复发作性干咳伴胸闷5年, 多于春季发病, 无发热, 咯血及夜间阵发性呼吸困难, 胸片检查无异常, 抗生素治疗不佳, 无高血压病史。为明确诊断, 首选的检查是

- A.胸部X线
- B.胸部CT
- C.心脏彩超
- D.支气管镜检查
- E.支气管激发试验

103.男, 45岁, 反复发作性干咳伴胸闷5年, 多于春季发病, 无发热, 咯血及夜间阵发性呼吸困难, 胸片检查无异常, 抗生素治疗不佳, 无高血压病史。反应病情加重的表现是

- A.呼气相延长
- B.脉压增加
- C.呼吸性酸中毒
- D.胸腹矛盾运动
- E.烦躁不安

104.男, 61岁, 反复咳嗽咳痰十年

劳力性气促五年, 发热三天, 意识不清半小时。吸烟43年, 30只/日, 查体:BP96/76mmHg, SpO<sub>2</sub>87%, 浅昏迷状态, 球结膜水肿, 颈软无抵抗, 双肺呼吸音低, 双下肺可闻及湿罗音, 剑突下可触及心脏搏动, 心率110次/分, 律齐, 各瓣膜听诊区未闻及杂音, 双下肢中度水肿, 病理征阴性。导致该患者意识不清最可能的原因是

- A.心力衰竭
- B.急性脑血管病
- C.肺血栓栓塞症
- D.肺性脑病
- E.颅内感染

105.男, 61岁, 反复咳嗽咳痰十年

劳力性气促五年, 发热三天, 意识不清半小时。吸烟43年, 30只/日, 查体:BP96/76mmHg, SpO<sub>2</sub>87%, 浅昏迷状态, 球结膜水肿, 颈软无抵抗, 双肺呼吸音低, 双下肺可闻及湿罗音, 剑突下可触及心脏搏动, 心率110次/分, 律齐, 各瓣膜听诊区未闻及杂音, 双下肢中度水肿, 病理征阴性。目前最主要的治疗措施

- A.面罩吸氧
- B.高流量面罩吸氧
- C.机械通气

D.高流量氧气湿润治疗

E.鼻导管低流量吸氧

106.男, 45 岁, 反复上腹部疼痛十余年, 多于秋冬季发生, 夜间疼痛明显向背部放射, 近一周疼痛再发, 一天前排柏油样便两次, 量中等, 无头晕心悸。查体:P90 次/分, R18 次/分 BP110/75mmHg, 腹软, 脐上压痛 HB100 克/升, 粪隐血 (+++)。为明确诊断, 可行下列哪项检查

A.置蛋白酶原 I/

B.腹部增强 CT

C.13C 快速尿素酶

)D.24 小时胃酸反流监测

E.胃镜

107.男, 45 岁, 反复上腹部疼痛十余年, 多于秋冬季发生, 夜间疼痛明显向背部放射, 近一周疼痛再发, 一天前排柏油样便两次, 量中等, 无头晕心悸。查体:P90 次/分, R18 次/分 BP110/75mmHg, 腹软, 脐上压痛 HB100 克/升, 粪隐血 (+++)。导致该患者粘膜损伤的直接因素是

A.胃粘膜血液供应异常

B.胃酸胃蛋白酶导致的自身消化

C.胃泌素分泌异常

D.胃肠粘膜粘液分泌减少

E.胃动力异常

108.男, 45 岁, 反复上腹部疼痛十余年, 多于秋冬季发生, 夜间疼痛明显向背部放射, 近一周疼痛再发, 一天前排柏油样便两次, 量中等, 无头晕心悸。查体:P90 次/分, R18 次/分 BP110/75mmHg, 腹软, 脐上压痛 HB100 克/升, 粪隐血 (+++)。应首先采取的治疗是

A.紧急输血

B.质子泵抑制剂

C.血管加压素

D.6-氨基己酸

E.H<sub>2</sub>受体拮抗剂

109.引起呕血的胃内积血量最少应大于

A.400ml

B.1000ml

C.250ml

D.50ml

E.5ml

110.粪隐血试验阳性的消化道出血至少大

A.400ml

B.1000m

C.250m

D.50m

E.5ml

111.COPD 发生 II 型呼吸衰竭的主要机制是什么

A.肺泡耗氧量增加

B.动静脉分流增加

C.弥散功能障碍

D.肺泡通气不足

E.通气/血流比例失调

112.引起急性肺栓塞发生 I 型呼吸衰竭最重要的机制是

A.肺泡耗氧量增加

B.动静脉分流增加

C.弥散功能障碍

D.肺泡通气不足

E.通气/血流比例失调

113.急性机械性肠梗阻的典型临床表现为

A.上腹部压痛，板状腹，肝浊音界消失

B.脐周阵发性疼痛，伴恶心呕吐，肠鸣音亢进

C.上腹部胀痛，伴胃型及振水音

D.右上腹绞痛，伴黄疸，Murphy 征阳性

E.剑突下钝痛，腹部体征 (-)

114.消化道溃疡穿孔的典型临床表现为

A.上腹部压痛，板状腹，肝浊音界消失

B.脐周阵发性疼痛，伴恶心呕吐，肠鸣音亢进

C.上腹部胀痛，伴胃型及振水音

D.右上腹绞痛，伴黄疸，Murphy 征阳性

E.剑突下钝痛，腹部体征 (-)

115 常用于股疝修补的手术方法是

A.Halsted 术

B.Bassini 术

C.Lichtenstein 术

D.McVay 术

E.Ferguson 术

116.无张力疝修补术是

A.Halsted 术

B.Bassini 术

C.Lichtenstein 术

D.McVay 术

E.Ferguson 术

117.门静脉高压导致血管通透性增加，进而导致肠粘膜屏障功能减退所引发的疾病

A.电解质及胃肠功能紊乱

B.自发性腹膜炎

C.消化道出血

D.穿透性溃疡

E.继发性腹膜炎

118.消化道溃疡穿透至周围实质脏器引发的疾病

A.电解质及胃肠功能紊乱

B.自发性腹膜炎

C.消化道出血

D.穿透性溃疡

E.继发性腹膜炎

119.HIV 主要感染的细胞不包括

- A.库普弗细胞
- B.T 细胞
- C.单核巨噬细胞
- D.B 淋巴细胞
- E.神经胶质细胞

120.女, 18 岁, 持续高热 3 周后入院, 查体 T39°C, 心率 85 次/分, 神志清楚, 表情淡漠, 面色苍白, 前胸部可见散在出血点和红斑, 脾肋下可触及, 首选考虑的诊断是

- A.疟疾
- B.伤寒或副伤寒
- C.流行性脑脊髓膜炎
- D.流行性出血热
- E.败血症

121.女, 18 岁, 持续高热 3 周后入院, 查体 T39°C, 心率 85 次/分, 神志清楚, 表情淡漠, 面色苍白, 前胸部可见散在出血点和红斑, 脾肋下可触及, 为确诊最有意义的检查是

- A.出血热病毒抗体
- B.外斐反应
- C.肥达反应
- D.血涂片查疟原虫
- E.血细菌培养

答案: 1-5 ABBBE 6-10 ACBCA 11-15 DABAA 16-20 CCAAB 21-25 AACDC  
26-30 ABEEB 31-35 BDCDA 36-40 BCBDB 41-45CCBCB 46-50CCDDD  
51-55 EDAED 56-60DDDDC 61-65CBBBA 66-70DBADD 71-75 DDED  
76-80DACCA 81-85BBAEC 86-90 ABEEC 91-95 AEDDE 96-100 DCAAA  
101-105 BEDDC 106-110 EBBCE 111-115 DEBAD 116-121CBDABE