
考前密押 600 题

(一)

1、肾单位的组成是

- A、肾小球和肾小囊
- B、肾小体和集合管
- C、肾小球和肾小管
- D、肾小体和肾小管
- E、皮质和髓质

答案：D

2、膀胱刺激征的表现

- A、尿急、腰痛、尿频
- B、尿频、尿急、尿多
- C、尿频、尿多、尿痛
- D、尿急、尿痛、尿频
- E、尿多、尿急、尿痛

答案：D

3、系统性红斑狼疮病人皮肤护理哪项不妥

- A、常用清水清洗
- B、忌用碱性肥皂
- C、忌用化妆品
- D、避免阳光暴晒
- E、10℃水局部湿敷

答案：E

4、早期食管癌的症状有

- A、恶心、呕吐
- B、柏油样黑便
- C、持续胸背痛
- D、吞咽哽噎感
- E、进行性吞咽困难

答案：D

5、缺铁性贫血患儿应用铁剂治疗，最先出现的血液改变是

- A、血红蛋白增加
- B、皮肤苍白消失
- C、网织红细胞增加
- D、头晕乏力症状消失
- E、肝脾恢复正常大小

答案：C

6、有关出血倾向的护理措施，下列哪项错误

- A、避免皮肤摩擦，操作轻柔



英杰医学
YINGJIE.COM

- B、尽可能避免注射治疗
- C、绝对卧床，限制肢体活动
- D、注意口腔清洁，不吃坚硬食物
- E、床单平整，被褥轻软

答案：C

7、患者，女性，68岁。慢性心力衰竭2年，体力活动轻度受限制，日常活动可引起气急、心悸，下列哪项正确

- A、心力衰竭前期
- B、心功能Ⅴ级
- C、心功能Ⅳ级
- D、心功能Ⅰ级
- E、心功能Ⅱ级

答案：E

8、患儿男，4个月，反复抽搐3天，抽搐期间神志不清，伴高热烦躁。临床诊断为化脓性脑膜炎。惊厥发作期间首选药物为

- A、苯巴比妥
- B、水合氯醛
- C、地西洋
- D、20%甘露醇
- E、复方氯丙嗪

答案：C

9、放置宫内节育器术中及术后的处理错误的是

- A、术中随时观察受术者的情况
- B、嘱术者如有出血多腹痛、发热等情况随时就诊
- C、术后休息3天
- D、1周内禁止性生活
- E、术后于13、6个月及1年，分别复查1次

答案：D

10、4个月婴儿，母乳喂养，来儿保门诊咨询，家长述说婴儿除喂奶外，已加喂鱼肝油，现应指导家长再添加的辅食为

- A、面条
- B、蛋黄
- C、碎肉
- D、饼干
- E、馒头

答案：B

11、引起短暂性脑缺血发作最主要的基础病因是

- A、高血压
- B、低血压
- C、脑血栓
- D、颈内动脉粥样硬化
- E、血容量减少

答案：D

12、心跳、呼吸骤停时心电图表现可为

-
- A、心房扑动
 - B、二度房室传导阻滞
 - C、房性，心动过缓
 - D、病理性 Q 波
 - E、心室纤颤

答案：E

13、二尖瓣狭窄最早出现的症状是

- A、水肿
- B、发绀
- C、劳力性呼吸困难
- D、咳嗽
- E、端坐呼吸

答案：C

14、患者高热时，将输液管看成是条蛇，此症状是

- A、幻觉
- B、错觉
- C、虚构
- D、错构
- E、感知综合障碍

答案：B

15、全麻患者清醒前最危险的并发症是

- A、窒息
- B、高血压
- C、苏醒延迟
- D、躁动
- E、伤口出血过多

答案：A

16、蛛网膜下腔出血与其他脑血管病的最大区别是

- A、有无意识障碍
- B、有无恶心呕吐
- C、有无肢体瘫痪
- D、有无局灶性定位症状
- E、有无头痛

答案：C

17、易致血管、神经、肌腱断裂的损伤是

- A、挤压伤
- B、挫伤
- C、切割伤
- D、火器伤
- E、爆震伤

答案：C

18、急性心肌梗死患者发病 24h 内死亡的主要原因是

- A、脑梗死
- B、心力衰竭



- C、急性肺水肿
- D、心律失常
- E、脑损伤

答案：D

19、系统性红斑狼疮患者敏感性最高的实验室检查是

- A、红细胞增多
- B、抗核抗体
- C、抗 Sm 抗体
- D、淋巴细胞增多
- E、血小板增多

答案：B

20、护士对腹泻患儿家属讲解重型腹泻与轻型腹泻的主要区别是

- A、腹痛、腹胀
- B、精神萎靡
- C、有水、电解质紊乱
- D、粪便水分稀
- E、每日排便可达数十次

答案：C

21、急性胰腺炎的主要表现和首发症状是

- A、低血压或休克
- B、发热
- C、腹痛
- D、恶心、呕吐与腹胀
- E、水、电解质及酸碱平衡紊乱

答案：C

22、急性呼吸窘迫综合征的给氧护理正确的是

- A、在给氧过程中氧气无需湿化
- B、给氧时，应记录吸氧方式和吸氧浓度
- C、高浓度（>50%）、高流量（4~6L/min）
- D、低浓度（>20%）、高流量（4~6L/min）
- E、高浓度（>20%）、低流量（1~2L/min）

答案：C

23、哪项不是风湿性疾病的共同特点

- A、慢性起病
- B、病情发作与缓解交替
- C、个体差异大
- D、关节畸形
- E、多器官受累

答案：D

24、肺癌最常见的早期症状是

- A、刺激性咳嗽
- B、胸闷气急
- C、胸痛
- D、血痰

E、发热

答案：A

25、我国大肠癌好发部位是

A、直肠

B、升结肠

C、降结肠

D、横结肠

E、乙状结肠

答案：A

26、老年男性泌尿系统梗阻常见的病因是

A、包皮过长

B、结石损伤

C、盆腔内疾病

D、先天性畸形

E、前列腺增生症

答案：E

27、患者女，28岁，今日感外阴痒，阴道分泌物增多就诊。妇科检查：白带呈豆渣样，阴道粘膜红肿并附有白膜。考虑感染的病原体是

A、支原体

B、苍白螺旋体

C、假丝酵母菌

D、阴道毛滴虫

E、淋病奈瑟菌

答案：C

28、休克时反映器官血流灌注最重要的指标是

A、神志

B、血压

C、脉率

D、尿量

E、肢体温度

答案：D

29、类风湿性关节炎关节病变的特点是

A、大关节

B、关节畸形

C、游走性疼痛

D、对称性改变

E、关节肿胀

答案：D

30、绒毛膜癌患者最常见的转移部位是

A、肺

B、脑

C、肝

D、阴道

E、膀胱

答案：A

31、以下哪项为肝硬化患者肝功能失代偿期的典型表现

- A、头晕、头痛
- B、意识障碍
- C、蜘蛛痣
- D、腹痛腹泻
- E、腹水

答案：E

32、胎儿成熟度的判断最可靠的方法是

- A、B超检查
- B、羊水分析
- C、胎儿身长
- D、检测雌三醇值
- E、测量宫高腹围

答案：A

33、肺心病患者处于肺、心功能失代偿期，其主要临床表现是

- A、呼吸困难
- B、咯血
- C、胸闷胸痛
- D、窒息
- E、呼吸衰竭与心力衰竭

答案：E

34、孕妇，30岁，妊娠合并心脏病，最易发生心力衰竭的时间是

- A、28~32周
- B、32~34周
- C、34~36周
- D、26~28周
- E、36~38周

答案：B

35、新生儿，女，日龄7天。食欲及精神良好，母亲在给其换尿布时发现其会阴部有血性分泌物。护士向其母亲解释该现象属于

- A、生理现象
- B、外阴炎
- C、外阴出血
- D、肛门出血
- E、肛周出血

答案：A

36、患者男，35岁。咳嗽、咳大量脓痰，诊断为支气管扩张。该病患者咳嗽、咳痰加重的时间多见于

- A、白天
- B、傍晚
- C、深夜
- D、进餐时
- E、晨起和晚上临睡时

答案：E

37、患者，女性，35岁，左胸外伤后出现呼吸困难，疼痛，面色发绀，气管右移，左侧呼吸音消失并伴有皮下气肿，应初步考虑为

- A、气胸
- B、心脏破裂
- C、脓胸
- D、血胸
- E、阻塞性肺炎

答案：A

38、患者，女性，25岁，既往曾有肾小球肾炎史，近日发现血压升高，来医院复查，诊断为慢性肾小球肾炎急性发作。护士采取的下列哪项措施可迅速而有效地缓解其症状

- A、戒烟戒酒
- B、低钠饮食
- C、利尿降压
- D、激素疗法
- E、物理疗法

答案：C

39、患儿，8个月，患支气管肺炎，突然烦躁不安。查体：呼吸>62次/分，“三凹征”明显，心率187次/分，心音低钝，肝肋下3.5cm。考虑该患儿可能出现的并发症是

- A、急性心力衰竭
- B、心肌炎
- C、急性呼吸窘迫综合症
- D、脓胸脓气胸
- E、中毒性脑病

答案：A

40、患者，女性，38岁，风心病伴房颤7年。今日下午患者突然右侧肢体瘫痪、失语、偏身感觉障碍，查脑脊液正常。考虑该患者最可能发生的情况是

- A、左侧大脑中动脉栓塞
- B、左侧大脑中动脉出血
- C、右颈内动脉栓塞
- D、脑桥旁正中动脉栓塞
- E、右侧内囊栓塞

答案：A

41、患者，男性，患胃、十二指肠溃疡住院治疗，合并幽门梗阻，术前3天，每晚需要用

- A、清水洗胃
- B、300~500ml温等渗盐水洗胃
- C、碱性药物洗胃
- D、1%~4%鞣酸溶液洗胃
- E、3%氯化钠溶液洗胃

答案：B

42、男，45岁，以急性化脓性胆管炎急诊入院，体温41℃，血压85/65mmHg，尿15ml，发生了

- A、感染性休克
- B、创伤性休克

- C、低血量性休克
- D、心源性休克
- E、过敏性休克

答案：A

43、患者男，36岁，患支气管哮喘住院，护士对患者的治疗中不首先考虑的是

- A、病情发展
- B、患者兴趣
- C、药物治疗
- D、医嘱
- E、患者的主诉

答案：B

44、患者男性，71岁。因情绪激动，饭后感胸部紧缩性发闷，自含硝酸甘油后逐渐缓解，考虑为

- A、脑供血不足
- B、颈椎病
- C、咽喉炎
- D、心绞痛
- E、心功能不全

答案：D

45、患者程某，女，20岁，因受到教师批评后感到压抑，便服用敌敌畏，但被同学及时发现，送医院诊治。最能够反映病情变化的观察指征是

- A、表情
- B、面容
- C、瞳孔
- D、呕吐物
- E、皮肤与黏膜

答案：C

46、27岁女性，妊娠38周，因持续横产式行剖宫产术。下列属横产式胎位的是

- A、头先露
- B、面先露
- C、枕先露
- D、臀先露
- E、肩先露

答案：E

47、患者女性，32岁，孕12周不规则阴道出血就诊，实验室和B超检查提示：葡萄胎。对孕妇的实验室检查结果中哪项高于正常，提示有葡萄胎的可能

- A、雌激素
- B、孕激素
- C、绒毛膜促性腺激素
- D、促卵泡素
- E、雄激素

答案：C

48、27岁初产妇，反复无诱因、无痛性阴道出血入院，前置胎盘诊断成立的孕周是

- A、24周后

- B、26 周后
- C、28 周后
- D、30 周后
- E、32 周后

答案：C

49、患者女性，54 岁，出现上腹部隐痛，反酸暖气，疑为慢性胃炎，最可靠的诊断方法是

- A、病史和临床表现
- B、纤维胃镜检查
- C、胃液分析
- D、胃肠钡餐检查
- E、粪便检查

答案：B

50、患儿，8 个月，因婴儿腹泻重度脱水入院，经输液脱水症状减轻，已排尿，但表现四肢无力、腹胀、心音低钝，应考虑

- A、低血钾
- B、低血糖
- C、低血钙
- D、低血镁
- E、代谢性酸中毒

答案：A

51、患者，女性，40 岁，因再生障碍性贫血入院治疗。入院当日血常规结果显示 Hb59g/L，护士对该患者制定的休息与活动计划为

- A、绝对卧床休息，协助自理活动
- B、卧床休息为主，间断床上及床边活动
- C、床上活动为主，适当增加休息时间
- D、床边活动为主，增加午睡及夜间睡眠时间
- E、适当进行室内运动，避免重体力活动

答案：A

52、患者，男性，40 岁，由家人背送急诊。家属诉半小时前发现其人事不省，倒卧在家中床上，时有呕吐。查体：皮肤多汗，流涎，双侧瞳孔明显缩小，呼吸有大蒜味，分诊护士首先考虑该患者最有可能为

- A、安眠药中毒
- B、酒精中毒
- C、一氧化碳中毒
- D、有机磷中毒
- E、脑栓塞

答案：D

53、患者，女性，50 岁。因午后潮热、心悸等症状就诊，诊断为围绝经期综合征。为预防骨质疏松，医嘱用激素替代疗法，同时需要补充

- A、钙剂
- B、铁剂
- C、叶酸
- D、维生素 C
- E、蛋白质

答案：A

54、患者，男性，55岁，首发症状为动作不灵活和震颤入院，经进一步检查诊断为帕金森病，此病的特征不包括

- A、肌强直
- B、体位不稳
- C、运动减少
- D、运动性震颤
- E、起病缓慢，逐渐加重

答案：D

55、患儿女，6岁，以病毒性脑膜炎入院。经积极治疗，除右侧肢体仍活动不利，其他临床症状明显好转，家长要求回家休养，护士为其进行出院指导，不妥的是

- A、给予高热量、高蛋白、高维生素饮食
- B、患侧肢体保持功能位，尽量减少活动
- C、指导用药的注意事项
- D、保持患儿心情舒畅
- E、指导定期随访

答案：B

56、患者，女性，60岁。因心力衰竭收住入院，采用地高辛治疗。护士查房时，患者主诉食欲明显减退，视力模糊，护士测心率50次/分，心律不齐，上述症状最可能的原因是

- A、心力衰竭加重
- B、颅内压增高
- C、心源性休克
- D、低钾血症
- E、洋地黄中毒

答案：E

57、患者，女性，30岁，停经60天，恶心呕吐2周，2~4次/d，护士采取的正确的护理是

- A、输液治疗
- B、半流质
- C、口服止吐药
- D、绝对卧床休息
- E、鼓励孕妇少量多次进食

答案：E

58、患者，女性，50岁，转移性右下腹痛，伴恶心、呕吐、发热。最能提示该患者患有阑尾炎的体征是

- A、疼痛转移至麦氏点
- B、右下腹固定压痛
- C、腹胀明显
- D、肠鸣音减弱或消失
- E、腹肌紧张

答案：A

59、患者，女性，55岁，严重腹泻、脱水、意识障碍。查体：血糖32mmol/L，尿酮体(+)。护士向家属解释患者意识障碍发生的原因是

- A、脑栓塞
- B、脑出血

- C、高血压脑病
- D、糖尿病酮症酸中毒昏迷
- E、高渗性非酮症糖尿病昏迷

答案：D

60、患儿4岁，患麻疹，发热6天，查体：患者咳嗽、气促，体温39℃，双肺呼吸音粗，未闻及啰音。PPD(+++)。胸部X线检查：双肺见分布均匀、大小一致、密度一致的粟粒状阴影。可能的诊断是

- A、麻疹并上呼吸道感染
- B、麻疹肺炎
- C、麻疹合并急性粟粒型肺结核
- D、原发型肺结核
- E、溶血性链球菌肺炎

答案：C

61、患儿2岁。发热、流涕、咳嗽已3天，今晨发现前额及耳后有浅红色斑丘疹，眼结膜充血，口腔黏膜粗糙，声音嘶哑，精神萎靡，两肺呼吸音粗。其最可能的诊断是

- A、风疹
- B、幼儿急疹
- C、肠道病毒感染
- D、皮肤黏膜淋巴结综合征
- E、麻疹

答案：E

62、婴儿，3天。今晨家人发现其全身皮肤发黄，经咨询社区护士了解系生理性黄疸。新生儿易出现生理性黄疸的主要原因是

- A、肝功能不成熟
- B、肾功能不成熟
- C、胆管相对小
- D、红细胞发育差
- E、胆红素不易分解

答案：A

63、咳嗽5天伴发热2天的支气管炎患儿，不应采取的措施是

- A、减少患儿活动
- B、经常变换体位
- C、室内湿度60%
- D、给予雾化吸入
- E、给予镇咳剂

答案：E

64、.婴儿，9天。生后有喂养困难、嗜睡、青紫、哭声异常、颤抖表现，医生解释此为低血糖症状。关于低血糖的治疗，下列说法正确的是

- A、不管有无症状，都要及时治疗
- B、对于无症状性低血糖者，也应立即静脉注射葡萄糖
- C、足月儿应静脉注射葡萄糖6~8mg/(kg.min)
- D、持续或反复低血糖，可加用儿茶酚胺类药物治疗
- E、对早产儿而言，暂时性低血糖可先观察，严密监测血糖，不必立即治疗以防止高血糖

答案：A

65、某胎龄 35 周早产儿，生后不久即出现烦躁不安、肌肉抽动及震颤症状。医生告知为早期低血钙。新生儿早期发生低钙血症的时间，是指生后不超过

- A、12 小时
- B、24 小时
- C、36 小时
- D、48 小时
- E、72 小时

答案：E

66、患者，男性，72 岁，因前列腺肥大造成排尿困难，腹痛，尿潴留，已 16 小时未排尿。下述护理中正确的是

- A、让患者坐起排尿
- B、用温水冲洗会阴部
- C、行导尿术
- D、听流水声
- E、下腹部置热水袋

答案：C

67、患者，女，32 岁。因外阴瘙痒、疼痛 5 天就诊，自述排尿后加重，查体见外阴部充血、红肿，局部出现溃疡。错误的处理措施是

- A、取阴道分泌物查找病原体
- B、检查血糖
- C、使用 1:5000 的高锰酸钾溶液坐浴
- D、使用酸性液体灌洗阴道
- E、溃疡处涂抹抗生素软膏

答案：D

68、患者，48 岁，月经紊乱近 1 年，经量时多时少，周期无规律，此次 2 个月未来潮后出血近半个月。查：子宫正常大小，软，诊断为无排卵性功血，首选的止血方法是

- A、诊断性刮宫
- B、孕激素
- C、止血剂
- D、雌激素
- E、雄激素

答案：A

69、患者，女，52 岁。近两年来月经稀发，易出汗，汗后畏冷，激动易怒、多疑，血压不稳定，常出现尿失禁，体格变小。不适宜的治疗方法是

- A、精神心理治疗
- B、使用镇静剂改善睡眠
- C、加强体育锻炼预防骨质疏松
- D、禁用甲羟孕酮
- E、补充钙剂

答案：D

70、患者男，18 岁。诊断为急性肾小球肾炎。不可能出现的检查结果是

- A、血沉增快
- B、血红蛋白降低
- C、尿蛋白（+++）

- D、尿中能见到红细胞管型
E、尿中红细胞多为变形红细胞

答案：B

71、患者，男性，23岁，因库欣综合征入院，查体：面部皮肤红而薄，头发稀疏，血压180/100mmHg，肥胖，护士应指导病人饮食的注意点是

- A、肝用低蛋白饮食
B、给予高热量低碳水化合物饮食
C、高钾低钙饮食
D、鼓励病人肝用柑橘、枇杷、香蕉、南瓜等含钾高的水果
E、食物中添加辛辣品，刺食欲

答案：D

72、患者，男性，70岁，风湿性心脏病，下床、洗漱、就餐、走动后即气喘、出汗，自诉心慌、胸闷，但卧床休息时无此不适。最恰当的指导是

- A、绝对卧床休息，取半卧位
B、不限制活动，但需劳逸结合
C、以卧床休息为主，限制运动
D、可打太极拳，忌剧烈运动
E、每天爬一层楼梯，需增加睡眠

答案：C

73、患者，女性，35岁，股骨颈骨折，石膏固定1小时后护士发现局部颜色发紫，此时护士应立即

- A、报告医生
B、继续观察
C、拆松石膏
D、局部按摩
E、局部垫海绵垫

答案：A

74、患者，女性，70岁。饮用红酒600ml后出现脸色潮红，轻微眩晕，语言增多，诊断为酒精中毒。下列医嘱中，对治疗酒精中毒无效的是

- A、静推利尿剂
B、静推纳洛酮
C、静脉滴注维生素
D、静滴抗生素
E、静滴电解质

答案：D

75、患者，男性，70岁。身高170cm，体重80kg，患高血压15年，为控制患者体重所采取的措施不应包括

- A、制订个体化膳食方案
B、检测体重变化
C、吃减肥药
D、规律运动
E、控制饮食

答案：C

76、患者男，18岁，篮球比赛时不慎扭伤踝关节，2小时后到校医室就诊，正确的处理方法

是

- A、热敷
- B、冷敷
- C、热水足浴
- D、局部按摩
- E、冷热交替外用

答案：B

77、患儿男，6岁，体检发现“X”形腿，血钙 2.5mmol/L，护士正确的判断是

- A、可疑维生素 D 缺乏性佝偻病
- B、维生素缺乏性佝偻病初期
- C、维生素
- D、缺乏性佝偻病
- E、维生素 D 缺乏性佝偻病后遗症期

答案：E

78、患者，女性，60岁，头部外伤后昏迷1小时，曾呕吐数次。入院测血压 140/80mmHg，脉搏 65 次 / 分，呼吸 13 次 / 分。考虑“脑挫裂伤”，给予非手术治疗。为及时发现小脑幕切迹疝，应重点观察

- A、瞳孔、肢体活动
- B、血压、脉搏、尿量
- C、意识、肌张力
- D、呼吸、体温、血压
- E、压迫眶上孔的反应

答案：A

79、患者，男性，30岁，确诊肾病综合征2年，近日出现右下肢水肿明显，右腿较左腿明显肿胀，血清胆固醇 3.84mmol/L，该患者可能出现了

- A、右下肢感染
- B、右下肢静脉血栓
- C、右下肢水肿加重
- D、药物的副作用
- E、治疗无效

答案：B

80、患儿女，早产，母乳喂养，经9天观察，身体状况良好，医生通知家长接其出院。护士应给予的正确指导是

- A、培养良好的生活习惯
- B、训练按时排便
- C、及早添加辅食
- D、预防感染
- E、预防外伤

答案：D

81、患者男性，40岁。破伤风住院，全身肌肉紧张性收缩，阵发性痉挛，治疗的中心环节是

- A、清除毒素来源，彻底清除坏死组织和异物
- B、用青霉素
- C、用镇静解痉药

D、中和游离毒素

E、防治并发症

答案：C

82、王先生在皮内注射破伤风抗毒素 15 分钟后出现局部皮丘红肿，硬结直径 1.6cm，有瘙痒感。其处理是

A、禁用破伤风抗毒素

B、将全量分 3 次肌内注射

C、将全量平均分成 4 次注射

D、将全量分 4 次注射，剂量递增

E、将全量分 4 次注射，剂量递减

答案：D

83、小儿，8 岁。因发热、关节红肿及心前区不适诊断为风湿热而住院治疗。现病情逐渐好转，拟出院回家休养。护士在进行出院健康指导中提出，控制小儿风湿热复发首选的药物是

A、红霉素

B、氯霉素

C、链霉素

D、阿斯匹林

E、长效青霉素

答案：E

84、患者，女性，44 岁，因乳腺癌行右侧乳腺局部切除术，术后进行化疗和放疗。患者化疗或放疗期间，最主要的观察项目是

A、脱发程度

B、食欲不振

C、皮肤损害

D、血常规检查

E、恶心呕吐

答案：D

85、合理的病室环境是

A、婴儿室室温宜在 22~24℃

B、室内相对湿度在 30%~40%为宜

C、破伤风病人，室内光线应明亮

D、产房休息室，应保暖不宜开窗

E、气管切开者，室内相对湿度为 40%

答案：A

86、女性，30 岁，突然出现畏寒、发热，体温达 39℃，并出现尿频、尿急、尿痛及下腹部不适而前来就诊。

若该项尿液检查异常，患者可能患有以下哪项疾病

A、急性肾盂肾炎

B、肾结石

C、慢性肾小球肾炎

D、肾病综合征

E、盆腔炎

答案：A

87、患者，男性，40 岁，因活动后有呼吸困难，近半年有进行性加重，并伴有咳嗽、声音嘶

哑。患者既往有风湿热 9 年，常有扁桃体炎发生，经医生诊断为慢性风湿性心瓣膜病。慢性风湿性心瓣膜病最常受累的瓣膜是

- A、二尖瓣
- B、三尖瓣
- C、肺动脉瓣
- D、主动脉瓣
- E、静脉瓣

答案：A

88、患者，男性，40 岁，因活动后有呼吸困难，近半年有进行性加重，并伴有咳嗽、声音嘶哑。患者既往有风湿热 9 年，常有扁桃体炎发生，经医生诊断为慢性风湿性心瓣膜病。二尖瓣狭窄最早出现的症状是

- A、水肿
- B、咯血
- C、劳力性呼吸困难
- D、咳嗽
- E、端坐呼吸

答案：C

89、患者，男性，40 岁，因活动后有呼吸困难，近半年有进行性加重，并伴有咳嗽、声音嘶哑。患者既往有风湿热 9 年，常有扁桃体炎发生，经医生诊断为慢性风湿性心瓣膜病。风心病二尖瓣狭窄最常见的心律失常是

- A、心房颤动
- B、室性期前收缩
- C、窦房传导阻滞
- D、阵发性室上速
- E、房室传导阻滞

答案：A

90、患者女性，58 岁。高血压病 1 年，2 小时前发现血压急剧升高，剧烈头痛、呕吐、大汗，医生确诊为高血压危象，给予降压药硝普钠治疗。

关于药物护理不正确的是

- A、应避光输液
- B、根据血压水平调节速度
- C、严密监测血压，1~2 小时测血压一次
- D、严密监测血压，15~30 分钟测血压一次
- E、药物要现配现用

答案：D

91、患者女性，58 岁。高血压病 1 年，2 小时前发现血压急剧升高，剧烈头痛、呕吐、大汗，医生确诊为高血压危象，给予降压药硝普钠治疗。

若病人发生烦躁不安时，应该采取的护理措施是

- A、尽早协助病人外出检查
- B、等病人平稳后再测量血压
- C、应用脱水剂速度宜慢
- D、有人陪伴，避免受伤
- E、应用硝酸甘油制剂速度宜快

答案：D

92、患者，男，18岁，患Ⅰ型糖尿病，依赖胰岛素治疗。最近2天因中断胰岛素治疗后出现食欲减退、恶心、呕吐、头痛、嗜睡。入院查体：血压90/60mmHg，呼吸深快，呼气中出现烂苹果味。

该患者可能出现了下列哪种并发症

- A、低血糖昏迷
- B、酮症酸中毒
- C、非酮症性高渗性昏迷
- D、糖尿病肾病
- E、急性心力衰竭

答案：B

93、患者，男，18岁，患Ⅰ型糖尿病，依赖胰岛素治疗。最近2天因中断胰岛素治疗后出现食欲减退、恶心、呕吐、头痛、嗜睡。入院查体：血压90/60mmHg，呼吸深快，呼气中出现烂苹果味。

针对上述情况，首要的处理措施是

- A、胰岛素治疗
- B、大量补液
- C、静滴补钾
- D、纠正酸中毒
- E、纠正脱水、休克

答案：B

94、患者，男，18岁，患Ⅰ型糖尿病，依赖胰岛素治疗。最近2天因中断胰岛素治疗后出现食欲减退、恶心、呕吐、头痛、嗜睡。入院查体：血压90/60mmHg，呼吸深快，呼气中出现烂苹果味。

下列护理措施中错误的是

- A、监测生命体征尤其是呼吸的变化
- B、监测血糖、血酮体及血钾的变化
- C、大剂量静脉滴注胰岛素
- D、纠正酸中毒
- E、保持呼吸道通畅，预防呼吸道感染

答案：C

95、测量脉搏应首选

- A、颞浅动脉
- B、腘动脉
- C、桡动脉
- D、颈动脉
- E、肱动脉

答案：C

96、压疮淤血红润期的主要特点是

- A、皮下产生硬结，表皮出现水疱
- B、组织坏死发黑，炎性分泌物增多
- C、局部淤血导致血栓形成，组织缺血缺氧
- D、浅层组织感染，形成溃疡
- E、局部皮肤红、肿、热、痛

答案：E

97、治疗破伤风病人时，注射破伤风抗毒素的作用是

- A、中和游离毒素
- B、清除毒素来源
- C、控制并解除痉挛
- D、防止并发症
- E、保持呼吸通畅

答案：A

98、禁止使用铁剂、动物血、肝类、瘦肉及绿叶蔬菜的试验饮食是

- A、胆囊造影饮食
- B、隐血试验饮食
- C、吸碘试验饮食
- D、肌酐试验饮食
- E、尿浓缩试验饮食

答案：B

99、对焦虑症患者的处理不恰当的是

- A、矫正病人歪曲的认知
- B、利用生物反馈信息训练病人放松
- C、督导病人进行放松式调理
- D、关注患者过多不适的主诉
- E、转移患者注意力，减轻焦虑情绪

答案：D

100、下列具有自律性的心肌细胞为

- A、浦肯野纤维细胞
- B、心室肌细胞
- C、心内膜细胞
- D、乳头肌细胞
- E、窦房结细胞

答案：E

101、与消化性溃疡发生关系密切的细菌是

- A、链球菌
- B、霍乱弧菌
- C、幽门螺杆菌
- D、痢疾杆菌
- E、大肠杆菌

答案：C


102、服用下列药物时，需常规测量脉搏或心率的是

- A、心得安
- B、安定
- C、洋地黄
- D、强的松
- E、氯丙嗪

答案：C

103、根据血压水平的定义和分类，血压 130/88mmHg 属于

- A、正常血压



- B、正常高值
- C、I级高血压
- D、II级高血压
- E、III级高血压

答案：B

104、传染病区，中班护士与夜班护士床旁交班后，隔离衣悬挂正确的是

- A、挂在治疗室，清洁面向外
- B、挂在治疗室，清洁面向内
- C、挂在病室，清洁面朝外
- D、挂在走廊，清洁面朝外
- E、挂在走廊，清洁面朝内

答案：D

105、急性胃炎频繁呕吐，首先应观察

- A、呕吐物性质及量
- B、皮肤出血点
- C、呼吸变化
- D、体温
- E、意识状态

答案：A

106、昏迷期肝性脑病患者清醒后可逐步增加蛋白质饮食而最适宜的蛋白质食品是

- A、肉类
- B、乳类
- C、蛋类
- D、禽类
- E、豆类

答案：E

107、急性胰腺炎病人禁食时每天应补液多少

- A、1000ml
- B、1500ml
- C、2000ml
- D、1500~2000ml
- E、2000~3000ml

答案：E

108、对压眶刺激出现痛苦表情，没有言语应答，并不能执行简单的命令的意识障碍病人处于下列哪种状态

- A、昏迷
- B、嗜睡
- C、睁眼昏迷
- D、浅昏迷
- E、深昏迷

答案：D

109、对肝性脑病病人一般禁止应用安眠药和镇静药物，其原因是

- A、避免掩盖病情，加重昏迷
- B、防止感染



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

- C、预防脑水肿
- D、易致便秘
- E、影响利尿药作用

答案：A

110、慢性支气管炎发生和加重的重要因素是

- A、大气污染
- B、冷空气刺激
- C、吸烟
- D、反复感染
- E、过敏反应

答案：D

111、护理程序的概念是

- A、进行整体护理
- B、找出护理诊断
- C、设立预期目标
- D、提供护士的工作程序或方法
- E、实施护理措施后作评价

答案：D

112、传染病的流行过程必须具备哪三个基本环节

- A、病原体环境、易感人群
- B、病原体环境、传染源
- C、传染源、传播途径、易感人群
- D、病原体、传播途径、易感人群
- E、传染源、传播途径、环境

答案：C

113、多尿是指成人24小时尿量大于

- A、1000ml
- B、1500ml
- C、2000ml
- D、2500ml
- E、3000ml

答案：D

114、由肾脏产生的最终合成血管紧张素II的激素是

- A、肾素
- B、促红细胞生成素
- C、前列腺素族
- D、激肽类
- E、缓激肽

答案：A

115、为降低血氨浓度，肝性脑病昏迷的患者可鼻饲给予

- A、蛋汤
- B、豆浆
- C、鸡汤
- D、牛奶

E、25%葡萄糖液

答案：E

116、肠套叠患儿的大便性状是

A、脓血便

B、黏液便

C、柏油便

D、果酱样便

E、蛋花汤样便

答案：D

117、急性胰腺炎的首发症状是

A、发热

B、腹痛

C、恶心

D、呕吐

E、休克

答案：B

118、十二指肠溃疡的好发部位是

A、降部

B、升部

C、降部和升部

D、球部

E、水平部

答案：D

119、急性胰腺炎患者禁食的目的是

A、肝免胃扩张

B、解除胰管痉挛

C、控制饮食

D、减少胰液分泌

E、减少胃液分泌

答案：D

120、细菌性肺炎最常见的病原菌是

A、克雷伯杆菌

B、铜绿假单胞菌

C、大肠杆菌

D、肺炎链球菌

E、葡萄球菌

答案：D

(二)

1、臀大肌注射的正确部位是

A、髂嵴和尾骨连线的外上 1/3

B、髂嵴和尾骨连线的中 1/3

C、髂前上棘与尾骨连线的中 1/3

- D、髂前上棘与尾骨连线后 1/3
E、髂前上棘与尾骨连线外上 1/3

答案：E

2、强迫症的发病年龄通常为

- A、青少年期
B、幼儿期
C、中年期
D、老年期
E、婴儿期

答案：A

3、在病情观察中，中医的“四诊”方法是

- A、辨、证、论、治
B、望、触、叩、听
C、触、摸、按、压
D、望、触、问、切
E、望、闻、问、切

答案：E

4、肝性脑病最早出现的表现是

- A、定向力障碍
B、反射亢进
C、性格和行为改变
D、巴宾斯基征阳性
E、昏睡

答案：C

5、列入乙类传染病，但按甲类传染病管理的

- A、传染性非典型肺炎
B、病毒性肝炎
C、流行性乙型脑炎
D、艾滋病
E、肺结核

答案：A

6、心包腔内液体的生理作用

- A、营养心肌
B、润滑作用
C、免疫作用
D、维持心包腔内压力
E、维持心肌张力

答案：B

7、下列属于客观资料的是

- A、头痛
B、发绀
C、恶心
D、心慌
E、乏力



英杰医学

YINGJIE.COM

答案：B

8、急救药品的完好率达到

A、80%

B、85%

C、90%

D、95%

E、100%

答案：E

9、关于医疗机构临床用血的规定，正确的是

A、可自行采集

B、可将临床上多余用血出售给血液制品生产单位

C、必须进行配型核查

D、必须先缴费后使用

E、主动动员家庭亲友为患者献血

答案：C

10、16cm 的无菌镊子，存放于其浸泡容器中，适宜深度为

A、4cm

B、5cm

C、6cm

D、7cm

E、8cm

答案：E

11、晚期肝硬化最严重的并发症是

A、肝肺综合征

B、上消化道出血

C、感染

D、肝肾综合征

E、肝性脑病

答案：E

12、新生儿缺氧缺血性脑病的主要临床表现不包括

A、嗜睡

B、拥抱反射活跃

C、肌张力低下

D、前囟凹陷

E、惊厥

答案：D

13、小儿惊厥若有视网膜下出血提示

A、颅内出血

B、颅内高压

C、癫痫

D、脑室内出血

E、脑积水

答案：A

14、符合慢性阻塞性肺气肿的体征是



- A、叩诊呈鼓音
- B、单侧语颤减弱
- C、单侧呼吸运动减弱
- D、气管偏移
- E、呼气时间延长

答案：E

15、护士发现新生儿口腔黏膜腭中线和齿根切缘处有黄白色小斑点，正确的护理措施是

- A、不必处理
- B、用力擦净
- C、手术切除
- D、涂制霉菌素
- E、用无菌针头挑破

答案：A

16、患者男，70岁，患脑血栓致偏瘫。入院后发现其骶尾部有一4cm×4cm大小的呈紫红色的皮肤，触之较硬，并有一大水疱。护士对局部皮肤应采取的护理措施是

- A、涂厚层滑石粉包扎
- B、揭去表皮，贴新鲜鸡蛋内膜
- C、剪去表层皮肤，用无菌纱布包扎
- D、用1：5000呋喃西林溶液清洁疮面
- E、用无菌注射器抽出疱内液体后消毒包扎

答案：E

17、患者女性，30岁。急性肾炎，轻度水肿，患者最适宜的饮食是

- A、低盐饮食
- B、高蛋白饮食
- C、低热量饮食
- D、高热量饮食
- E、无盐低钠饮食

答案：A

18、不符合心绞痛特点的是

- A、疼痛位于胸骨体中与上段之后
- B、疼痛可伴有濒死感
- C、疼痛多数持续在15分钟以上
- D、休息可缓解疼痛
- E、常有诱发因素

答案：C

19、足月儿，产钳助产娩出，出生时全身皮肤苍白，呼吸微弱，心率30次/分，肌张力松弛。生后首先应采取的措施是

- A、面罩给氧
- B、胸外心脏按压
- C、清除口鼻腔分泌物
- D、注射5%碳酸氢钠和呼吸兴奋剂
- E、弹足底或刺激皮肤引起啼哭

答案：C

20、肾盂肾炎最常见的致病菌是

-
- A、变性杆菌
 - B、大肠杆菌
 - C、葡萄球菌
 - D、厌氧菌
 - E、链球菌

答案：B

21、危险三角区的疖，首要的护理问题潜在并发症

- A、毒血症
- B、颅内感染
- C、菌血症
- D、脓血症
- E、休克

答案：B

22、忌用冷疗的疾病是

- A、烫伤
- B、慢性炎症
- C、牙痛
- D、脑外伤
- E、急性关节扭伤

答案：B

23、插胃管时患者出现呛咳、发绀，护士应

- A、立即拔出胃管
- B、继续插入
- C、稍停片刻重新插入
- D、指导患者做吞咽动作
- E、嘱病人深呼吸

答案：A

24、小儿机体需要的总能量中，为其所特有的需要是

- A、基础代谢
- B、活动
- C、排泄
- D、生长发育
- E、食物的特殊动力作用

答案：D

25、下列防止交叉感染的最重要的措施是

- A、一份无菌物品只能供一个病人使用
- B、凡未经消毒的手和物品，不可跨越无菌区
- C、无菌操作前洗手修剪指甲
- D、无菌物品应放在清洁干燥、固定的地方
- E、无菌物品应定期检查

答案：A

26、确诊肺结核最可靠的检查方法是

- A、CT 检查
- B、X 线检查



五英杰医学
WUYINGJIE.COM

- C、结核菌检查
- D、痰结核菌检查
- E、纤维支气管镜检查

答案：D

27、麻疹的主要传播途径是

- A、消化道传播
- B、接触传播
- C、虫媒传播
- D、飞沫传播
- E、血液传播

答案：D

28、口底、颌下及颈部蜂窝织炎的最严重后果是

- A、发热
- B、吞咽困难
- C、呼吸困难窒息
- D、全身性感染
- E、化脓性海绵状静脉窦炎

答案：C

29、未母乳喂养或未做到及时有效母乳喂养的产妇，通常可于产后 3~4 天因乳房血管、淋巴管极度充盈可有发热，称为

- A、泌乳热
- B、乳腺炎
- C、产后热
- D、产褥热
- E、产褥感染

答案：A

30、为预防佝偻病，出生后开始服用维生素 D 的时间是

- A、15 天
- B、5 个月
- C、2 个月
- D、6 个月
- E、4 个月

答案：A

31、小儿发育成熟最晚的系统是

- A、淋巴系统
- B、循环系统
- C、消化系统
- D、神经系统
- E、生殖系统

答案：E

32、肾病综合征大量蛋白尿的原因是

- A、血压高
- B、少尿
- C、肾小球滤过率降低



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

D、水肿

E、感染

答案：C

33、类风湿关节最基本的病理变化是

A、血管炎

B、骨质增生

C、周围神经病变

D、关节滑膜炎

E、软骨增生

答案：D

34、中医的五脏是指心、肝、脾、肺和

A、胃

B、脑

C、肾

D、小肠

E、三焦

答案：C

35、护士未认真核对，将患者液体输错，但及时发现未造成不良后果，该行为属于

A、二级甲等医疗事故

B、三级甲等医疗事故

C、四级医疗事故

D、意外事故

E、不属于医疗事故

答案：E

36、临床护理工作中，由一组护理人员应用护理程序的工作方法，共同完成对一组患者的护理工作称为

A、特护护理

B、小组护理

C、个案护理

D、综合护理

E、功能制护理

答案：B

37、一急诊患者在就诊过程中，护士没有询问患者有无青霉素过敏史即为患者做青霉素试验，造成患者休克死亡。护士的医疗过失行为所占的比重是

A、轻微责任

B、主要责任

C、次要责任

D、同等责任

E、完全责任

答案：E

38、护士小王在上夜班时，有一位患者的家属在熄灯后执意要进入病房探视，小王担心影响患者休息加以阻拦，但患者家属不听劝阻并和小王产生争执，第二天还投诉到护士长。护士长应首先做的工作是

A、了解情况

- B、训斥小王
- C、向家属解释
- D、向家属道歉
- E、告诉医生

答案：A

39、护士长因陈护士经常因为孩子请假、影响工作而不满；陈护士则认为护士长对她不体谅、缺乏人情味，为此两人关系一直比较紧张。影响她们关系的主要原因是

- A、角色压力过重
- B、经济压力过重
- C、角色责任模糊
- D、角色权利争议
- E、期望值差异

答案：E

40、领导影响力的权利性影响力是指

- A、知识因素
- B、资历因素
- C、品格因素
- D、感情因素
- E、才能因素

答案：B

41、大多数抗肿瘤药物的不良反应主要是

- A、低热
- B、黄疸
- C、少尿
- D、失眠头痛
- E、骨髓抑制胃肠道反应

答案：E

42、术后不需去枕平卧的麻醉方式是

- A、吸入麻醉
- B、硬膜外阻滞麻醉
- C、蛛网膜下腔阻滞麻醉
- D、静脉麻醉
- E、复合麻醉

答案：C

43、患者，女，63岁，因支气管扩张合并肺部感染、左心心力衰竭入院治疗，入院时体温39℃，呼吸急促，端坐呼吸。遵医嘱给予地高辛治疗，患者服用地高辛几天后，出现恶心、呕吐、视物模糊，护士应立即

- A、报告护士长
- B、给予止吐药
- C、做心电图检查
- D、做好患者心理护理
- E、停止服药并报告医生

答案：E

44、输入贮存过久的库存血时，易引起



英杰医学
YINGJIE.COM

- A、高钠血症
- B、低钙血症
- C、低钾血症
- D、高钾血症
- E、低钠血症

答案：D

45、某孕妇忘记了自己的末次月经，但肯定提前了不少时间分娩，娩出时婴儿身长 45cm，体重 2500g，皮下脂肪少，头发、指甲已达指端，估计该孕妇的可能为

- A、16 周末
- B、20 周末
- C、26 周末
- D、32 周末
- E、36 周末

答案：E

46、阴道豆渣样白带见于

- A、老年性阴道炎
- B、假丝酵母菌阴道炎
- C、滴虫阴道炎
- D、慢性宫颈炎
- E、外阴炎

答案：B

47、慢性宫颈炎最常见的病变是

- A、宫颈糜烂
- B、宫颈肥大
- C、宫颈息肉
- D、宫颈腺体囊肿
- E、宫颈糜烂炎

答案：A

48、引起产后出血最常见的原因是

- A、产道裂伤
- B、胎盘剥离不全
- C、宫缩乏力
- D、凝血机制障碍
- E、滞产

答案：C

49、肛裂发生的主要因素是

- A、长期腹泻
- B、进食辛辣食物
- C、长期排尿困难
- D、大便干硬
- E、肛管慢性炎症

答案：D

50、患者，男，32 岁，胃穿孔后行胃大部切除术，术后第 2 天突发右上腹部剧痛，伴明显腹膜刺激征。最可能发生了



英杰医学
YINGJIE.COM

- A、吻合口出血
- B、吻合口梗阻
- C、倾倒综合征
- D、十二指肠残端破裂
- E、吻合口近端空肠段梗阻

答案：D

51、患者，男性，46岁，阿米巴痢疾，为患者做保留灌肠时，应让患者采取右侧卧位，其目的是

- A、肝患者舒适安全
- B、缓解患者痛苦
- C、利于药液保留，提高疗效
- D、减轻药物毒副作用
- E、减少对患者刺激

答案：C

52、患者，女性，30岁，结核病，医嘱链霉素治疗，链霉素皮试发生过敏性休克而出现中枢神经系统症状，其原因是

- A、有效循环血容量锐减
- B、毛细血管扩张，通透性增加
- C、肺水肿
- D、肾衰竭
- E、脑组织缺氧

答案：E

53、患者，女性，35岁，需留取粪便标本检查蛲虫，护士应告知患者标本采集的时间是

- A、早餐后立即采集
- B、餐后4小时内
- C、上午11时
- D、午休后1小时内
- E、晚上睡觉前

答案：E

54、患者，女性，25岁。伤寒，体温38.5℃，不宜食用的食物是

- A、鸡蛋
- B、豆腐
- C、豆浆
- D、稠米粥
- E、鱼汤

答案：D

55、患儿，女，6岁，因家中起火造成大面积烧伤，护士应提供的护理级别是

- A、一级护理
- B、二级护理
- C、三级护理
- D、特级护理
- E、重症护理

答案：D

56、患者，女性，75岁，文盲，因头晕、头痛来医院就诊，对前来就诊的患者，门诊护士首

先应进行

- A、心理安慰
- B、卫生指导
- C、预检分诊
- D、用药指导
- E、查阅病历资料

答案：C

57、患者，女性，25岁。左下肢外伤后，未得到正确处理，而导致破伤风。为该患者左下肢伤口更换敷料后，其敷料处理方法是

- A、送焚烧炉焚烧
- B、过氧乙酸浸泡后清洗
- C、日光下暴晒后清洗
- D、丢入污物桶后再集中处理
- E、高压灭菌后再清洗

答案：A

58、患者，女性，60岁，腹泻，体温39~40℃，持续数日，诊断“细菌性痢疾”。此患者体温热型为

- A、稽留热
- B、波浪热
- C、弛张热
- D、间歇热
- E、不规则热

答案：A

59、患者，女性，75岁，因脑血栓导致左侧偏瘫。住院3天后，护士发现其右侧骶尾部皮肤发红，并伴有肿、热、痛，皮肤未破损。此患者右侧骶尾部皮肤的改变为压疮的

- A、浅度溃疡期
- B、坏死溃疡期
- C、深度溃疡期
- D、炎性浸润期
- E、淤血红润期

答案：E

60、患者，女性，30岁，静脉留置套管针第二天，今晨输液液体滴入不畅，局部无肿胀，检查有回血，护士首先应

- A、检查管道，抬高输液瓶位置
- B、更换针头重新穿刺
- C、盐水或肝素钠冲管
- D、减慢输液速度
- E、输液静脉上方热敷

答案：C

61、判断小儿体格发育的常用主要指标有

- A、体重身高、头围、腹围
- B、语言发育程度
- C、智力发育水平
- D、对外界反应能力

E、动作能力或运动能力

答案：A

62、前囟饱满多见于

A、佝偻病

B、头小畸形

C、呆小病

D、脑积水

E、甲状腺功能减低症

答案：D

63、乙肝疫苗初次免疫接种的年龄是

A、生后 24 小时内

B、2 个月以上

C、8 个月以上

D、3 个月以上

E、1 岁以上

答案：A

64、患者，男，50 岁。被诊断为胃癌晚期，患者对家属的照顾和护士工作不满，要求停止治疗，患者的心理反应属于

A、否认期

B、愤怒期

C、协议期

D、忧郁期

E、接受期

答案：B

65、母乳喂养有利于预防佝偻病的主要原因是

A、母乳中乳白蛋白含量多

B、不饱和脂肪酸多

C、糖含量高

D、SIgA 多

E、钙磷比例合适

答案：E

66、小儿断奶的季节的选择下列哪项更适宜

A、冬季

B、夏季

C、春秋季节

D、夏秋季

E、冬春季

答案：C

67、肝用蓝光疗法时，为肝患儿皮肤均匀受热，更换体位时间是

A、每 1 小时一次

B、每 2 小时一次

C、每 3 小时一次

D、每 4 小时一次

E、每 5 小时一次

答案：B

68、某儿2岁，发育正常，其膳食安排下列哪项是正确的

- A、随成人同吃普通膳食
- B、每日三餐外加点心3次
- C、日三餐外加点心2次，维生素D15万单位
- D、每日三餐外加点心1~2次，
- E、每日三餐以流食半流食为主

答案：D

69、青年女性患者，患支气管扩张多年，常反复咯血。就诊时又因剧烈咳嗽而致大咯血，在观察中突然发现咯血中止，病人表情恐怖，张口瞪眼，两手乱抓，应考虑发生下列何种紧急状况而需立即抢救

- A、肺梗塞
- B、窒息
- C、休克
- D、呼吸衰竭
- E、心力衰竭

答案：B

70、关于小儿腹泻的治疗措施，应除外

- A、纠正水、电解质紊乱
- B、严重脱水应及时补液
- C、及时服用止泻剂
- D、给予助消化药
- E、要注意补钾

答案：C

71、患者，男性，30岁，今晨在腰麻下行单纯肾切除术，术前护士为其插导尿管，目的是

- A、便于手术进行
- B、肝免术中出现尿失禁
- C、肝免术中误伤膀胱
- D、引出尿液，以防术中尿潴留
- E、术后冲洗尿道，以防感染

答案：D

72、患者，女性，40岁，因尿急、尿频、尿痛入院。遵医嘱行尿细菌培养，护士留取尿标本的方法是

- A、收集24h尿
- B、患者自己留尿
- C、留取中段尿
- D、留取前段尿
- E、导尿

答案：C

73、患者，女性，35岁，已婚，未育，体检发现宫颈中度糜烂，子宫颈刮片检查正常，针对该病患者最合适的处理是

- A、局部药物治疗
- B、宫颈锥切术
- C、口服抗生素

- D、物理治疗
- E、门诊随访观察

答案：D

74、患者，男性，85岁。无明显诱因出现精神失常，表现能凭空听到已故的亲人呼唤他，叫他也随他们而去，称自己走到哪里那些已故的亲人都跟着他，患者出现了

- A、正常人没有的知觉
- B、歪曲的知觉
- C、歪曲的感觉
- D、虚幻的知觉
- E、虚幻的感觉

答案：D

75、患抑郁症病人告诉你：“别在我这费时间了，去和那些值得你费功夫的人谈谈吧。”你的最佳反应是

- A、“不用担心，我有的是时间”
- B、“如果你不想说，我们就在这坐一会儿”
- C、“你这样孤独对你没有好处”
- D、“你这样说可不对”
- E、“别这么说，你应该振作一点”

答案：B

76、患者，男性，因车祸急诊，查体可见眶周和球结膜下瘀斑，鼻腔有血性液体流出，应考虑该患者可能存在

- A、颅前窝骨折
- B、硬脑膜外血肿
- C、硬脑膜下血肿
- D、颅中窝骨折
- E、颅后窝骨折

答案：A

77、患者，女性，67岁，车祸后出现下列损伤，现场护士急救时优先处理的是

- A、胸壁损伤
- B、张力性气胸
- C、右侧胫骨开放性骨折
- D、腓骨干骨折
- E、右前臂皮肤擦伤

答案：B

78、某肿瘤化疗患者，出现恶心、呕吐并伴有腹痛、腹泻，患者因此拒绝继续化疗，面对这种情况责任护士采取了诸多措施，但应除外

- A、加强营养支持
- B、观察腹痛腹泻情况，对症处理
- C、告知患者坚持化疗的重要性
- D、改成晚间给药，降低反应
- E、立即停药

答案：E

79、患者，男性，35岁，患有慢性胃溃疡7年。近日胃部疼痛，粪便颜色发黑。医生拟为患者行隐血试验。护士告诉患者3d内禁食的食物有

- A、面条
- B、猪肝
- C、白菜
- D、豆浆
- E、大米稀饭

答案：B

80、某医院的护理管理架构是护理部主任-科护士长-病区护士长。请问该医院护理管理的层次是

- A、一级
- B、二级
- C、三级
- D、四级
- E、五级

答案：C

81、患者，女性，47岁，拟行子宫切除术，护士在术前为其导尿时，发现手套有破洞。此时正确的处理方法是

- A、立即更换无菌手套
- B、用乙醇棉球擦拭破裂处
- C、用无菌治疗巾包裹手指操作
- D、用无菌医疗贴贴好破洞处再肝用
- E、为缩短操作时间，减轻患者痛苦，继续操作

答案：A

82、患者，女性，60岁，有心脏病史，可疑直肠癌，准备进行直肠指检，护士应协助患者采用的体位是

- A、端坐卧位
- B、中凹卧位
- C、膝胸卧位
- D、俯卧位
- E、仰卧位

答案：C

83、患者，女性，38岁，因外伤瘫痪导致尿失禁，留置导尿，尿液出现浑浊、色黄，护理时应注意

- A、进行膀胱冲洗
- B、观察尿量并记录
- C、促进膀胱功能恢复
- D、及时更换导尿管
- E、经常清洗尿道口

答案：A

84、患者，男性，25岁，注射青霉素过程中，觉头晕、胸闷、面色苍白、脉细弱、血压下降，应立即注射的药物是

- A、异丙嗪
- B、氢化可的松
- C、去甲肾上腺素
- D、尼可刹米

E、盐酸肾上腺素

答案：E

85、患者，男性，45岁，风湿性心脏病伴心功能不全，双下肢及身体下垂部位严重水肿，该患者每日饮食中应控制

- A、摄入盐量不超过0.5g
- B、摄入盐量不超过2g
- C、摄入钠量不超过0.5g
- D、摄入钠量不超过2g
- E、摄入盐量不超过4g

答案：D

86、患者，女性，36岁，车祸。患者外伤致脾破裂，除立即手术外尚需输入大量血液。给患者输入大量库存血，护士应注意防止发生

- A、低血钾，碱中毒
- B、高血钾，酸中毒
- C、高血钠，酸中毒
- D、低血钾，酸中毒
- E、高氯，碱中毒

答案：B

87、患者，女性，36岁，车祸。患者外伤致脾破裂，除立即手术外尚需输入大量血液。给患者输入的是两个献血员的血液，护士在中间应输入

- A、5%葡萄糖注射液
- B、5%葡萄糖氯化钠注射液
- C、10%葡萄糖酸钙注射液
- D、生理盐水注射液
- E、3%~5%氯化钠注射液

答案：D

88、患者，女性，36岁，车祸。患者外伤致脾破裂，除立即手术外尚需输入大量血液。为防止过敏反应发生，护士可给患者肌肉注射

- A、阿托品
- B、肾上腺素
- C、异丙嗪
- D、强心苷类药物
- E、盐酸肾上腺素

答案：C

89、患者，女性，36岁，车祸。患者外伤致脾破裂，除立即手术外尚需输入大量血液。如库存血不够，需临时找献血员，下列可做献血员的是

- A、几年前患过伤寒者
- B、有肝炎史者
- C、有过敏史者
- D、发热者
- E、凝血功能异常者

答案：A

90、患者，男性，50岁，近日来反复上腹疼痛，进食后3h左右疼痛明显，进餐后可缓解，夜间有明显的上腹痛，排黑粪4d。

考虑诊断为

- A、胃溃疡出血
- B、胃癌出血
- C、急性胰腺炎
- D、门静脉高压出血
- E、十二指肠溃疡出血

答案：E

91、患者，男性，50岁，近日来反复上腹疼痛，进食后3h左右疼痛明显，进餐后可缓解，夜间有明显的上腹痛，排黑粪4d。

护士为患者首先要采取的护理措施是

- A、立即输血
- B、心理疏导
- C、卧床休息
- D、进食温凉的流食
- E、禁食和胃肠减压

答案：E

92患者，男性，50岁，近日来反复上腹疼痛，进食后3h左右疼痛明显，进餐后可缓解，夜间有明显的上腹痛，排黑粪4d。

医生给予患者法莫替丁20mg口服，护士应如何指导患者服此药

- A、餐前服用
- B、餐中服用
- C、餐后1h服用
- D、晨起空腹服
- E、嚼碎服

答案：B

93患者，男性，35岁，患乙型肝炎住院50天，痊愈出院。

护士对床单位的处理应除外

- A、床垫、褥、棉胎暴晒4h
- B、病室用2%过氧乙酸加热熏蒸2h
- C、消毒时应关闭门窗
- D、消毒液擦拭病床、床旁桌椅
- E、消毒后开窗通风，铺好备用床

答案：A

94患者，男性，35岁，患乙型肝炎住院50天，痊愈出院。消毒患者的毛巾，最佳的方法是

- A、喷雾消毒
- B、微波消毒
- C、日光暴晒
- D、高压消毒
- E、环氧乙烷熏蒸

答案：E

95患者，男性，35岁，患乙型肝炎住院50天，痊愈出院。消毒患者的信件、票证，宜采用的方法是

- A、高压消毒
- B、微波消毒

- C、日光暴晒
- D、甲醛熏蒸消毒
- E、环氧乙烷熏蒸

答案：D

96 患者，女性，26 岁。已婚，未生育，停经 2 个月余，阴道不规则出血 1 周，自测尿妊娠试验阳性，血 HCG 高于正常妊娠月份，B 超提示子宫大于正常妊娠月份，双侧卵巢有黄素化囊肿。

可能的诊断为

- A、葡萄胎
- B、异位妊娠
- C、先兆流产
- D、不全流产
- E、难免流产

答案：A

97 患者，女性，26 岁。已婚，未生育，停经 2 个月余，阴道不规则出血 1 周，自测尿妊娠试验阳性，血 HCG 高于正常妊娠月份，B 超提示子宫大于正常妊娠月份，双侧卵巢有黄素化囊肿。

此患者确诊后首先应行

- A、预防性化疗
- B、手术切除卵巢
- C、子宫全切术
- D、清除宫腔内容物
- E、遵医嘱给止血药物

答案：D

98 患者，女性，26 岁。已婚，未生育，停经 2 个月余，阴道不规则出血 1 周，自测尿妊娠试验阳性，血 HCG 高于正常妊娠月份，B 超提示子宫大于正常妊娠月份，双侧卵巢有黄素化囊肿。

患者同时有慢性宫颈炎，患者思想压力较大，护士解释慢性宫颈炎最常见的病变是

- A、宫颈滑膜炎
- B、宫颈腺囊肿
- C、宫颈息肉
- D、宫颈肥大
- E、宫颈糜烂

答案：E

99 患者，女性，35 岁，“胃切除术”4 年。近 2 年患者头晕、心悸、气短，疲乏无力。

诊断为缺铁性贫血。

导致患者贫血的原因可能是

- A、铁吸收不良
- B、铁不能利用
- C、饮食中供铁不足
- D、损失铁过多
- E、育龄期女性需铁量增加

答案：A

100 患者，女性，35 岁，“胃切除术”4 年。近 2 年患者头晕、心悸、气短，疲乏无力。

诊断为缺铁性贫血。

指导患者口服铁剂的要点应除外

- A、用吸管服用液体铁剂，肝免牙齿染色
- B、如有消化道反应，可与果汁同服
- C、可同服茶，促进铁吸收
- D、宜于进餐后服用
- E、血红蛋白正常后，需继续服铁 6~8 周

答案：C

101、导致左心衰竭症状的原因主要是

- A、心室颤动
- B、高血压
- C、体循环淤血
- D、肺循环淤血
- E、循环血量减少

答案：D

102、患者患急性细菌性痢疾，每天排脓血便 7~8 次，下述护理措施错误的是

- A、补充电解质
- B、鼓励患者多饮水，卧床休息
- C、温水局部坐浴后肛门涂凡士林
- D、需执行接触隔离
- E、排便后用软纸擦拭肛门

答案：D

103、给肝硬化腹水患者腹腔穿刺放液时应注意

- A、加强静脉补液
- B、束紧多头腹带
- C、指导患者限制饮水
- D、观察尿量是否减少
- E、取平卧位

答案：B

104、肛门坐浴的作用不包括

- A、缓解肛门括约肌痉挛
- B、有止血作用
- C、促进炎症吸收
- D、增加局部血液循环
- E、清洁作用

答案：B

105、皮肤白皙的贫血患者就诊，护士检查时最能反映贫血的部位是

- A、面颊皮肤及上腭黏膜
- B、手背皮肤及口腔黏膜
- C、耳廓皮肤
- D、颈部皮肤及舌面
- E、睑结膜指甲、口唇

答案：E

106、患者男性，67 岁，患慢性支气管炎，近几天咳嗽加剧，痰液黏稠，不易咳出，给予超

声雾化吸入治疗，首选的药物是

- A、青霉素
- B、氨茶碱
- C、地塞米松
- D、沙丁胺醇
- E、 α -糜蛋白酶

答案：E

107、患者女性，64岁。因头晕、头痛3天就医，查体：血压165/105mmHg，可考虑为

- A、正常高限
- B、单纯收缩压期高血压
- C、I级高血压
- D、II级高血压
- E、III级高血压

答案：D

108、治疗慢性再生障碍性贫血的首选药是

- A、糖皮质激素
- B、免疫抑制剂
- C、造血因子
- D、雄激素
- E、雌激素

答案：D

109、对甲状腺功能亢进症重度浸润性突眼的护理不应

- A、抬高头部
- B、鼓励多食含碘食品
- C、外出时用眼罩
- D、生理盐水纱布局部湿敷
- E、抗生素眼膏涂眼

答案：B

110、患者男性，53岁。消化性溃疡病史10年，近2个月来上腹痛呈现无规律性，伴有失眠、体重下降。X线钡餐检查提示有龛影，患者下一步首先要进行的检查

- A、幽门螺杆菌检测
- B、胃液分析
- C、胃镜检查与黏膜活检
- D、B超
- E、CT

答案：C

111、患儿，2个月。发热2天。体温高达38.9℃~39.8℃，面色苍白，呻吟，呼吸困难，呼吸55~65次/分，心率160~180次/分，心音低钝，肝肋下2cm，双肺可闻及中量的细小啰音，X线片示双肺大小不等的片状阴影，WBC $13 \times 10^9/L$ ，此患儿应用抗生素的时间应为

- A、7~10天
- B、10~14天
- C、体温正常后
- D、体温正常后3天
- E、临床症状消失后3天

答案：E

112、患者男性，78岁。反复咳嗽、喘息20年，5年前诊断为COPD，2天前合并肺部感染入院。目前患者的医疗诊断是肺源性心脏病，患者首先应选用的药物是

- A、洋地黄
- B、抗生素
- C、利尿剂
- D、糖皮质激素
- E、抗心律失常药

答案：B

113、患者男性，65岁。肝癌肝叶切除术后第1天，患者感心慌、气促、出冷汗，血压12/8kPa(90/60mmHg)，首先应考虑

- A、胆汁性腹膜炎
- B、肠梗阻
- C、肝断面出血
- D、膈下脓肿
- E、阑尾炎

答案：C

114、患者女性，62岁。胃癌，血压150/95mmHg，中度贫血，消瘦，术前准备不是必要的项目是

- A、纠正贫血
- B、改善营养状态
- C、检测肝功能
- D、血压降至正常
- E、血生化检查

答案：D

115、老年人虽然死记硬背能力减退，但理解能力变化不大，因此保持比较好的记忆是

- A、近期记忆
- B、逻辑记忆
- C、机械记忆
- D、次级记忆
- E、远期记忆

答案：B

116、六淫的概念是

- A、内风、内寒、内暑、内湿、内燥、内火
- B、风寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪的统称
- C、风寒、暑、湿、燥、火在正常情况下称为“六气”
- D、内风、内寒、内暑、外湿、外燥、外火
- E、外风、外寒、外暑、外湿、外燥、外火

答案：B

117、论治的主要依据是

- A、辨证的结果
- B、病因
- C、病位
- D、病性



E、病

答案：A

118、属于医疗事故的除外

- A、护士严格询问过敏史和家族史后进行青霉素皮试，患者在试验后突然死亡
- B、护士执行肌内注射时因消毒不严格导致患者注射局部深部脓肿
- C、护士没有严格查对输错药物致患者休克，但抢救及时
- D、患者在加压输液时因无人守护，致患者发生空气栓塞而死亡
- E、臀部肌内注射时损伤患者坐骨神经，导致腿部残疾

答案：A

119、王主任是某护理部主任，她把工作分配给总护士长等管理人员，对于例行性业务按照常规措施和标准执行，她加以必要的监督和指导，只有特殊情况时她来处理她可集中精力研究及解决全局性管理问题，也调动了下级的工作积极性这种工作方式遵循的组织原则是

- A、精干高效原则
- B、集权分权结合原则
- C、专业化分工与协作的原则
- D、任务和目标一致的原则
- E、执行与监督分设原则

答案：B

120、护士从事护理活动唯一合法的法律文书是

- A、医疗事故处理条例
- B、护士条例
- C、护士管理办法
- D、护士执业证书
- E、护理或助产专业毕业证书

答案：B

(三)

1、符合慢性阻塞性肺气肿的体征是

- A、叩诊呈鼓音
- B、单侧语颤减弱
- C、单侧呼吸运动减弱
- D、气管偏移
- E、呼气时间延长

答案：E

2、一般体检测量脉搏的方法中，正确的是

- A、可用拇指诊脉
- B、病人剧烈活动后立即测量
- C、有脉搏短绌，应两人同时分别测量心率、脉率
- D、测量部位只有桡动脉
- E、测量前不必作解释工作

答案：C

3、正常人瞳孔直径为

- A、1~2mm

- B、2~5mm
- C、3~6mm
- D、5~7mm
- E、7mm 以上

答案： B

4、意识丧失病人的卧位常为

- A、自动体位
- B、被动体位
- C、患侧卧位
- D、端坐位
- E、仰卧位

答案： B

5、胃癌常向下列哪处淋巴结转移

- A、颈部淋巴结
- B、左腋下淋巴结
- C、左锁骨上淋巴结
- D、左锁骨下淋巴结
- E、左腹股沟淋巴结

答案： C

6、浅昏迷与深昏迷的区别是

- A、有无自主运动
- B、有无大小便失禁
- C、对声、光的反应
- D、是否能被唤醒
- E、角膜反射、瞳孔对光反射及防御反射是否存在

答案： E

7、闻及两肺满布湿啰音，应考虑

- A、阻塞性肺气肿
- B、急性肺水肿
- C、支气管哮喘
- D、支气管扩张
- E、肺脓肿

答案： B

8、病人呼吸气味中有大蒜味，应考虑

- A、尿毒症
- B、酮症酸中毒
- C、有机磷农药中毒
- D、肺癌
- E、支气管感染

答案： C

9、患者，男性，65岁，常年有咳嗽，咳少量白痰。近4个月咳嗽加剧，偶有血痰、乏力、低热，抗感染治疗效果不显著。胸部X线检查未见异常。患者吸烟18年，每天1包。首先考虑可能的情况是

- A、慢性咽喉炎



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

-
- B、慢性支气管炎
 - C、支气管哮喘
 - D、支气管肺癌
 - E、肺炎

答案：D

10、做内生肌酐清除率检查，实验前三天的饮食是

- A、高热量饮食
- B、高蛋白饮食
- C、无肌酐饮食
- D、多纤维素饮食
- E、正常饮食

答案：C

11、水痘患者作为唯一的传染源，其具有传染性的时段为

- A、潜伏期
- B、出疹期
- C、出前 10 天至出疹后 5 天
- D、出疹前 10 天至第一批疹退
- E、出疹前 1~2 天至全部疱疹结痂

答案：E

12、肾病综合征初期水肿的特点是（）

- A、全身水肿明显
- B、眼睑、面部水肿为主
- C、水肿呈低垂性水肿
- D、无胸腹水发生
- E、水肿一般不严重

答案：B

13、一氧化碳中度中毒的典型体征是

- A、四肢乏力
- B、意识模糊
- C、血压上升
- D、口唇樱桃红色
- E、呼吸、循环衰竭

答案：D

14、人工肛门的护理方法正确的是

- A、禁忌扩张造口
- B、定时灌肠，训练排便习惯
- C、造口袋内排泄物超过 3/4 时应更换造口袋
- D、肛门袋宜长期持续使用，少更换
- E、局部皮肤保持湿润

答案：B

15、尿液呈酱油色的疾病是

- A、阻塞性黄疸
- B、急性溶血
- C、肝细胞性黄疸



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

- D、恶性痢疾
- E、晚期血丝虫病

答案：B

16、诊断癫痫最有价值的检查是

- A、CT
- B、MRI
- C、脑电图
- D、心导管检查
- E、脑血管造影

答案：C

17、女性各阶段的生理特点正确的是

- A、儿童后期卵巢内的卵泡有一定发育，但并不分泌性激素
- B、青春期是卵巢生殖内分泌功能最旺的时期
- C、月经初潮标志生殖器官发育成熟
- D、围绝经期一般历时半年
- E、绝经过渡期的突出表现为卵巢功能逐渐衰退

答案：E

18、单纯性甲状腺肿的主要病因是

- A、缺碘
- B、甲状腺素释放障碍
- C、甲状腺素合成障碍
- D、食用海产品过多
- E、垂体功能减弱

答案：A

19、早产儿生理性黄疸血胆红素最高不超过

- A、330 $\mu\text{mol/L}$
- B、256.5 $\mu\text{mol/L}$
- C、205.2 $\mu\text{mol/L}$
- D、543 $\mu\text{mol/L}$
- E、120 $\mu\text{mol/L}$

答案：B

20、深静脉血栓形成的患者，抗凝治疗期间最严重的并发症是

- A、出血
- B、继发性感染
- C、动脉痉挛
- D、血栓与静脉壁粘连并逐渐退化
- E、形成再通静脉

答案：A

21、术后半卧位的目的不包括

- A、利于引流
- B、利于呼吸
- C、利于循环
- D、防止膈下脓肿
- E、利于排尿

答案：E

22、有关癌肿的特征，不正确的是

- A、表面高低不平
- B、界限不清
- C、固定，不活动
- D、质地坚硬
- E、早期就有疼痛

答案：E

23、以下移植方法哪一类存活率最高

- A、自体移植
- B、同质移植
- C、充分配血及组织配型后移植
- D、同种异体移植
- E、异种异体移植

答案：A

24、乳腺癌根治术后护理，以下哪项有利于伤口愈合

- A、加强口腔护理
- B、术后三天帮助病人活动患肢
- C、鼓励咳痰
- D、半卧位利于引流
- E、保持皮瓣下负压吸引通畅

答案：E

25、急性脓胸具有确诊意义的是

- A、胸痛、气促
- B、肋间饱满
- C、呼吸音减弱
- D、X线片示大片浓密阴影
- E、胸穿抽出脓液

答案：E

26、胸外伤后，出现胸壁软化，是因为

- A、单根肋骨单处骨折
- B、相邻多根肋骨多处骨折
- C、单根肋骨多处骨折
- D、多根肋骨单处骨折
- E、胸骨骨折

答案：B

27、幽门梗阻患者因长期呕吐会造成

- A、低钾低氯性代谢性碱中毒
- B、低钾高氯性代谢性酸中毒
- C、高钾低氯性呼吸性碱中毒
- D、低钾低氯性代谢性酸中毒
- E、高钾低氯性代谢性碱中毒

答案：A

28、急性腹膜炎发生休克的主要原因



-
- A、剧烈疼痛
 - B、腹膜吸收大量毒素，血容量减少
 - C、肠内积液刺激
 - D、大量呕吐失液
 - E、腹胀引起呼吸困难

答案：B

29、关于直疝三角，不正确的叙述是

- A、腹股沟斜疝由此突出
- B、外侧边为腹壁下动脉
- C、内侧边为腹直肌外边缘
- D、底边为腹股沟韧带内侧
- E、腹股沟斜疝内环位于其外侧

答案：A

30、白先生，32岁，既往有胃病史，近一周来，常感上腹部不适，4小时前突发上腹部剧烈疼痛，伴有恶心、呕吐，查体：腹部压痛、肌紧张，肝浊音界缩小，X线检查可见膈下游离气体，首先考虑

- A、急性阑尾炎穿孔
- B、胆囊炎穿孔
- C、急性胰腺炎
- D、溃疡病穿孔
- E、急性肠梗阻

答案：D

31、以下哪项为缺铁性贫血患者较常见的受损害部位

- A、呼吸道
- B、淋巴结
- C、泌尿道
- D、消化道
- E、皮肤黏膜

答案：E

32、社区获得性肺炎最常见的病原菌是

- A、立克次体
- B、金黄色葡萄球菌
- C、溶血性链球菌
- D、衣原体
- E、肺炎链球菌

答案：E

33、下列食物中属于痛风患者可以选择食用的是

- A、鸡肝
- B、黄豆
- C、海鲜类
- D、牛奶
- E、牛肉汤

答案：D

34、糖尿病专科护士向病区的糖尿病患者做健康宣教时，告诉患者，糖尿病患者常合并眼部

疾病及肾脏病变，原因是

- A、小动脉病变
- B、主动脉病变
- C、微血管病变
- D、小血管病变
- E、深动脉病变

答案：C

35、患者，女性，25岁，每次月经过多，持续时间长，头晕耳鸣、心悸、乏力、贫血、面色苍白、气短。血常规提示：小细胞低色素性贫血。护士判断其贫血为

- A、出血性贫血
- B、缺铁性贫血
- C、再生障碍性贫血
- D、溶血性贫血
- E、维生素12缺乏

答案：B

36、患者，女性，40岁。胃大部切除术后第6d，当班护士观察到患者体温上升至38.7℃，诉切口疼痛。该护士首先考虑患者为

- A、外科热
- B、切口感染
- C、盆腔脓肿
- D、吻合口瘘
- E、切口裂开

答案：B

37、患儿，14个月，因发热、咳嗽、食欲降低、呕吐4d后出现惊厥入院。体检：体温39.5℃，咽部充血明显，前囟平坦。分诊护士考虑该患儿惊厥的原因首先可能是

- A、急性脑炎
- B、低血糖
- C、癫痫持续状态
- D、缺血缺氧性脑病
- E、高热惊厥

答案：E

38、某产妇，30岁，骨盆外测量显示：入口前后径9.5cm，对角径11cm，其他无异常。孕

39周时胎心正常，行缩宫素静脉滴注试产。护士发现产妇在试产过程中很焦虑，该护士给予的护理措施正确的是

- A、专人看护
- B、用宫缩后灌肠
- C、可应用少量镇静药
- D、勤肛查
- E、试产2~4h，胎头仍未入盆，加强宫缩

答案：A

39、患儿男，胎龄36周出生。护士发现患儿出生后3d出现皮肤黄染，现黄疸未消退，无发热，吃奶好，面部及躯干皮肤黄染，血胆红素172μmol/L(10mg/dl)。该护士首先应考虑的是

- A、母乳性黄疸

- B、新生儿泌尿道感染
- C、新生儿甲状腺功能亢进
- D、先天性胆道闭锁
- E、生理性黄疸

答案：E

40、患者，女性，40岁，患肝硬化6年。近日感腹胀、呼吸困难。B超示大量腹水。护士采取的护理措施应除外

- A、安置患者平卧位
- B、严格限制水、盐摄入
- C、预防压疮
- D、严格记录尿量
- E、预防感染

答案：A

41、临产后的主要产力是

- A、腹肌收缩力
- B、膈肌收缩力
- C、产妇向下屏气
- D、子宫收缩力
- E、肛提肌收缩力

答案：D

42、出生后多长时间内将新生儿俯卧在母体胸前

- A、30分钟内
- B、40分钟内
- C、50分钟内
- D、60分钟内
- E、70分钟内

答案：A

43、痛经，下述哪项不正确

- A、原发性痛经生殖器官无器质性病变
- B、继发性痛经生殖器官有器质性病变
- C、多发于无排卵型月经
- D、痛经常于行经前数小时开始
- E、痛经者可用解痉药

答案：C

44、子宫脱垂是指子宫颈外口达

- A、坐骨结节水平以上
- B、坐骨结节水平以下
- C、坐骨棘水平以上
- D、坐骨棘水平以下
- E、骶尾骨以下

答案：D

45、哪段时期可做阴道灌洗

- A、月经期
- B、妊娠期



英杰医学
YINGJIE.COM

- C、产褥期
- D、排卵期
- E、阴道流血期

答案：D

46、急性肾小球肾炎最主要的临床表现是

- A、水肿、少尿、高血压、蛋白尿
- B、水肿、少尿、血尿、高血压
- C、水肿、少尿、蛋白尿、血尿
- D、蛋白尿、氮质血症、高血压
- E、血尿、少尿、高血压、氮质血症

答案：B

47、护患语言沟通的基本原则是

- A、指导性
- B、强制性
- C、广泛性
- D、规范性
- E、灵活性

答案：D

48、某妇产科护士，针对子宫肌瘤的病人，从入院到出院按照时间要求和工作顺序，与医生等合作团队，为病人提供整体照顾计划，护士采用的这种护理方式是

- A、小组护理
- B、个案护理
- C、临床路径
- D、责任制护理
- E、功能制护理

答案：C

49、几种沟通媒介相互冲突属于

- A、编码障碍
- B、发送障碍
- C、接收障碍
- D、反馈障碍
- E、沟通通道的障碍

答案：E

50、以下属于病人履行了权利的情形是

- A、病人丧失自主能力时，护士应听从家属意见
- B、晚上十点病人仍在病室和来访的亲友聊天
- C、护士如实记录病人的治疗方案和病情变化
- D、护士照顾传染病病人，应得到防护用具和工资补助
- E、医生动员病人抽血以获得免费实验用药，病人拒绝

答案：E

51、患者男性，76岁。慢性支气管炎24年，护士收集的资料中属于主观资料的是

- A、肺部听诊可闻及干湿啰音
- B、体温38.7℃
- C、氧分压6.8kPa



金英杰医学

DINYINGJIE.COM

D、咳黄色黏痰

E、咳嗽无力

答案：E

52、患者男性，53岁，两天前以急性心肌梗死急诊入院，患者吸氧的目的是

A、减少疼痛

B、改善心肌缺氧

C、增加活动耐力

D、预防心力衰竭

E、促进梗死心肌恢复

答案：B

53、新生儿，生后1天。其母阅读很多关于婴儿营养食品及喂养方式的宣传资料，希望从中选择最佳喂养方案。护士告知，出生6个月内的婴儿最好的喂养方法是

A、肝合喂养

B、纯母乳喂养

C、奶粉喂养

D、牛奶喂养

E、羊奶喂养

答案：B

54、患儿，1岁半，因腹泻3天，无尿6小时入院，目前经补液治疗后已排尿，护士遵医嘱给予继续补液400ml，该液体中最多可加入10%氯化钾

A、6ml

B、8ml

C、10ml

D、12ml

E、14ml

答案：D

55、患儿，女，6岁。皮肤同一部位出现丘疹、水疱，有的水疱内含清亮液体，有的呈脓性液，还有的已破溃结痂。护士根据患儿皮疹特点考虑是

A、风疹

B、水痘

C、麻疹

D、猩红热

E、药疹

答案：B

56、足月新生儿，女，生后1天，出生时有产钳助产史，生后4小时发现患儿两眼凝视，偶有尖叫，查体：心肺听诊无异常，拥抱反射减弱，前囟紧张，诊断为新生儿颅内出血。主要的护理诊断是

A、营养失调

B、清理呼吸道无效

C、皮肤完整性受损的危险

D、潜在并发症：颅内压力增高

E、感染的危险

答案：D

57、患儿男，3岁，发现心脏杂音，确诊室间隔缺损3年，近日来，患儿无诱因出现持续性

青紫，该患儿可能出现

- A、差异性青紫
- B、呼吸衰竭
- C、心力衰竭
- D、缺血缺氧性脑病
- E、艾森门格综合征

答案：E

58、患儿，2岁，发热2天后口角、舌面及齿龈处出现成簇小水疱，部分破溃成溃疡，颌下淋巴结肿大，咽充血，心肺正常。护士考虑该患儿的疾病是

- A、鹅口疮
- B、疱疹性口腔炎
- C、溃疡性口腔炎
- D、疱疹性咽峡炎
- E、咽结合膜热

答案：B

59、患儿，女，5岁，确诊水痘。抗病毒治疗首选药物为

- A、肾上腺皮质激素
- B、阿司匹林
- C、阿昔洛韦
- D、利巴韦林
- E、阿米卡星

答案：C

60、对于下肢急性深静脉血栓形成患者，正确的护理措施是

- A、床上活动
- B、卧床休息，患肢抬高
- C、行走练习
- D、患肢热敷
- E、按摩，促进血液循环

答案：B

61、患者，男性，60岁，慢性充血性心力衰竭，医嘱：地高辛0.25mg.qd，护士发药时应首先注意

- A、给药前测血压
- B、发药到口
- C、嘱患者服药后多喝水
- D、给药前测脉率（心率）及节律
- E、患者按时服药

答案：D

62、患者，女性，56岁，风心病伴二尖瓣狭窄6年，伴心房颤动4年，无明显原因突然出现意识障碍，最可能的原因是

- A、心排出量减少，脑供血不足
- B、高凝状态，脑血栓形成
- C、心房血栓脱落，脑栓塞
- D、发生房颤
- E、发生室颤

答案：C

63、患者，男性，62岁因突发心前区疼痛，疼痛难忍，并伴有胸闷憋气，来医院就诊，患者既往有糖尿病史12年。诊断为广泛前壁心肌梗死，入院后有心律失常，预示室颤发生的心律失常是

- A、I型房室传导阻滞
- B、偶发室早
- C、室性心动过速
- D、窦性心动过缓
- E、窦性心律不齐

答案：C

64、患者，男性，10年前因急性化脓性阑尾炎行阑尾切除术，半年后出现切口疝，最可能的原因是

- A、前列腺肥大
- B、早期活动
- C、术后并发肠痿
- D、曾有切口感染
- E、术后曾有腹腔内感染

答案：D

65、患者，男性，17岁，因外出春游去植物园，出现咳嗽、咳痰伴喘息2天入院喘息貌，口唇发绀，在肺部可闻及广泛哮鸣音，诊断是支气管哮喘，下面哪种是控制症状的首选药

- A、氨茶碱
- B、氨苯那敏
- C、白三烯
- D、色甘酸钠
- E、 β_2 受体激动剂

答案：E

66、患儿男，2岁，PPD试验硬结直径21mm,未接种过卡介苗，护士考虑该患儿可能是

- A、非典型结核分支杆菌感染
- B、免疫功能低下
- C、既往有结核感染
- D、原发免疫缺陷病
- E、体内有活动性肺结核

答案：E

67、患者，女性，30岁，孕10周，突发下腹阵发性疼痛伴阴道大量出血，呈贫血貌。检查：宫口已开，有组织堵塞，子宫较孕周略小，应采取的护理措施是

- A、刮出堵塞物送病理检查
- B、心理护理
- C、输血
- D、通知医生来后再进行抢救
- E、术后测量生命体征2次/d

答案：A

68、孕妇，28岁，经产妇，孕39周，因腹痛难忍急诊入院。检查宫口已开4cm，住院处护士应首先

- A、送入产房待产

- B、办理入院手续
- C、给予吸氧
- D、嘱绝对卧床休息
- E、让产妇步行进入病区

答案：A

69、初产妇，住院待产期间，突发胎儿宫内窘迫，拟紧急行剖宫产术，护士为其行术前准备，正确的是

- A、能排尿者不必插尿管
- B、情况紧急不必备皮
- C、温肥皂水灌肠
- D、常规注射镇静药
- E、常规复查胎心音

答案：E

70、初产妇，35岁，孕39周，半夜阴道流出水样物约300ml急诊入院，诊断为胎膜早破，护士应为患者采取的卧位是

- A、头高足低位
- B、头低足高位
- C、膝胸卧位
- D、俯卧位
- E、截石位

答案：B

71、患者男性，35岁，因股骨干骨折给予持续骨牵引，下列护理不妥的是

- A、抬高床脚
- B、常测患肢长度
- C、足部不抵床栏
- D、鼓励按照要求做患肢活动
- E、及时清除骨针孔血痂

答案：E

72、王先生，65岁。突然出现心前区疼痛伴大汗3小时，急诊就医，诊断为急性心肌梗死。给患者的护理措施中，下列正确的是

- A、鼓励患者大量进食
- B、尽量避免搬运
- C、增加探望，增加信心
- D、静脉输液速度宜快
- E、如有便秘立即灌肠

答案：B

73、患者男性，45岁，诊断为胆总管结石，拟行胆总管切开取石、T管引流术，放置T管的目的不包括

- A、引流胆汁
- B、引流残余结石
- C、引流腹腔渗液
- D、经T管造影
- E、支撑胆道

答案：C

74、患者女性，30岁，近3个月经常排便后滴少量鲜血。肛门指检无异常发现，肛门镜检查截石位见3、6点各有一突于肛管内的暗红色圆形软结节，考虑该病人为

- A、Ⅰ期内痔
- B、Ⅱ期内痔
- C、Ⅲ期内痔
- D、Ⅳ期内痔
- E、直肠息肉

答案：A

75、患者女性，45岁。行乳腺癌根治术后，为预防皮下积液及皮瓣坏死的主要措施是

- A、半卧位
- B、加压包扎伤口
- C、抬高同侧上肢
- D、局部沙袋压迫
- E、引流管持续负压吸引

答案：E

76、3~6个月患儿，维生素D缺乏性佝偻病多见的骨骼改变是

- A、方颅
- B、颅骨软化
- C、肋骨串珠
- D、手镯脚镯征
- E、下肢畸形

答案：B

77、患者，女性，32岁，今晨在腰麻下行子宫肌瘤切除术，术前护士为其插导尿管，请问插导尿管的目的是

- A、避免术中出现尿潴留
- B、避免术中出现尿失禁
- C、便于切除肿瘤
- D、避免术中误伤膀胱
- E、保护肾脏

答案：D

78、患者男性，60岁，进行性黄疸2个月。诊断为胰头癌，行胰十二指肠切除术，术后5天突然出现上腹疼痛，腹腔穿刺抽出含胆汁的液体少许。病人可能出现了

- A、膈下脓肿
- B、术后急性腹膜炎
- C、嵌顿性内疝
- D、胆囊穿孔
- E、胰、空肠吻合口漏

答案：E

79、颅内压增高明显时，应避免

- A、CT检查
- B、MRI检查
- C、腰椎穿刺
- D、脑血管造影
- E、颅脑多普勒检查

答案：C

80、用格拉斯哥昏迷评分量表测定意识障碍程度，浅昏迷评分是

- A、<15 分
- B、<12 分
- C、<9 分
- D、<7 分
- E、<3 分

答案：C

81、患者，女性，50 岁，既往风心病 10 年，夜间睡眠中突起口角歪斜、口齿不清、左上肢无力 3 天入院，考虑

- A、脑出血
- B、脑栓塞
- C、脑血栓形成
- D、蛛网膜下腔出血
- E、短暂性脑缺血发作

答案：B

82、患者，女性，32 岁，甲状腺功能试验检查，护士指导患者检查期间忌食

- A、芹菜
- B、花菜
- C、紫菜
- D、西兰花
- E、西红柿

答案：C

83、患者，男性，54 岁，胆结石，明天做胆囊切除手术，首选交谈内容为

- A、吸烟危害
- B、减轻疼痛方法
- C、鼓励患者战胜疾病
- D、规律饮食的重要性
- E、术前健康指导

答案：E

84、患者，女性，撞伤后右上腹剧烈疼痛，呼吸 35 次 / 分，脉搏 102 次 / 分，血压 90/65mmHg，诱因不明，禁止使用的药物为

- A、安痛定
- B、非那根
- C、鲁米那
- D、吗啡
- E、6-氨基乙酸

答案：D

85、患者，男性，同时服几种药物，应最后服用的是

- A、抗生素
- B、止咳糖浆
- C、发汗类药物
- D、磺胺类药物
- E、降压药

答案：B

86 患者，女性，28 岁，分娩时会阴部侧切，现切口部位出现红、肿、热、痛，给予红外灯局部照射、照射时间宜控制在

- A、5 分钟
- B、10 分钟
- C、10~20 分钟
- D、20~30 分钟
- E、40 分钟

答案：D

87 患者，女性，28 岁，分娩时会阴部侧切，现切口部位出现红、肿、热、痛，给予红外灯局部照射、照射过程中发现局部皮肤出现紫红色，应采取的措施是

- A、立即停用，局部涂凡士林
- B、抬高照射距离
- C、局部纱布覆盖
- D、改用热湿敷
- E、换用低功率灯头

答案：A

88 患者，女性，28 岁，分娩时会阴部侧切，现切口部位出现红、肿、热、痛，给予红外灯局部照射、照射完，需嘱患者休息 15 分钟再离开治疗室，目的是

- A、防止晕倒
- B、观察疗效
- C、减轻疼痛
- D、预防感冒
- E、促进炎症局限

答案：D

89 患者，女性，28 岁，分娩时会阴部侧切，现切口部位出现红、肿、热、痛，给予红外灯局部照射、查体：T38.8℃，P106 次 / 分，R23 次 / 分，可采用的最佳物理降温方式是

- A、冰帽头部冷敷
- B、冰袋冷敷
- C、乙醇拭浴
- D、温水擦浴
- E、局部冷湿敷

答案：B

94 新生儿，男，出生后 3 天，因皮肤，巩膜出现黄染入院。查体：体温：36.8℃、P132 次 / 分、

R24 次 / 分，精神差，食欲及大小便均正常。、该男婴最可能为

- A、颅内出血
- B、病理性黄疸
- C、生理性黄疸
- D、败血症
- E、先天性胆道闭锁

答案：C

95 新生儿，男，出生后 3 天，因皮肤，巩膜出现黄染入院。查体：体温：36.8℃、P132 次 / 分、R24 次 / 分，精神差，食欲及大小便均正常。、此时最佳的处理措施是

- A、给予白蛋白
- B、给予蓝光治疗
- C、观察黄疸变化
- D、补液
- E、暂停母乳喂养

答案：C

96 男性，23 岁，受凉后出现寒战、高热，体温 39.5℃，主诉咳嗽、胸痛。查体：右下肺叩诊浊音，听诊有湿啰音，支气管呼吸音及胸膜摩擦音。诊断为肺炎球菌性肺炎。

本病首选用药是

- A、青霉素
- B、红霉素
- C、头孢唑啉钠
- D、林可霉素
- E、链霉素

答案：A

97 男性，23 岁，受凉后出现寒战、高热，体温 39.5℃，主诉咳嗽、胸痛。查体：右下肺叩诊浊音，听诊有湿啰音，支气管呼吸音及胸膜摩擦音。诊断为肺炎球菌性肺炎。

对本病处理措施不恰当的是

- A、抗生素疗程一般为 7 天
- B、休克型肺炎宜联合使用抗生素
- C、高热者宜尽早使用退热药
- D、病情严重者可考虑使用糖皮质激素
- E、胸痛时嘱患者取患侧卧位

答案：C

98 男性，23 岁，受凉后出现寒战、高热，体温 39.5℃，主诉咳嗽、胸痛。查体：右下肺叩诊浊音，听诊有湿啰音，支气管呼吸音及胸膜摩擦音。诊断为肺炎球菌性肺炎。为及时发现休克型肺炎的发生应密切观察患者有无出现

- A、恶心呕吐、腹泻
- B、烦躁抽搐
- C、高热不退
- D、白细胞增多
- E、少尿或无尿

答案：E

99 患者女性，42 岁，因“消瘦、烦躁 3 个月”主诉入院，入院诊断为甲状腺功能亢进。患者入院后的饮食应给予

- A、低脂肪饮食
- B、低热量饮食
- C、低蛋白饮食
- D、高热量饮食
- E、高纤维素饮食

答案：D

100 患者女性，42 岁，因“消瘦、烦躁 3 个月”主诉入院，入院诊断为甲状腺功能亢进。若需要进一步做 ¹³¹I 试验，则患者在试验前应禁食的食物为

- A、蔬菜

- B、海带
- C、肉类
- D、动物血
- E、巧克力及甜食

答案：B

101 患者女性，36 岁。近一段时间出现不规则阴道出血，经量增多，并感到阴道排液增多，并有恶臭。建议进行

- A、阴道分泌物悬滴检查
- B、子宫颈活体组织检查
- C、分段诊断性刮宫
- D、阴道侧壁涂片
- E、内诊检查

答案：C

102、患者女性，38 岁，医生诊断为卵巢癌，今日手术，护士协助患者床上翻身活动应在手术后

- A、2~3 小时后
- B、4~5 小时后
- C、24~48 小时后
- D、6~8 小时后
- E、10~12 小时后

答案：D

103、患者女性，宫内妊娠 41+ 周，主诉胎动减少 2 天入院，检查宫底于剑突下 2 指，LOA，先露头，胎心 148 次/分，尚规则，无宫缩，以下处理正确的是

- A、B 超
- B、破膜引产
- C、急诊剖宫产
- D、缩宫素点滴引产
- E、胎心监护 (NST)

答案：E

104、患者男性，21 岁。腰椎穿刺术后 4 小时，需采用

- A、去枕仰卧位
- B、中凹卧位
- C、屈膝仰卧位
- D、侧卧位
- E、半坐卧位

答案：A

105、语言沟通的主要媒介是

- A、姿势
- B、表情
- C、眼神
- D、文字
- E、手势

答案：D

106、婴儿开始有意模仿并发出“爸爸”“妈妈”的音节是在

-
- A、10~11 个月
 - B、7~8 个月
 - C、9~10 个月
 - D、8~9 个月
 - E、1 岁

答案：B

107、护士甲，注册未满五年，因故要去外地工作，现应办理

- A、延续申请
- B、注册申请
- C、新注册申请
- D、逾期注册申请
- E、变更注册申请

答案：E

108、新生足月儿，口服维生素 D 的时间是

- A、出生后 1 周
- B、出生后 2 周
- C、出生后 1 个月
- D、出生后 2 个月
- E、出生后 3 个月

答案：B

109、产妇协调性子宫收缩乏力，产妇烦躁，情绪不稳定，首要护理措施为

- A、给予吸氧
- B、宫产
- C、心理护理
- D、静脉滴注缩宫素
- E、促进子宫收缩，加快产程

答案：C

110、青霉素皮试结果：局部皮肤红肿，直径 1.3cm，无自觉症状，下列处理正确的是

- A、在对侧肢体做盐水对照试验可以注射青霉素
- B、暂停该药，下次使用重新试验
- C、可以注射青霉素，但需减少剂量
- D、禁用青霉素，及时报告医生
- E、可以注射青霉素

答案：D

111、患者，男性，因结核性脑膜炎需肌内注射链霉素，侧卧位正确的是

- A、双腿弯曲
- B、双腿伸直
- C、下腿伸直，上腿稍弯曲
- D、双膝向腹部弯曲
- E、上腿伸直，下腿稍弯曲

答案：E

112、患者，女性，35 岁，因外伤失血过多，昏迷，需输血治疗，以下不利于防范医疗事故的操作是

- A、输血前严格执行查对制度

- B、输血前查血型并进行交叉配血试验
- C、对供血者血液按规定进行严格抗原抗体检测
- D、输血前与患者家属签订输血协议
- E、输血后马上整理用物，输血袋与输血器按医疗垃圾处理

答案：E

113、患者，男性，82岁，确诊肺心病20余年，今晨因呼吸困难伴喘息加重急诊入院，输液过程中，突然出现胸闷、咳嗽、咳粉红色泡沫样痰，听诊两肺满布湿啰音，心率快且律不齐，该患者可能发生

- A、过敏反应
- B、心肌梗死
- C、急性肺水肿
- D、肺栓塞
- E、心绞痛

答案：C

114、患者，女性，70岁，脑出血并发脑疝，此时患者双侧瞳孔的变化是

- A、变大
- B、变小
- C、无变化
- D、不等大
- E、散大固定

答案：E

115、患者男性，18岁。因摔伤致右肘关节疼痛伴活动受限四小时入院，查体见局部肿胀畸形，未及骨擦音骨擦感，局部活动受限，请问下列哪项是肘关节脱位的典型临床特征

- A、肘部明显畸形，前臂缩短，肘关节周径增粗
- B、肘后三角失去正常关系
- C、肘关节弹性固定于半伸位
- D、肘关节前方可摸到肱骨远端，肘后方可摸到尺骨鹰嘴
- E、肘后可扪及关节空虚

答案：B

116、胰腺癌最常见的首发症状是

- A、上腹痛及上腹饱胀不适
- B、黄疸
- C、食欲缺乏
- D、消化不良
- E、乏力消瘦

答案：A

117、患者男性，56岁。前列腺严重肥大，体质虚弱，膀胱高度膨胀，帮助其排尿的最佳方法是

- A、热敷下腹部
- B、按摩下腹部
- C、针灸
- D、导尿
- E、听流水声

答案：D

118、患者男性，19岁，不慎将脚划伤，TAT 试验阳性，接受 TAT 脱敏注射时出现轻微反应，护士采取的正确措施是

- A、立即报告医生
- B、停止注射，迅速抢救
- C、重新开始脱敏注射
- D、注射苯海拉明抗过敏
- E、停止注射，待反应消退，减少剂量增加次数注射

答案：E

119、患者男性，40岁，股骨颈骨折，石膏固定1小时后护士发现局部颜色发紫，此时护士应立即

- A、进行功能锻炼
- B、继续观察
- C、迅速减压
- D、局部按摩
- E、局部垫海绵垫

答案：C

120、患者男性，45岁，因胸部损伤、张力性气胸急诊入院。为配合抢救，护士必须准备的物品是

- A、输液器
- B、氧气湿化瓶
- C、气管插管包
- D、吸引器
- E、胸腔闭式引流瓶

答案：E

(四)

1、为避免大脑遭受不可逆损害，心肺复苏最佳开始的时间最好不要超过

- A、4~6分钟
- B、8~10分钟
- C、12分钟
- D、15分钟
- E、20分钟

答案：A

2、呼吸系统疾病最常见的症状是

- A、咳嗽咳痰
- B、呼吸困难
- C、咳血
- D、胸痛
- E、浮肿

答案：A

3、1岁小儿，结核菌素试验呈强阳性反应，多表示

- A、近期内初次感染结核菌
- B、体内有活动性的结核病

- C、体内有陈旧性结核病灶
- D、为接种卡介苗后反应
- E、对结核病有免疫力，不会再感染结核

答案：B

4、某孕妇孕 38 周，突感到剧烈腹痛伴有少量阴道流血。检查：血压 20/14 . 6kPa(150 / 110mmHg)，子宫似足月妊娠大小，硬如木板、有压痛，胎位不清，最大的可能是

- A、早产
- B、临产
- C、前置胎盘
- D、胎盘早期剥离
- E、不完全性子宫破裂

答案：D

5、患者女性，32 岁，患溃疡性结肠炎 3 年。该病最典型的粪便特点是

- A、柏油样便
- B、暗红色便
- C、黏液脓血便
- D、陶土色便
- E、果酱样便

答案：C

6、脓性指头炎若疼痛剧烈，局部张力较大时，应及时做的处理是

- A、切开减压引流
- B、应用止痛片
- C、理疗
- D、局部涂鱼石脂软膏导热
- E、行拔甲术

答案：A

7、患者女性，50 岁，患胃溃疡。入院后护士对其讲解胃溃疡疼痛方面的知识，患者的复述正确的是

- A、“饥饿或空腹痛”
- B、“进餐后立即出现”
- C、“秋冬季节容易发作”
- D、“进餐后 0.5 ~ 1 小时出现”
- E、“睡前加餐可缓解疼痛”

答案：D

8、患者女性，40 岁，因月经异常入院就诊。入院后诊断为子宫肌瘤。护士在询问病史时应着重询问

- A、性生活史
- B、孕产史
- C、是否长期使用雌激素
- D、饮食习惯
- E、家族中是否有类似的疾病

答案：C

9、病人表现健谈，说话滔滔不绝，自述脑子反应快，特别灵活，好像机器加了“润滑油”，思维敏捷。属于

-
- A、幻觉
 - B、思维逸
 - C、妄想
 - D、思维破裂
 - E、思维形式障碍

答案：B

10、心房颤动的急性期应首选的治疗是

- A、无需特殊治疗
- B、使用非同步电复律
- C、使用洋地黄药物
- D、使用经导管射频消融术
- E、使用同步电复律

答案：E

11、采集血细菌培养标本时，采血量宜为

- A、1ml
- B、2ml
- C、5ml
- D、10ml
- E、20ml

答案：C

12、门诊发现传染病患者时，护士采取的首要措施是

- A、进行卫生宣教与候诊教育
- B、将患者隔离诊治
- C、组织其他患者撤离
- D、安排患者提前就诊
- E、转入急诊科

答案：B

13、口头医嘱的正确处理方式是

- A、抢救完毕，应在6h内请医师补写医嘱
- B、任何情况均执行口头医嘱
- C、对错误的口头医嘱不可有疑议
- D、任何时候只执行书面医嘱
- E、抢救时，护士不需复述便可执行口头医嘱

答案：A

14、护士经股静脉采血，其穿刺部位是

- A、股动脉与股神经之间
- B、股动脉外侧0.3cm
- C、股神经内侧0.3cm
- D、股神经外侧0.5cm
- E、股动脉内侧0.5cm

答案：E

15、有关护士执行医嘱的说法正确的是

- A、患者对医嘱提出质疑，应先执行再核实
- B、对于医嘱，护士必须无条件执行



-
- C、随意篡改或无故不执行医嘱属违法行为
D、凡因医嘱错误造成的后果，护士均不承担法律责任
E、抢救时，无需医嘱可自行用药

答案：C

16、护士对于出院患者的护理不正确的是

- A、执行出院医嘱填写出院通知单、结账
B、停止各种治疗，口服药例外
C、填写患者出院登记本
D、护送患者出院
E、进行出院健康教育

答案：B

17、关于 TAT 脱敏注射法，正确的是

- A、分 2 次，量由小到大每隔 20 分钟注射 1 次
B、分 3 次量由小到大、每隔 20 分钟注射 1 次
C、分 3 次量平均、每隔 20 分钟注射 1 次
D、分 4 次量由小到大、每隔 20 分钟注射 1 次
E、分 4 次量平均、每隔 20 分钟注射 1 次

答案：D

18、能杀灭所有微生物以及细菌芽孢的方法是

- A、清洁
B、灭菌
C、抑菌
D、抗菌
E、消毒

答案：B

19、胎盘附着面的子宫内膜完全修复需到产后

- A、2 周
B、3 周
C、4 周
D、5 周
E、6 周

答案：E

20、按照药物保管要求，应放置在 10℃冰箱内的药品是

- A、苯巴比妥钠
B、白蛋白
C、氨茶碱
D、维生素
E、酵母片

答案：B

21、患者男性，56 岁。肝硬化病史 5 年，今日饮酒后突然大量呕血，伴神志恍惚、四肢湿冷、血压下降，医嘱予以输血、补液，该患者输新鲜血的主要目的是防止发生

- A、自发性腹膜炎
B、心力衰竭
C、肾衰竭

- D、肝性脑病
- E、水电解质紊乱

答案：D

22、患者男性，45岁。左侧肩部一略隆起的紫红色浸润区，质韧，界不清，中央部表面有多个脓栓，患者诊断为疔时，血常规检查异常最可能的是

- A、淋巴细胞明显增多
- B、嗜酸性粒细胞增多
- C、中性粒细胞明显增加
- D、白细胞减少
- E、嗜碱性粒细胞增多

答案：C

23、患者女性，25岁。因即将出国与同学聚餐后2小时出现上腹部剧痛，伴恶心、呕吐3次，急诊入院。体检：体温37.9℃，血压110/75mmHg，血白细胞计数 $16.5 \times 10^9/L$ 。目前该患者首优的护理问题是

- A、焦虑
- B、体液不足
- C、体温升高
- D、疼痛
- E、潜在并发症：休克

答案：D

24、患儿男，6个月，支气管肺炎，半天来突然烦躁不安，口周发绀，有鼻翼扇动及三凹征。体检：呼吸72次/分，心率180次/分，心音低钝，两肺大量细湿啰音，肝肋下3.5cm，护士判断该患儿最可能并发了

- A、脓胸
- B、肺不张
- C、脓气胸
- D、肺大疱
- E、急性心力衰竭

答案：E

25、患者男性，60岁，诊断为慢性呼吸衰竭，2周前因感冒导致急性加重，经治疗后将于第二天出院，病人十分担心再次发病。该病人有长期吸烟史，主管护士应对其进行的指导不包括

- A、制订戒烟目标和戒烟计划
- B、制订膳食方案，增进营养
- C、避免劳累
- D、预防性服用抗生素
- E、长期家庭氧疗方法

答案：D

26、患者，男性，37岁，因发热、咳嗽，伴间断腹泻、食欲减退及明显消瘦半年就诊，有同性恋史。查血清抗HIV(+)。诊断为艾滋病，病人表现出恐惧、绝望，对治疗护理不合作。目前病人最需要的护理措施是

- A、心理支持
- B、物理降温
- C、遵医嘱给抗生素

D、加强口腔及皮肤护理

E、给高热量、高蛋白、高维生素饮食

答案：A

27、患者男性，42岁，炎热夏天，高温下在外连续工作，出现剧烈头痛、头晕、全身无力，继而体温40°C，来急诊就诊，考虑为热射病。护士首先应采取

A、头部用冰袋或冷水湿敷

B、吸氧

C、测量血压

D、心电监护

E、安慰病人

答案：A

28、通常对开放性损伤进行清创，不宜晚于

A、立即进行

B、伤后3~5小时

C、伤后6~8小时

D、伤后12小时

E、伤后24小时

答案：C

29、抗幼年类风湿关节炎治疗的主要药物是

A、青霉素

B、红霉素

C、水杨酸制剂

D、维生素C

E、维生素D

答案：C

30、乳腺癌根治术后，为减少和避免术后积液，尽快恢复患侧上肢功能锻炼开始的时间正确的是

A、24小时内，可作伸指握拳、屈腕等锻炼

B、24小时内可做手指爬墙梳头等锻炼

C、术后3~5日，可作上举运动

D、术后3~5周，可做外展肩关节的运动

E、术后两周，可活动肘部

答案：A

31、大肠癌最常见的转移方式为

A、胎盘垂直转移

B、直接浸润

C、血行转移

D、淋巴转移

E、种植播散

答案：D

32、肺结核大咯血窒息患者，护士采取的最关键的抢救措施是

A、立即清理患者呼吸道内血液

B、立即给予心电监护

C、立即输液

D、立即吸氧

E、立即输血

答案：A

33、肺结核最主要的传播途径是

A、食物和水

B、毛巾或餐具

C、皮肤接触

D、尘埃

E、飞沫

答案：E

34、为防止脐带脱垂，胎膜早破的孕妇采用的卧位是

A、屈膝仰卧位

B、半坐卧位

C、中凹卧位

D、头低足高位

E、头高足低位

答案：D

35、急性乳腺炎最常见的病因是

A、乳头破损

B、乳头内陷

C、乳汁淤积

D、乳管堵塞

E、乳腺手术

答案：C

36、新生儿生后脐带脱落的时间一般为

A、1~7天

B、8~14天

C、15~21天

D、22~28天

E、29~35天

答案：A

37、CO中毒时，常最先受损的脏器是

A、肝

B、肾

C、脑

D、肺

E、脾

答案：C

38、乳腺癌常见而最早转移的淋巴结是

A、对侧腋下淋巴结

B、同侧腋下淋巴结

C、锁骨上淋巴结

D、锁骨下淋巴结

E、胸骨旁淋巴结



金英杰医学

JINYINGJIE.COM

答案：B

39、生理性贫血出现在小儿出生后

- A、2个月以内
- B、2~3个月
- C、4~6个月
- D、6~8个月
- E、8个月以后

答案：B

40、小儿出生后，生长发育最快的阶段是

- A、婴儿期
- B、幼儿期
- C、学龄前期
- D、学龄期
- E、新生儿期

答案：A

41、患者女性，27岁，因重度甲状腺功能亢进入院，准备择期手术治疗，术前准备期间，病人因害怕手术而焦虑不安，该病人目前主要的护理问题是

- A、焦虑
- B、营养失调：低于机体需要量
- C、有角膜完整性受损的危险
- D、自我形象紊乱
- E、不舒适

答案：A

42、患者男性，30岁，自诉乏力、心慌、怕热，心率120次/分，入院查甲亢的各项指标异常，医生诊断甲状腺功能亢进，护士进行饮食指导的主要内容是

- A、高蛋白、高热量、高维生素饮食
- B、多吃含纤维素的饮食，保持大便通畅
- C、限制饮水
- D、可以吃一些辛辣食物
- E、可以喝浓茶

答案：A

43、患者男性，73岁，1型糖尿病，最佳的治疗方案是

- A、饮食管理
- B、饮食管理及体力活动
- C、饮食管理及胰岛素应用
- D、饮食管理及口服磺脲类药物
- E、饮食管理及口服双胍类药物

答案：C

44、患者男性，56岁，糖尿病昏迷1小时入院，查血糖33.3mmol/L，尿素氮20mmol/L，血肌酐90μmol/L，血钠152mmol/L，血钾4.1mmol/L，CO₂CP15mmol/L，尿酮++，最可能的诊断是

- A、尿毒症
- B、糖尿病酮症酸中毒
- C、乳酸性酸中毒

D、高渗性非酮症糖尿病昏迷

E、高钠血症昏迷

答案：B

45、患者女性，30岁。诊断再生障碍性贫血。血常规显示红细胞 $3.0 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白 $60g/L$ ，白细胞 $2.8 \times 10^9/L$ ，血小板 $80 \times 10^9/L$ ，该病人最大的危险是

A、贫血

B、继发感染

C、颅内出血

D、心衰

E、牙龈出血

答案：B

46、孕妇，32岁，孕50天，阴道少量出血，诊断为先兆流产。下列处理不妥的是

A、多运动，保持心情愉快

B、禁止性生活

C、必要时给予对胎儿危害小的镇静剂

D、黄体功能不足的孕妇，每日肌注黄体酮保胎

E、及时行超声检查，了解胚胎发育情况

答案：A

47、婴幼儿最常见的贫血是

A、感染性贫血

B、失血性贫血

C、溶血性贫血

D、缺铁性贫血

E、营养性巨幼细胞贫血

答案：D

48、护理法洛氏四联症患儿，要注意保证入量，防止脱水。其目的是

A、防止便秘

B、防止休克

C、防止血栓栓塞

D、防止心力衰竭

E、防止肾功能衰竭

答案：C

49、小儿扁桃体炎的好发年龄为

A、新生儿

B、1岁

C、1~3岁

D、4~10岁

E、14~15岁

答案：D

50、口服补液盐治疗腹泻适用于

A、频繁呕吐者

B、新生儿腹泻

C、腹胀明显者

D、重度脱水者

E、轻、中度脱水者

答案：E

51、患者，男性，25岁，体检时发现缺铁性贫血。最常见的原因是

- A、缺乏维生素
- B、骨髓造血不良
- C、铁需要量过多
- D、慢性失血
- E、叶酸缺乏

答案：D

52、患者，男性，75岁，突然剧烈头痛，呕吐，随后出现昏迷。鉴别患者是脑出血或蛛网膜下腔出血的依据是

- A、体温高低
- B、有否肢体瘫痪
- C、白细胞多少
- D、脑脊液是否血性
- E、有否颈强直

答案：E

53、患者，女性，26岁，前胸双上肢烧伤急诊入院，主诉口干、剧烈疼痛，尿少。体检：脉搏细数，血压75/60mmHg，血容量减少的原因是

- A、剧烈疼痛
- B、心功能不全
- C、血浆渗出到组织间隙和创面
- D、心力衰竭
- E、末梢血管扩张

答案：C

54、患儿男，10岁，确诊水痘，现处于出疹期，自述皮肤瘙痒难忍。护士给予患儿的护理措施正确的是

- A、指导其可隔衣服挠抓皮疹患处
- B、皮疹完全消退前不可洗澡，以防继发感染
- C、局部可涂抹地塞米松霜
- D、遵医嘱口服抗组胺药物
- E、皮疹处不可涂抹炉甘石洗剂

答案：D

55、患者，女性，62岁。突然出现心前区疼痛伴大汗2小时，急诊就医，诊断为急性心肌梗死。给患者的护理措施中，下列正确的是

- A、鼓励病人大量进食
- B、尽量避免搬运
- C、增加探望，增加信心
- D、静脉输液速度宜快
- E、如有便秘立即灌肠

答案：B

56、患者，女性，50岁。肝硬化病史6年，今日饮酒后突然大量呕血，伴神志恍惚、四肢湿冷、血压下降，医嘱予以输血、补液，该患者输新鲜血的主要目的是防止发生

- A、自发性腹膜炎

- B、心力衰竭
- C、肾衰竭
- D、肝性脑病
- E、水、电解质紊乱

答案：D

57、患者，男性，40岁。因发热、寒战、咳嗽、呼吸急促9小时来诊，查体：体温38.7℃，脉搏140次/分，呼吸36次/分，神志朦胧，皮肤潮红，双肺有湿啰音，瞳孔等大等圆，对光反射(-)，初步诊断为肺部感染，给予抗生素等对症处理，生命体征q2h监测，护士在观察病情中发现其瞳孔缩小，烦躁，肢体有抽动及震颤，及时报告医师，经再次详细询问发病经过时，其家属告知发病前曾食用大量的水果、新鲜蔬菜，立即进行了一系列的实验室检查。最可能的诊断是

- A、亚硝酸盐中毒
- B、煤气中毒
- C、有机磷农药中毒
- D、酒精中毒
- E、安眠药中毒

答案：C

58、患者，男性，45岁，因饱餐后出现右上腹疼痛而入院，诊断为胆囊结石，应忌食

- A、蛋白食物
- B、纤维食物
- C、高纤维素食物
- D、油腻食物
- E、高维生素食物

答案：D

59、患者，女性，55岁。护士为其测量脉搏时发现，每隔2个正常搏动后出现1次期前收缩，称为

- A、二联律
- B、三联律
- C、间歇脉
- D、水冲脉
- E、绌脉

答案：B

60、丁先生，50岁，急性肾衰少尿期，患者突然呼吸困难，头痛头晕，软瘫，心律不齐，心动过缓，腹胀，应考虑

- A、高血钾症
- B、低血钾症
- C、水中毒
- D、酸中毒
- E、尿毒症

答案：A

61、李女士，52岁，化脓性胆管炎，剖腹术后病情危重，下列哪项处理不妥

- A、入ICU病房
- B、每15分钟观察1次BP、P、R
- C、每15分钟观察1次神志

D、每 15 分钟观察 1 次肢体活动

E、术后用抗菌素

答案：D

62、王先生，头顶部伤口，换药后宜用哪种包扎方法

A、四头带

B、丁字带

C、腹带

D、胸带

E、回反形绷带

答案：E

63、慢性宫颈炎临床最常见的病理类型是

A、宫颈细胞非典型增生

B、宫颈腺体囊肿

C、宫颈息肉

D、宫颈肥大

E、宫颈糜烂样改变

答案：E

64、某女士流产 2 次，无早产史，足月产 1 次，现有一女，其生育史可简写为

A、1-0-2-1

B、1-2-0-1

C、2-0-1-1

D、1-1-0-2

E、0-1-2-1

答案：A

65、某女士，口服避孕药物进行避孕已 2 年，因工作忙，当晚漏服，询问指导，应告知补服时间为

A、3 小时内

B、6 小时内

C、9 小时内

D、12 小时内

E、24 小时内

答案：D

66、一 6 个月婴儿，喂面条后发生腹泻 2 天，稀水样便 5~6 次/日，量中等，偶吐奶，尿量略减少，前囟及眼窝稍凹陷。下列哪项措施不妥

A、口服抗生素

B、暂停辅食

C、继续喂母乳

D、加强臀部护理

E、给予口服补液盐

答案：A

67、某孕妇，30 岁，既往体健，近 2 年来发现 HBs-Ag 阳性，但无任何症状，肝功能正常。经过十月怀胎，足月顺利分娩 4300g 女婴，为阻断母婴传播，对此新生儿最适宜的预防方法是注射

A、乙肝疫苗

- B、丙种球蛋白
- C、高效价乙肝免疫球蛋白
- D、乙肝疫苗 + 丙种球蛋白
- E、乙肝疫苗 + 高效价乙肝免疫球蛋白

答案：E

68、患者，女性，33岁，宫内妊娠39周，G3P2，无难产史，3小时前开始规律宫缩。急诊入院检查：宫缩持续46秒，间隔3分钟，胎心141次/分，头位宫口开大4cm，羊膜囊明显膨出，骨盆内诊正常。此时正确的处理是

- A、破膜后住院，立即剖宫产
- B、立即住院待产
- C、灌肠以促进产程，减少污染
- D、急诊室留观
- E、送产房消毒接生

答案：B

69、孕妇，停经16周，2个月来间断少量阴道出血，检查腹部无明显压痛、反跳痛，子宫颈口未开，子宫增大如孕8周，最可能的诊断为

- A、稽留流产
- B、先兆流产
- C、不全流产
- D、难免流产
- E、意外流产

答案：A

70、患者，男性，27岁，前臂行石膏绷带包扎后3h。患者向护士诉手指剧痛。护士查体，发现手指发凉、发绀，不能自主活动。该护士首先考虑为

- A、低血容量性休克
- B、石膏绷带包扎过紧
- C、神经损伤
- D、体位不当
- E、静脉栓塞

答案：B

71、患者，男性，36岁，近2个月以来出现皮肤紫癜，近3天出现牙龈出血不止，体温39℃，贫血进行性加重，伴乏力、头晕、心悸，肝、脾、淋巴结不大，胸骨无压痛。化验：血红蛋白、白细胞、血小板低于正常，骨髓增生极度减低。该患者可能是

- A、急性再生障碍性贫血
- B、急性白血病
- C、血小板减少性紫癜
- D、血友病
- E、缺铁性贫血

答案：A

72、患儿，8个月，因抽搐急诊。患儿冬季出生，人工喂养；睡眠烦躁不安、多汗。近日气温回升，经常户外活动。今日突然出现全身抽搐，约15秒，停止后精神、食欲无异常。患儿最可能的诊断是

- A、败血症
- B、半乳糖血症

- C、脑膜炎
- D、营养不良
- E、手足搐搦症

答案：E

73、妊娠合并心脏病孕妇，心功能Ⅲ级，行剖宫产术。术后安全返回病房，子宫收缩好，血压正常，护士对该产妇的护理措施中正确的是

- A、清淡饮食，防止便秘
- B、尽早协助哺乳，促进子宫收缩
- C、不宜再妊娠，产后 36h 后行绝育术
- D、产后 3d 按医嘱应用抗生素
- E、产后 24h 严密观察生命体征，每 4h 一次

答案：A

74、患者，女性，75 岁，患高血压性心脏病 9 年，近 2 年来患者明显感觉体力下降，轻微日常活动即感心悸、呼吸困难，休息较长时间后症状方可缓解。护士判断此患者目前的心功能处于

- A、前驱期
- B、Ⅰ级
- C、Ⅱ级
- D、Ⅲ级
- E、心力衰竭

答案：D

75、患者，女性，45 岁，因大量饮酒后出现上腹部持续疼痛 2 小时来院急诊，为减轻疼痛，患者的常见体位是

- A、平卧位
- B、半卧位
- C、头低脚高位
- D、端坐卧位
- E、弯腰屈膝侧卧位

答案：E

76、患者，男性 40 岁，因甲亢接受放射性碘治疗。治疗后护士应嘱患者定期复查，以便及早发现

- A、甲状腺癌变
- B、甲状腺危象
- C、粒细胞减少
- D、突眼恶化
- E、永久性甲状腺功能减退

答案：B

77、患者，女性，35 岁，因股骨干骨折给予持续骨牵引，下列护理不妥的是

- A、足部不抵床栏
- B、及时清除骨针孔血痂
- C、抬高床脚
- D、常测患肢长度
- E、鼓励按照要求做患肢活动

答案：B

79、患者，女性，65岁，患急性心肌梗死，病情平稳，没有并发症，第1周末护理措施应该是

- A、床上活动四肢
- B、乙醇湿化给氧
- C、高热量高蛋白饮食
- D、大小便由人扶到卫生间
- E、进食洗漱向护理人员协助

答案：A

80、患者，男性，27岁，印刷厂彩印车间工人。因特发性血小板减少性紫癜住院，应用糖皮质激素治疗半月后好转出院。护士进行出院前的健康指导时，错误的是

- A、必须调换工种
- B、坚持饭后服药
- C、避免到人多聚集的地方
- D、注意自我病情监测
- E、若无新发出血可自行停药

答案：E

82、患者，男性，40岁，胃癌。在硬膜外麻醉下行胃大部切除术，手术顺利，术后安返病房。护士应注意观察的并发症是

- A、胃肠吻合瘘
- B、输血祥梗阻
- C、术后出血
- D、早期倾倒综合征
- E、碱性反流性食管炎

答案：C

83、患者，女性，55岁，车祸造成腹部损伤，护士第一时间得知其有开放性膀胱破裂，首先要准备的抢救措施是

- A、积吸止痛
- B、给予抗生素抗感染
- C、进行手术前准备
- D、留置导尿
- E、准备抗休克药物

答案：E

84、患者，女性，66岁，诊断为尿毒症，精神不振，下腹无胀满，24h尿量为80ml。护士判断该患者的排尿情况属于

- A、蛋白尿
- B、无尿
- C、少尿
- D、尿量偏多
- E、尿量偏少

答案：B

85、患者，女性，30岁，孕18周，诊断淋病入院。护士向其解释淋病对妊娠、分娩及胎儿和新生儿的影响后，孕妇出现下列哪一项表述时，表明护士仍需要对其进行健康教育

- A、“淋病会导致胎儿窘迫”
- B、“淋病会导致新生儿肺炎”

- C、“我不想让我丈夫知道这件事”
D、“我会因此发生盆腔感染”
E、“孕晚期我要注意胎膜早破的症状”

答案：C

86、赵女士，68岁，患肝硬化已5年，近日发现牙龈出血、夜间睡眠时流涎呈粉红色，皮肤有

许多出血点，且有尿频、尿急、腰痛就医，经检查后确认为肝硬化、脾功能亢进、全血细胞减少，伴泌尿系感染

全血细胞是指

- A、淋巴细胞、嗜酸性粒细胞
B、红细胞、白细胞及血小板
C、杆状核粒细胞及嗜碱粒细胞
D、单核细胞
E、中性粒细胞

答案：B

88、赵女士，68岁，患肝硬化已5年，近日发现牙龈出血、夜间睡眠时流涎呈粉红色，皮肤有

许多出血点，且有尿频、尿急、腰痛就医，经检查后确认为肝硬化、脾功能亢进、全血细胞减少，伴泌尿系感染

泌尿系统感染是由于

- A、红细胞减少
B、中性粒细胞减少
C、血小板减少
D、淋巴细胞减少
E、嗜酸性粒细胞减少

答案：B

89、赵女士，68岁，患肝硬化已5年，近日发现牙龈出血、夜间睡眠时流涎呈粉红色，皮肤有

许多出血点，且有尿频、尿急、腰痛就医，经检查后确认为肝硬化、脾功能亢进、全血细胞减少，伴泌尿系感染

皮肤、牙龈出血是由于

- A、有中毒颗粒
B、血小板减少
C、嗜酸性粒细胞减少
D、中性粒细胞减少
E、淋巴细胞减少

答案：B

90、40岁某先生因右小腿严重外伤后，发生气性坏疽，住院治疗：40岁某先生首先的处理是

- A、给氧
B、高压氧治疗
C、止痛
D、手术
E、加强营养

答案：D

91、40岁某先生因右小腿严重外伤后，发生气性坏疽，住院治疗：40岁某先生下列哪项处理不必要

- A、高压氧治疗
- B、手术
- C、隔离
- D、应用青霉素
- E、避光、安静

答案：E

92、40岁某先生因右小腿严重外伤后，发生气性坏疽，住院治疗：40岁某先生该患者外伤后如何处理可避免发生气性坏疽

- A、彻底清创缝合
- B、清创后伤口敞开
- C、应用TAT
- D、应用青霉素
- E、应用甲硝唑

答案：B

93、患者，男性，34岁，近2年饮食没有规律，并嗜烟、酒，出现饥饿痛及半夜痛醒。进餐或服用碱性药物可使症状缓解。

首先考虑该患者可能患有

- A、胃溃疡
- B、慢性胃炎
- C、胃息肉
- D、十二指肠球部溃疡
- E、十二指肠球炎

答案：D

94、患者，男性，34岁，近2年饮食没有规律，并嗜烟、酒，出现饥饿痛及半夜痛醒。进餐或服用碱性药物可使症状缓解。

3h前饱餐后，患者突然感到上腹部剧痛，随即向全腹扩散，出冷汗，平卧不敢翻身。查体：体温正常，脉搏有力，90次/min；腹部平坦、无胃型，腹式呼吸表浅，肠鸣音消失，肝区浊音界消失，腹呈板样强直伴压痛及反跳痛，以中上腹为显著。考虑该患者可能的并发症是

- A、急性胰腺炎
- B、十二指肠球部溃疡穿孔
- C、急性阑尾炎
- D、急性胃肠炎
- E、急性胆囊炎

答案：B

95、患者，女性，55岁。家住平房，生煤火取暖，晨起感到头痛、头晕、视物模糊而摔倒，被他人发现后送至医院。急查血液碳氧血红蛋白试验呈阳性，诊断为CO中毒。

二氧化碳中毒纠正缺氧，给予高流量吸氧

- A、8~10L/min
- B、2~4L/min
- C、6~8L/min

D、4~6L/min

E、7-9L/min

答案：A

96、患者，女性，55岁。家住平房，生煤火取暖，晨起感到头痛、头晕、视物模糊而摔倒，被他人发现后送至医院。急查血液碳氧血红蛋白试验呈阳性，诊断为CO中毒。

有可能出现的并发症是

A、迟发性脑病

B、水电解质紊乱

C、肺水肿

D、昏迷

E、脑水肿

答案：A

97、患者，女性，55岁。家住平房，生煤火取暖，晨起感到头痛、头晕、视物模糊而摔倒，被他人发现后送至医院。急查血液碳氧血红蛋白试验呈阳性，诊断为CO中毒。

急性一氧化碳中毒迟发性脑病主要的临床表现是

A、呼吸循环衰竭

B、去大脑皮质状态

C、意识障碍

D、大小便失禁

E、震颤麻痹

答案：B

98、患者，女性，55岁。特殊职业，在生产有机磷农药工作中违反操作规定，出现有机磷中毒症状，头晕、头痛、乏力、支气管分泌物增多、呼吸困难，逐渐出现烦躁不安、谵妄、抽搐

及昏迷。

诊断有机磷农药中毒的主要指标是

A、典型症状

B、呕吐物

C、瞳孔缩小

D、意识障碍

E、全血胆碱酯酶测定

答案：E

99、患者，女性，55岁。特殊职业，在生产有机磷农药工作中违反操作规定，出现有机磷中毒症状，头晕、头痛、乏力、支气管分泌物增多、呼吸困难，逐渐出现烦躁不安、谵妄、抽搐

及昏迷。

有机磷农药对人体的毒性主要在于

A、引起急性肾衰竭

B、使血液凝固发生障碍

C、抑制中枢神经系统

D、抑制乙酰胆碱酯酶活力

E、增加乙酰胆碱的产生

答案：D

100、患者，女性，55岁。特殊职业，在生产有机磷农药工作中违反操作规定，出现有机磷

中毒症状，头晕、头痛、乏力、支气管分泌物增多、呼吸困难，逐渐出现烦躁不安、谵妄、抽搐及昏迷。有机磷农药中毒最常见的抗胆碱药阿托品，其作用是

- A、缓解肌肉震颤
- B、缓解肌肉抽搐
- C、促使昏迷患者苏醒
- D、使瞳孔缩小
- E、抑制腺体分泌

答案：E

101、患者男性，60岁。患左下肢静脉曲张20年，行大隐静脉高位结扎，加小腿静脉分段结扎。术后3小时起立行走时，小腿处伤口突然出血不止。紧急处理应

- A、就地站立位包扎
- B、指压止血
- C、用止血带
- D、钳夹止血
- E、平卧，抬高患肢，加压包扎

答案：E

102、下列哪种沟通形式不属于非语言性沟通

- A、面部表情
- B、手势
- C、身体运动
- D、身体姿势
- E、吸康宣吸资料

答案：E

103、男性43岁，肾挫裂伤，担心误工想尽快工作，护士对其有关休息的指导正确的是

- A、绝对卧床休息2~4天，以后可在床旁轻微活动
- B、只要卧床休息至血尿消失即可
- C、绝对卧床休息2~4周，即便血尿消失也要坚持休息
- D、卧床休息4~6周，间或下地活动预防血栓形成
- E、开始应绝对卧床休息，疼痛缓解即可下地活动

答案：C

104、患者男性，45岁。在野外工作时足底不慎被锈钉刺伤，2日后出现全身肌肉强直性收缩，阵发性痉挛，来急诊就诊，考虑可能为破伤风。对破伤风患者的治疗和护理，下列措施正确的是

- A、呼吸道隔离
- B、患者住单人房间，避免水声、光、风的刺激
- C、咽肌和呼吸肌痉挛不能用镇静剂控制时，应使用面罩给氧
- D、医务人员接触患者时，戴口罩帽子，可不戴手套
- E、可肌内注射青霉素治疗

答案：B

105、患儿，日龄4天，因感染给予抗生素治疗，今日发现患儿口腔有乳凝块样附着物，诊断为鹅口疮。护士为其清洁口腔应选用

- A、温开水
- B、2%碳酸氢钠溶液
- C、2%过氧化氢溶液

D、3%硼酸溶液

E、0.45%氯化钠溶液

答案：B

106、患者，男性，64岁，因尿失禁留置导尿管，引流通畅但尿色黄、浑浊，给予抗感染治疗，护士所实施的针对性的护理措施中最合适的护理是

A、鼓励多饮水并进行膀胱冲洗

B、立即拔除导尿管

C、每日2次会阴擦洗

D、下腹部按摩

E、防止压疮

答案：A

107、患者，女性，58岁，肾功能不全3年，近日因受凉出现病情加重，血肌酐390mmol/L，WBC $11\times 10^9/L$ ，血钾3.8mmol/L，呼吸深慢，PH7.30，患者出现的酸碱平衡紊乱为

A、混合型酸中毒

B、代谢性碱中毒

C、代谢性酸中毒

D、呼吸性酸中毒

E、呼吸性碱中毒

答案：C

108、患者，女性，28岁，因水肿，诊断为“急性肾炎”入院，应给予

A、要素饮食

B、少渣饮食

C、低脂饮食

D、低盐饮食

E、低胆固醇饮食

答案：D

109、每晚一次的外文缩写是

A、qd

B、qn

C、qh

D、bid

E、tid

答案：B

110、患者，女性，27岁，因外伤导致头皮裂伤。处理方式为清创术，护士向患者解释行清除术的时间可延长到

A、10h

B、12h

C、18h

D、24h

E、72h

答案：D

111、患者，27岁，男性，车祸造成多发性损伤，急救车首先要处理的情况是

A、膀胱破裂

B、颅脑外伤

- C、开放性骨折
- D、外伤性大出血
- E、腹部外伤后肠管脱出

答案：D

112、患者，男性，50岁，足靴区轻度肿胀，色素沉着，久坐后出现酸胀，小腿有迂回的静脉团，诊断为大隐静脉曲张。深静脉通畅试验（Perthes 试验）阴性，应采取的治疗方案是

- A、局部注射硬化剂
- B、治疗深静脉血栓
- C、大隐静脉高位结扎加分段剥脱术
- D、小隐静脉瓣膜成形术
- E、穿弹力袜

答案：C

113、患者，女性，68岁，农民，2年前无明显诱因出现双腕、双手关节和双膝、踝、足、跖趾关节肿痛，伴晨僵，时间约30分钟，疼痛以夜间明显，影响行动。实验室检查：血沉55mm/h,RF (+) 关节X线检查：双手骨质疏松，腕部关节间隙变窄，最可能的诊断是

- A、类风湿关节炎
- B、骨性关节炎
- C、系统性红斑狼疮
- D、干燥综合征
- E、银屑病关节炎

答案：A

114、患者，女性，65岁，患结肠癌，拟行左结肠癌根治术，护士指导患者术前需几日开始服用肠道消炎药

- A、1d
- B、3d
- C、5d
- D、7d
- E、9d

答案：B

115、患者男性，23岁。足底被锈钉子刺伤，仅自行简单处理。如发生破伤风通常会在什么时候发作

- A、1~3天
- B、6~12天
- C、14天
- D、15~21天
- E、28~30天

答案：B

116、患者从上午9点30分开始输液共1000ml，先为50滴/min，1.5h后改为60滴，其输完时间是

- A、下午1点55分
- B、下午2点5分
- C、下午2点55分
- D、下午2点30分
- E、下午3点10分

答案：A

117、患者女，48岁。2年来月经周期不规则，持续时间长，经量增加。咨询避孕措施，应指

导其选用

- A、阴茎套
- B、长效避孕针
- C、宫内节育器
- D、安全期避孕
- E、短效口服避孕药

答案：A

118、患者女性，59岁。持续高热3天，每隔4小时测一次体温，都在39.1℃以上，最高达40℃，

经检查诊断为“伤寒”。该患者的热型属于

- A、弛张热
- B、稽留热
- C、间歇热
- D、不规则热
- E、波浪热

答案：B

119、患者女性，59岁。持续高热3天，每隔4小时测一次体温，都在39.1℃以上，最高达40℃，

经检查诊断为“伤寒”。护理该患者，正确的措施是

- A、每日测体温4次
- B、体温超过39.2℃，给予乙醇拭浴
- C、药物降温1小时后复测体温
- D、鼓励患者多饮水多运动
- E、如患者有寒战，应注意保暖

答案：E

120、患者女性，65岁。有动脉硬化病史5年，因饮食不当出现呕血、黑便1天入院，呕吐暗红色液体3次，量约800ml，解黑便2次，量约500g。查体：体温37.8℃，脉搏120次/分，呼

吸22次/分，血压85/60mmHg，神志萎靡，面色苍白，四肢湿冷，医嘱予以输血800ml。该患者出血最可能的原因为

- A、胃溃疡
- B、十二指肠球部溃疡
- C、急性糜烂出血性胃炎
- D、食管胃底静脉曲张破裂
- E、胃癌

答案：D

(五)

1、患儿，5岁，曾与水痘患儿接触，对其应采取的措施是

- A、注射维生素D3

-
- B、入院治疗
 - C、注射疫苗
 - D、隔离观察
 - E、静脉注射抗生素

答案：D

2、下列针对妊娠期妇女便秘的护理措施，不恰当的是

- A、养成定时排便的习惯
- B、每天多饮水
- C、适当运动
- D、自行服用缓泻药
- E、多食高纤维素食物

答案：D

3、为小儿测量体重时，错误的做法是

- A、晨起空腹排尿后进行
- B、进食后立即进行
- C、每次测量应在同一磅秤上称量
- D、测量前应先校正磅秤为零点
- E、脱去衣裤鞋袜后进行

答案：B

4、对急性心肌梗死患者给予吸氧的主要目的是

- A、改善心肌缺氧，减轻疼痛
- B、预防心源性休克
- C、减少心律失常
- D、防止心力衰竭
- E、促进坏死组织吸收

答案：A

5、当患者诊断为痛时，最可能出现哪项血常规检查结果

- A、嗜酸粒细胞增加
- B、淋巴细胞计数增加
- C、网织红细胞计数增加
- D、中幼粒细胞计数增加
- E、中性粒细胞比例增加

答案：E

6、轮状病毒肠炎所致腹泻的临床特点不包括

- A、多发生在秋冬季
- B、常伴上呼吸道感染症状
- C、常伴腹痛里急后重
- D、肠道中毒症状不明显
- E、大便无腥臭味

答案：C

7、下列属于良性肿瘤病理特点的是

- A、无痛性肿块
- B、可出现坏死溃疡
- C、细胞分化成熟



- D、无包膜
- E、生长迅速

答案：C

8、老年人夜间安静睡眠时容易发生脑血栓的原因是

- A、血稠流动慢
- B、体温降低
- C、脑栓塞
- D、心肌收缩力下降
- E、脑血管痉挛

答案：A

9、护士为患急性乳腺炎的产妇讲解该病的主要病因是

- A、营养不良
- B、乳汁淤积
- C、乳头过小或内陷
- D、哺乳经验不足
- E、乳汁分泌障碍

答案：B

10、区别绒毛膜癌与侵蚀性葡萄胎最主要的依据是

- A、有无转移病灶
- B、距葡萄胎排空后时间长短
- C、尿中 hCG 值高低
- D、B 超的表现
- E、活组织镜下见有无绒毛结构

答案：E

11、决定心脏病患者是否妊娠，最重要的是

- A、生育史
- B、家族史
- C、心脏病的种类
- D、心功能分级
- E、治疗情况

答案：D

12、产后出血指胎儿娩出后 24 小时内阴道出血超过

- A、300ml
- B、400ml
- C、500ml
- D、600ml
- E、700ml

答案：C

13、慢性肾炎必有表现是

- A、血尿
- B、水肿
- C、贫血
- D、高血压
- E、蛋白尿



答案：E

14、新生儿是指

- A、从出生至 1 周的婴儿
- B、从出生至 10 天的婴儿
- C、从出生至 28 天的婴儿
- D、从出生至 1 个月的婴儿
- E、从出生至 3 个月的婴儿

答案：C

15、羊水栓塞多发生在

- A、妊娠早期流产
- B、妊娠中期流产
- C、妊娠晚期流产
- D、分娩期破膜后
- E、产后 24 小时内

答案：D

16、患儿，女，5 岁，诊断为病毒性脑膜炎，下列护理措施中错误的是

- A、体温 $> 38.5^{\circ}\text{C}$ 时给予物理降温
- B、病情稳定后，及早进行肢体功能锻炼
- C、患儿取头低脚高位
- D、密切观察瞳孔及呼吸的变化
- E、对昏迷或吞咽困难的患儿，应尽早给予鼻饲

答案：C

17、女性，60 岁，自述突然心慌胸闷。急诊检查：心率 120 次/分，脉率 110 次/分，且心律不齐，心音强弱不等。考虑为

- A、室性心动过速
- B、室上性心动过速
- C、窦性心动过速
- D、心室颤动
- E、心房颤动

答案：E

18、患儿，8 岁。2 周前患上呼吸道感染，近 2 日来颜面浮肿，尿少，尿为浓茶色。诊断为急性肾小球肾炎。患儿感染的致病菌最可能是

- A、A 组 β 型溶血性链球菌
- B、甲型溶血性链球菌 B 甲型链球菌
- C、草绿色链球菌
- D、肺炎链球菌
- E、粪链球菌

答案：A

19、慢性肾衰竭贫血的最主要原因是

- A、铁缺乏
- B、促红细胞生成素缺乏
- C、叶酸缺乏
- D、营养不良
- E、消化道出血

答案：B

20、青年男性，运动后发生腰部绞痛，继而出现肉眼血尿。最可能的原因是

- A、肾肿瘤
- B、输尿管肿瘤
- C、膀胱肿瘤
- D、尿道肿瘤
- E、上尿路结石

答案：E

21、有助于肝癌早期诊断的实验室检查是

- A、癌胚抗原测定
- B、肝功能检测
- C、甲胎蛋白测定
- D、影像学检查
- E、肝穿刺活组织检查

答案：C

22、早期宫颈癌最有价值的检查是

- A、阴道镜检查
- B、宫颈脱落细胞检查
- C、宫颈或宫颈管活组织检查
- D、诊断性刮宫
- E、宫颈碘试验

答案：C

23、在冬季天气变化剧烈的时候，预防肺炎发生的重点关注人群是

- A、有哮喘病史的患者
- B、有冠心病史的患者
- C、有慢性阻塞性肺疾病的患者
- D、有高血压病史的患者
- E、有支气管扩张的患者

答案：C

24、5个月健康婴儿，现采用人工喂养，家长到儿保门诊咨询喂养方法，此时应指导添加的辅食是

- A、馒头
- B、烂面
- C、蛋黄
- D、肉末
- E、粥

答案：C

25、脑出血患者，医嘱给予20%甘露醇静脉滴注，其主要作用是

- A、降低血压
- B、营养脑细胞
- C、帮助止血
- D、降低颅内压
- E、改善大脑耗氧量

答案：D

26、脑出血以内囊出血最常见，其特征性的临床表现为

- A、同侧偏瘫
- B、对侧偏瘫
- C、双侧偏盲
- D、三偏症
- E、视物模糊

答案：D

27、小儿会爬的年龄是

- A、3~4个月
- B、5~6个月
- C、8~9个月
- D、9~10个月
- E、10~11个月

答案：C

28、患儿被诊断为麻疹，护士做健康教育时，错误的指导是

- A、多饮开水
- B、勤剪指甲，防止抓伤皮肤
- C、穿透气舒适的衣服保持皮肤清洁干燥
- D、及时清除鼻痂，保持呼吸道通畅
- E、发热时应用物理或药物方法为患儿迅速降温

答案：E

29、肺炎球菌肺炎患者首选的治疗是

- A、青霉素
- B、链霉素
- C、氯霉素
- D、庆大霉素
- E、克林霉素

答案：A

30、引起尿毒症患者贫血最重要的原因是

- A、失血过多
- B、肾产生红细胞生成素减少
- C、毒素使红细胞寿命缩短
- D、铁摄入量不足
- E、髓外造血障碍

答案：B

31、2岁以内小儿乳牙数目正确的计算方法是

- A、月龄 - (2~4)
- B、月龄 - (4~6)
- C、月龄 - (2~8)
- D、月龄 - (2~10)
- E、月龄 - (6~12)

答案：B

32、下列属于胃肠黏膜保护因素的是

- A、非甾体类药物

- B、吸烟
- C、过度精神紧张
- D、刺激性饮食
- E、前列腺素

答案：E

33、阑尾解剖位置的体表投影是

- A、通过脐横线与右锁中线的交点
- B、右髂前上棘与脐连线中内 1/3 处
- C、右髂前上棘与脐连线中外 1/3 处
- D、右腹股沟中点与脐连线中外 1/3 处
- E、右腹股沟中点与脐连线中内 1/3 处

答案：C

34、细菌性肝脓肿患者行经皮肝穿刺脓肿置管引流术，引流出的液体呈

- A、血性
- B、脓液
- C、胆汁样
- D、乳糜样
- E、淡黄色透明样

答案：B

35、慢性阻塞性肺疾病病人的长期氧疗是指

- A、每天吸氧时间坚持 8 小时
- B、每天吸氧时间坚持 10 小时
- C、每天吸氧时间坚持 15 小时以上
- D、睡眠时不吸氧
- E、氧流量维持在 2-4L

答案：C

36、患儿，3 岁，诊断为缺铁性贫血，血红蛋白为 80g / L。为改善贫血症状最佳的食物是

- A、牛奶及乳制品
- B、鱼虾及高热量饮食
- C、动物肝脏及高蛋白饮食
- D、紫皮茄子及高蛋白饮食
- E、海带紫菜及低蛋白饮食

答案：C

37、支气管扩张症患者，应密切观察患者咳嗽、咳痰加重的时间为

- A、早晨起床时和晚上卧床时
- B、白天
- C、傍晚
- D、深夜
- E、进餐时

答案：A

38、第二产程时娩出胎儿的主要辅助力量是

- A、肛提肌收缩
- B、宫缩后肌纤维
- C、子宫肌收缩

D、腹肌和膈肌收缩力

E、平滑肌和横纹肌

答案：D

39、食管癌食管明显梗阻的病人术前减轻食管黏膜水肿的措施是

A、术前禁食

B、营养支持

C、纠正水电解质酸碱失衡

D、加强口腔卫生

E、术前3天温盐水洗胃

答案：E

40、患儿，女性，2岁。高热1天后全身出现红色斑丘疹，随后相继出现疱疹，疱疹破溃后形成结痂。护理中应采取的隔离措施有

A、呼吸道隔离

B、消化道隔离

C、血液隔离

D、保护隔离

E、虫媒隔离

答案：A

41、患者，男性，60岁，有胆石症病史10年。上腹部剧痛5小时，呕吐4次，呕吐物中有胆汁。急诊入院，查白细胞 $2 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.8，怀疑为急性胰腺炎。护士应严密观察的项目不包括

A、生命体征

B、意识变化

C、24小时出入量

D、血尿淀粉酶

E、大便隐血试验

答案：E

42、患者，女性，25岁。因咳嗽、痰中带血4日，以“支扩”收住院。今晨突然大咳血100ml。该患者最主要的护理诊断或合作性问题是

A、紧张焦虑

B、活动无耐力

C、潜在的并发症：窒息

D、知识缺乏

E、有感染的危险

答案：C

43、孕妇，妊娠39周，突然感到剧烈腹痛，并伴少量阴道流血。检查：血压150/110mmHg，子宫似足月妊娠大小，硬如木板，有压痛，胎位不清，胎心90次/分，最可能的诊断是

A、见红

B、临产

C、前置胎盘

D、早产

E、胎盘早剥

答案：E

44、患者，女性，25岁，反复血尿、蛋白尿2年，5天前感冒后出现乏力、食欲减退，查眼

睑、颜面水肿，蛋白尿（++），尿红细胞 5/HP，血压 147/92mmHg，Hb90g/L，夜尿增多，该患者可能患了

- A、慢性肾小球肾炎
- B、糖尿病肾病
- C、急性肾小球肾炎
- D、高血压肾病
- E、梗阻性肾病

答案：A

45、患者，女性 30 岁，散步时小腿部不慎被锈铁丝划伤，伤口较深，预防破伤风最关键的措施是

- A、严密观察
- B、早期彻底清创，并注射破伤风抗毒素
- C、大量应用抗生素
- D、注射免疫球蛋白
- E、注射破伤风类毒素

答案：B

46、患者，女性，25 岁，诊断为缺铁性贫血，护士为其讲述服用铁剂的方法，患者如果复述出下列哪项说明该护士还需要再详细解服用方法

- A、餐后服用
- B、饮浓茶
- C、与维生素同服
- D、不能同时喝牛奶
- E、用吸管吸服铁剂

答案：B

47、患者，女性，60 岁，诊断为急性心肌梗死，医嘱要求查肌酸磷酸激酶（CPK），护士制订的适宜的抽血时间是

- A、饭前
- B、即刻
- C、饭后 2h
- D、服药后
- E、明日晨起空腹时

答案：B

48、患者，女性，40 岁。阑尾穿孔腹膜炎手术后第 7 天，护士查体发现患者体温 39.0℃，伤口无红肿，排便次数增多，混有黏液，伴有里急后重，该护士考虑患者并发了

- A、盆腔脓肿
- B、病毒性肠炎
- C、伤口感染
- D、膈下脓肿
- E、肠间脓肿

答案：A

49、患者，女性，25 岁，因上腹部胀痛、饭后暖气及反酸明显来诊，胃镜报告示慢性胃炎。下列食物适合患者食用的有

- A、鸡肉
- B、咖啡

C、纯牛奶

D、面条

E、油条

答案：D

50、患者，女性，70岁。支气管哮喘患者。受凉后出现胸闷，呼气性呼吸困难，双肺布满哮鸣音入院。既往上呼吸道感染后有类似发作史。对其健康教育最重要的是

A、清淡饮食

B、不饲养宠物

C、避免接触花草

D、保持乐观情绪

E、预防上呼吸道感染

答案：E

51、患者男性，60岁，肺心病10余年，近日来呼吸困难明显加重，并出现发绀等呼吸衰竭的表现，下列属于Ⅰ型呼吸衰竭的是

A、 $PaO_2 > 60\text{mmHg}$ ， $PaCO_2 > 50\text{mmHg}$

B、 $PaO_2 > 60\text{mmHg}$ ， $PaCO_2 < 50\text{mmHg}$

C、 $PaO_2 < 60\text{mmHg}$ ， $PaCO_2 < 50\text{mmHg}$

D、 $PaO_2 < 60\text{mmHg}$ ， $PaCO_2 > 50\text{mmHg}$

E、 $PaO_2 = 60\text{mmHg}$ ， $PaCO_2 = 50\text{mmHg}$

答案：C

52、患者女性，58岁，慢性阻塞性肺疾病多年，近一周因感冒而病情加重，以慢性肺源性心脏病收入院，慢性肺源性心脏病常见原因是

A、呼吸道感染

B、COPD

C、病毒

D、肺炎

E、支气管扩张

答案：B

53、患者女性，25岁。羊水栓塞诱发DIC。早期急救最应给的抗凝药物是

A、阿司匹林

B、潘生丁

C、肝素

D、速避凝

E、低分子右旋糖酐

答案：C

54、患者女，66岁。冠心病病史10年，突然意识丧失，口唇紫绀，颈动脉搏动消失，血压测不到，心电图提示心室颤动。此时最有效的抢救措施是

A、胸外心脏按压

B、人工呼吸

C、心内注射肾上腺素

D、非同步直流电复律

E、迅速建立静脉通路，静脉注射抗心律失常药物

答案：D

55、患儿男，5岁。自幼全身皮肤青紫，生长发育落后，杵状指（趾），喜蹲踞，诊断为法洛

四联症。3天前，出现腹泻，每日10余次；1天前，突然出现头晕，左侧肢体活动无力，该患儿可能并发了

- A、脑栓塞
- B、脑膜脑炎
- C、硬膜下积液
- D、脑室膜炎
- E、侧脑室炎

答案：A

56、患者，女性，68岁，患慢性充血性心力衰竭，医嘱地高辛0.25mg、qd，护士发药时应首先注意

- A、视病人服下后再离开
- B、给药前测脉率(心率)及节律
- C、嘱病人服药后多喝水
- D、将药研碎再喂服
- E、给药前测血压

答案：B

57、患者男，63岁。诊断为“肥厚梗阻型心肌病”，从床上起立时突然出现眩晕、眼前发黑，伴心慌、心前区不适。处理措施不正确的是

- A、立即平卧，停止活动
- B、不能使用洋地黄类药物
- C、给予吸氧，氧流量2~4L/分
- D、安慰患者，解除紧张情绪
- E、遵医嘱给予硝酸甘油舌下含化

答案：E

58、患者，男性，感染性休克，在输液期间，监测中心静脉压为4cmH₂O，血压80/60mmHg，正确的处理是

- A、减慢输液速度
- B、加快输液速度
- C、减慢输液，加利尿药
- D、维持原输液速度
- E、减慢输液速度加升压药

答案：B

59、早产儿，胎龄36周出生。家长看到护士到婴儿床前给药。经了解得知，早产儿出生第一天应补充的维生素是

- A、维生素A
- B、维生素D
- C、维生素B1
- D、维生素E
- E、维生素K1

答案：E

60、新生儿，出生1分钟Apgar评分为4分。面部与全身皮肤青紫；呼吸表浅且不规律；心率减慢，立即采取复苏措施。在新生儿初步复苏中，正确的步骤是

- A、保暖→体位→刺激→吸引→擦干
- B、保暖→吸引→擦干→体位→刺激

- C、刺激→保暖→体位→吸引→擦干
D、擦干→保暖→体位→吸引→刺激
E、保暖→体位→吸引→擦干→刺激

答案：E

61、患者，女性，60岁，绝经5年，出现不规则阴道出血4个月。检查：子宫稍大，质软，附件无异常，其可能的诊断是

- A、子宫内膜癌
B、宫颈息肉
C、宫颈癌
D、子宫肌腺病
E、子宫黏膜下肌瘤

答案：A

62、患者，男性，30岁。尿频、尿急、尿痛7天，以“急性尿路感染”在门诊应用抗生素治疗。进行尿细菌培养检查前，应嘱患者停用抗生素

- A、1天
B、2天
C、3天
D、4天
E、5天

答案：C

63、患者，女性，50岁。痛风病史6年。该患者不需要加以限制的食物有

- A、豆腐、蘑菇
B、土豆、鸡肉
C、红酒、牛排
D、鸡肝、米饭
E、海带、芹菜

答案：E

64、患者，男性，35岁。胰腺癌术后第5天，患者出现心慌、出冷汗，测血糖为3.2mmol/L，护士正确的护理是

- A、加快输液
B、输注全血
C、补充葡萄糖
D、减慢输液
E、增加胰岛素用量

答案：C

65、患者，女性，70岁，患慢性支气管炎，近几天咳嗽加剧，痰液粘稠，不易咳出，给予超声雾化吸入治疗，首选的药物是

- A、氨茶碱
B、 α -糜蛋白酶
C、庆大霉素
D、地塞米松
E、沙丁胺醇

答案：B

66、患者，男性，30岁。近2个月经常排便后滴少量鲜血。肛门指检无异常发现，肛

门镜检查截石位见 3、6 点各有一突于肛管内的暗红色圆形软结节，考虑该病人为

- A、I 期内痔
- B、II 期内痔
- C、III 期内痔
- D、IV 期内痔
- E、直肠息肉

答案：A

67、患儿男，7 岁，确诊水痘。抗病毒治疗首选药物为

- A、利巴韦林
- B、糖皮质激素
- C、肾上腺皮质激素
- D、阿米卡星
- E、阿昔洛韦

答案：E

68、患者，女性，35 岁。因胆道梗阻出现黄疸，尿中有胆红素，其尿液颜色为

- A、酱油色
- B、黄狼色
- C、淡黄色
- D、乳白色
- E、洗肉水色

答案：B

69、患者，女性，30 岁，下腹部外伤 4 小时，病人出现小腹隐痛伴排尿困难，试插导尿管可以顺利进入膀胱，注入 200ml 生理盐水后抽出不足 130ml，此种情况应首先考虑

- A、膀胱破裂
- B、前尿道损伤
- C、后尿道损伤
- D、输尿管损伤
- E、膀胱损伤合并尿道损伤

答案：A

70、患者，男性，50 岁，因肝硬化伴肝性脑病住院，病人淡漠少言，常衣冠不整，反应迟钝，对此期患者的饮食护理应注意

- A、应多饮水，增加食物吸收
- B、蛋白质应首选动物蛋白
- C、禁止从胃肠道补充蛋白质
- D、开始数天限制蛋白质在每天 20g 以内
- E、可适当增加高脂肪食物的摄入，补充营养

答案：D

71、患者男，25 岁。自述脑子空空的，整天什么事也不想，常沉默少语，交谈时词汇量特别少，如问“在这儿陪你的这位是谁啊？”答“妈”；问“你今年多大了？属什么的？”答“不知道”，该症状是

- A、思维迟缓
- B、思维贫乏
- C、思维中断
- D、思维松弛

E、思维散漫

答案：B

72、患者，女生，32岁。主诉近2个月反复白带增多、有难闻的鱼腥味。轻度外阴瘙痒或烧灼感。妇科检查：白带量较多、稀薄，阴道黏膜无红肿、充血。无滴虫、念珠菌或淋菌感染。清洁度Ⅰ度。诊断为：细菌性阴道炎。护士指导其配偶口服甲硝唑时应在

- A、禁酒2小时或3小时
- B、禁酒4小时或5小时
- C、禁酒6小时或7小时
- D、禁酒8小时或10小时
- E、禁酒24小时或72小时

答案：E

73、患者女，30岁，患抑郁症。其情绪障碍在一日之内的变化规律是

- A、昼轻夜重
- B、晨重暮轻
- C、夜间最重
- D、中午起逐渐加重
- E、中午最严重以后减轻

答案：B

74、女性，46岁，下班回家途中突然意识丧失，四肢抽搐，牙关紧闭，心率增快，血压升高，瞳孔散大，持续20秒后，肌肉开始出现强直和松弛交替。目前护士应该为患者提供的护理措施中不妥的是

- A、将患者头偏向一侧
- B、密切观察抽搐持续时间间隔时间
- C、测患者口温，以防高热
- D、密切观察患者意识状态生命体征和瞳孔变化
- E、不可强行按压或捆绑患者抽搐肢体，以防骨折

答案：C

75、患者女性，24岁，在与别人发生口角后突然出现严重的胸闷，呼吸困难，经医生检查没有器质性病变，静脉注射一支生理盐水，并向患者讲此药对缓解症状有帮助，果然患者恢复。这种治疗措施是

- A、提醒治疗
- B、暗示治疗
- C、鼓励治疗
- D、疏泄治疗
- E、引导治疗

答案：B

76、患者男，35岁。双下肢严重挤压伤，血压78/45mmHg，心率132次/分。护理中除严密观察生命体征外，最应密切观察

- A、下肢肿胀的情况
- B、患者的神志情况
- C、每小时尿量尿色
- D、患肢末端的温度
- E、伤口疼痛的程度

答案：C

77、患儿，6岁，不慎打翻开水瓶，双下肢被开水烫伤后皮肤出现大水疱、皮薄，疼痛明显，水疱破裂后创面为红色。其烧伤深度为

- A、Ⅰ度
- B、浅Ⅱ度
- C、深Ⅱ度
- D、Ⅲ度
- E、Ⅳ度

答案：B

78、患者，男性，25岁，昏迷在路边被警察送到医院，体检：深昏迷，呼吸大蒜气味，为进一步确诊有机磷农药中毒，其检测的客观依据是

- A、血液碳氧血红蛋白测定阳性
- B、心电图ST-T改变
- C、全血胆碱酯酶活力低于70%
- D、脑电图有缺氧性脑病的波形
- E、血气分析 $PaO_2 < 60\text{mmHg}$ ， $PaCO_2 > 50\text{mmHg}$

答案：C

79、患者，男性，26岁，足部被钉子扎伤后感染破伤风，出现肌肉阵发性痉挛，控制痉挛的最主要护理措施是

- A、住单人隔离病室
- B、限制家属探视
- C、避免声光刺激
- D、遵医嘱使用镇静药物
- E、静脉滴注破伤风抗毒素

答案：D

80、小儿，4岁。两天来无论活动还是安静时均有阵发性、痉挛性咳嗽。家长怀疑其与小伙伴追逐玩耍时误将硬币吞下，遂带其就诊以明确诊断。医生告知，可确诊支气管异物的检查是

- A、X线检查
- B、磁共振检查
- C、支气管镜检查
- D、CT扫描检查
- E、肺功能检查

答案：C

81、患者，男性，患有胃溃疡出血，经治疗出血停止，病情缓解，大便潜血试验阴性，患者呕血时应采取的体位是

- A、平卧位，头偏向一侧
- B、头低脚高位
- C、截石位
- D、膝胸位
- E、头高脚低位

答案：A

82、患儿女，10个月。发热3天，体温高达到 $39.0 \sim 40^\circ\text{C}$ ，咳嗽频繁，呼吸60次/分，双肺无明显的啰音，X线片示左肺大小不等的片状阴影，白细胞偏低，最可能的诊断是

- A、金黄色葡萄球菌肺炎

- B、呼吸道合胞病毒肺炎
- C、肺炎链球菌肺炎
- D、上呼吸道感染
- E、腺病毒肺炎

答案：E

83、患者，女性，50岁，有消化性溃疡史。饱餐后突发上腹部剧烈疼痛、腹肌紧张及休克。考虑可能出现的情况是

- A、急性阑尾炎
- B、急性胃穿孔
- C、急性胰腺炎
- D、急性胆管炎
- E、急性肠梗阻

答案：B

84、患儿，9岁，活动后气促4年余。2岁始出现活动后气促、乏力、口唇及指（趾）端发绀，喜欢下蹲位，可见杵状指。首先应考虑的疾病是

- A、房间隔缺损
- B、主动脉骑跨
- C、主动脉瓣狭窄
- D、法洛四联症
- E、病毒性心肌炎

答案：D

85、患者，男性，60岁，胃溃疡10年，持续上腹痛3个月。服用西咪替丁、奥美拉唑、制酸药等效果不显著，近3个月来疼痛逐渐加重，不易缓解。根据病情首先考虑的情况是

- A、胃溃疡伴上消化道出血
- B、胃溃疡癌变
- C、出凝血异常
- D、幽门梗阻
- E、溃疡活动期伴下消化道出血

答案：B

86、患者，男性，30岁。农民，面部水肿、疲倦、乏力半个月，双侧面颊和鼻梁部有蝶形红斑，表面光滑，指掌部可见充血红斑。实验室检查：血沉65mm/L，尿蛋白（+++），抗核抗体（+），抗Sm抗体（+）。Hb和血WBC正常。

该病可能的诊断是

- A、急性肾炎
- B、狼疮肾炎
- C、系统性红斑狼疮
- D、慢性肾炎
- E、肾病综合征

答案：C

87、患者女性，65岁。有动脉硬化病史5年，因饮食不当出现呕血、黑便1天入院，呕吐暗红色液体3次，量约800ml，解黑便2次，量约500g。查体：体温37.8℃，脉搏120次/分，呼吸

22次/分，血压85/60mmHg，神志萎靡，面色苍白，四肢湿冷，医嘱予以输血800ml。该患者目前最主要的护理问题是

- A、体液不足
- B、营养失调：低于机体需要量
- C、体温升高
- D、焦虑
- E、活动无耐力

答案：A

88、患者女性，65岁。有混硬化病史5年，因饮食不当出现呕血、黑便1天入院，呕吐暗红色液体3次，量约800ml，解黑便2次，量约500g。查体：体温37.8℃，脉搏120次/分，呼

吸22次/分，血压85/60mmHg，神志萎靡，面色苍白，四肢湿冷，医嘱予以输血800ml。最有可能出现的并发症为

- A、混肾综合征
- B、混肺综合征
- C、混性脑病
- D、上消化道出血
- E、水电解质酸碱平衡紊乱

答案：C

89、患者，男性，37岁，因活动后有呼吸困难，近半年有进行性加重，并伴有咳嗽、声音嘶哑，既往患者有风湿热8年，常有扁桃体炎发生，考虑为慢性风湿性心脏病二尖瓣狭窄。明确诊断风湿性心脏病二尖瓣狭窄的检查是

- A、心电图
- B、磁共振
- C、胸部线片
- D、血管造影
- E、超声心动图

答案：E

90、患者，男性，37岁，因活动后有呼吸困难，近半年有进行性加重，并伴有咳嗽、声音嘶哑，既往患者有风湿热8年，常有扁桃体炎发生，考虑为慢性风湿性心脏病二尖瓣狭窄。风湿性心脏病二尖瓣狭窄心电图表现正确的是

- A、P波提早出现，形态与窦性不同
- B、P波消失，代之以锯齿状
- C、P波消失，代之以大小形态不一的
- D、P波变窄，波宽度 $< 0.12s$
- E、二尖瓣型P波，波宽度 $> 0.12s$

答案：E

91 患者，男性，35岁，阑尾切除术后发生粘连性肠梗阻，脐周阵发性疼痛4天，恶心呕吐较频繁，口渴明显，尿少，查体：脉搏96次/min，血压95/65mmHg，腹胀不明显，偶见肠型，脐右侧有轻压痛，肠鸣音亢进，采用禁食、胃肠减压、输液及应用抗生素等非手术治疗。

为了纠正患者脱水，护士首先应给患者输入的液体是

- A、右旋糖酐
- B、平衡盐注射液
- C、6%碳酸氢钠
- D、0.1%氯化钠注射液

E、5%葡萄糖盐注射液

答案：B

92、患者，男性，35岁，阑尾切除术后发生粘连性肠梗阻，脐周阵发性疼痛4天，恶心呕吐较频繁，口渴明显，尿少，查体：脉搏96次/min，血压95/65mmHg，腹胀不明显，偶见肠型，脐右侧有轻压痛，肠鸣音亢进，采用禁食、胃肠减压、输液及应用抗生素等非手术治疗。

非手术治疗中，护士应采取的最重要的护理措施是

A、禁食

B、肠外营养支持

C、应用镇痛药

D、密切观察病情

E、保持有效的胃肠减压

答案：E

93、患者，男性，35岁，阑尾切除术后发生粘连性肠梗阻，脐周阵发性疼痛4天，恶心呕吐较频繁，口渴明显，尿少，查体：脉搏96次/min，血压95/65mmHg，腹胀不明显，偶见肠型，脐右侧有轻压痛，肠鸣音亢进，采用禁食、胃肠减压、输液及应用抗生素等非手术治疗。

护士告诉患者，如果出现了下列的哪项情况可以解除胃肠减压

A、呕吐停止

B、肛门排气

C、未见肠型

D、引流液减少

E、腹部无压痛

答案：B

94 患者，女性，45岁，间歇性上腹痛年，有暖气、返酸、食欲缺乏，冬春季节较常发作，近几天来腹痛加剧，突然呕血200ml

该患者出血的原因，最有可能的是

A、慢性胃炎

B、胃肠道黏膜糜烂

C、消化性溃疡

D、混硬化

E、胃癌

答案：C

95 患者，女性，45岁，间歇性上腹痛年，有暖气、返酸、食欲缺乏，冬春季节较常发作，近几天来腹痛加剧，突然呕血200ml

为确诊应首选

A、超声检查

B、胃液分析

C、大便隐血试验

D、X线钡餐检查

E、纤维内镜检查

答案：E

96 患者，女性，45岁，间歇性上腹痛年，有暖气、返酸、食欲缺乏，冬春季节较常发作，近几天来腹痛加剧，突然呕血200ml

最适宜采取何种治疗

- A、禁食
- B、禁食和输血治疗
- C、禁食和输液治疗
- D、输血治疗和酚磺乙胶
- E、流质饮食 + 输液 + 法莫替丁

答案：C

97、患者，女性，75岁，慢性阻塞性肺气肿8年，肺炎3天人院，9:00静脉输入10%葡萄糖溶液500ml和0.9%氯化钠溶液500ml时，滴速70滴/min，10:00患者突然出现呛咳、呼吸急促、大汗淋漓，咳粉红色泡沫痰判断该患者最可能发生的情况是

- A、循环负荷过重
- B、支气管哮喘发作
- C、输液过敏反应
- D、发生Ⅱ型呼吸衰竭
- E、细菌污染反应

答案：A

98 患者，女性，75岁，慢性阻塞性肺气肿8年，肺炎3天人院，9:00静脉输入10%葡萄糖溶液500ml和0.9%氯化钠溶液500ml时，滴速70滴/min，10:00患者突然出现呛咳、呼吸急促、大汗淋漓，咳粉红色泡沫痰

护士应首先采取的措施是

- A、立即给患者氧气吸入
- B、立即给予患者平喘强心药物
- C、给予患者平卧位
- D、立即停止10%葡萄糖溶液和0.9%氯化钠溶液的输入
- E、立即通知医师

答案：D

99 患者，女性，75岁，慢性阻塞性肺气肿8年，肺炎3天人院，9:00静脉输入10%葡萄糖溶液500ml和0.9%氯化钠溶液500ml时，滴速70滴/min，10:00患者突然出现呛咳、呼吸急促、大汗淋漓，咳粉红色泡沫痰给患者吸入乙醇湿化氧，其乙醇浓度为

- A、10%~15%
- B、20%~30%
- C、40%~50%
- D、50%~60%
- E、70%~80%

答案：B

100 患者，女性，75岁，慢性阻塞性肺气肿8年，肺炎3天人院，9:00静脉输入10%葡萄糖溶液500ml和0.9%氯化钠溶液500ml时，滴速70滴/min，10:00患者突然出现呛咳、呼吸急促、大汗淋漓，咳粉红色泡沫痰

吸入乙醇湿化氧的目的是

- A、降低肺泡内泡沫的表面张力，改善气体交换
- B、刺激肺泡扩张，加大通气量
- C、刺激化学感受器，兴奋呼吸中枢
- D、降低肺泡的张力，改善肺气肿

E、舒张周围血管，促进液体排泄

答案：A

101 患者，男性，30 岁。农民，面部水肿、疲倦、乏力半个月，双侧面颊和鼻梁部有蝶形红斑，表面光滑，指掌部可见充血红斑。实验室检查：血沉 65mm/L，尿蛋白（+++），抗核抗体（+），抗 Sm 抗体（+）。Hb 和血 WBC 正常。

需采取的护理措施是

- A、皮肤护理
- B、饮食可以吃无花果
- C、多在阳光下活动
- D、洗脸时涂一些营养霜
- E、饮食宜浓厚

答案：A

102 患者，男性，30 岁。农民，面部水肿、疲倦、乏力半个月，双侧面颊和鼻梁部有蝶形红斑，表面光滑，指掌部可见充血红斑。实验室检查：血沉 65mm/L，尿蛋白（+++），抗核抗体（+），抗 Sm 抗体（+）。Hb 和血 WBC 正常。

针对病情，目前护士应教育患者重点注意

- A、肾功能变化，定期复查
- B、有无消化道出血
- C、有无自我形象紊乱的自卑
- D、血红蛋白变化
- E、血白细胞变化

答案：A

103 患者，男性，30 岁。农民，面部水肿、疲倦、乏力半个月，双侧面颊和鼻梁部有蝶形红斑，表面光滑，指掌部可见充血红斑。实验室检查：血沉 65mm/L，尿蛋白（+++），抗核抗体（+），抗 Sm 抗体（+）。Hb 和血 WBC 正常。

治疗过程中患者出现了胃肠不适、脱发，血象 WBC $11.0 \times 10^9/L$ ，可能发生了

- A、激素副作用
- B、免疫抑制剂的不良反应
- C、肝炎
- D、胃炎
- E、感染

答案：B

104 患者，女性，60 岁，患十二指肠溃疡 4 年。今晨起突然排出大量柏油样黑便，并出现恶心、头晕、心悸、无力，由家人送至医院急诊。查体：体温 36.5℃，血压 85/50mmHg，脉搏 110 次/分钟；患者面色苍白、出冷汗、四肢湿冷；腹部稍胀，上腹部有轻度压痛。初步考虑患者有十二指肠溃疡大出血。

考虑该患者出现休克的主要依据是

- A、恶心呕吐
- B、头晕、心悸、无力
- C、血压下降、脉搏细速
- D、排大量柏油样便
- E、面色苍白、出冷汗、四肢湿冷

答案：C

105 患者，女性，60 岁，患十二指肠溃疡 4 年。今晨起突然排出大量柏油样黑便，并出现恶

心、头晕、心悸、无力，由家人送至医院急诊。查体：体温 36.5℃，血压 85/50mmHg，脉搏 110 次 / 分钟；患者面色苍白、出冷汗、四肢湿冷；腹部稍胀，上腹部有轻度压痛。初步考虑患者有十二指肠溃疡大出血。

十二指肠溃疡大出血的常见部位是

- A、十二指肠球部
- B、十二指肠水平部
- C、十二指肠降部
- D、十二指肠升部
- E、十二指肠与空肠交界处

答案：A

106 患者，女性，60 岁，患十二指肠溃疡 4 年。今晨起突然排出大量柏油样黑便，并出现恶心、头晕、心悸、无力，由家人送至医院急诊。查体：体温 36.5℃，血压 85/50mmHg，脉搏 110 次 / 分钟；患者面色苍白、出冷汗、四肢湿冷；腹部稍胀，上腹部有轻度压痛。初步考虑患者有十二指肠溃疡大出血。

初步估计该患者的失血量为

- A、300ml
- B、400ml
- C、600ml
- D、800ml
- E、1700ml

答案：D

107 患者，女性，60 岁，患十二指肠溃疡 4 年。今晨起突然排出大量柏油样黑便，并出现恶心、头晕、心悸、无力，由家人送至医院急诊。查体：体温 36.5℃，血压 85/50mmHg，脉搏 110 次 / 分钟；患者面色苍白、出冷汗、四肢湿冷；腹部稍胀，上腹部有轻度压痛。初步考虑患者有十二指肠溃疡大出血。

目前该患者最主要的护理问题是

- A、焦虑恐惧
- B、体液不足
- C、疼痛
- D、有感染的危险
- E、营养不足

答案：B

108 患者，女性，60 岁，患十二指肠溃疡 4 年。今晨起突然排出大量柏油样黑便，并出现恶心、头晕、心悸、无力，由家人送至医院急诊。查体：体温 36.5℃，血压 85/50mmHg，脉搏 110 次 / 分钟；患者面色苍白、出冷汗、四肢湿冷；腹部稍胀，上腹部有轻度压痛。初步考虑患者有十二指肠溃疡大出血。

该患者应采取何种体位

- A、半坐卧位
- B、低坡半卧位
- C、中凹卧位
- D、头低足高位
- E、头高足低位

答案：C

109 患者，女性，38 岁，身高 160cm，体重 45kg。因肺结核咯血收入院。夜班护士查房时

发现该患者咯血约 200ml 后突然中断，呼吸极度困难，喉部有痰鸣音，表情恐怖，两手乱抓，眼球上翻，发绀。

护士应判断患者最可能发生了

- A、出血性休克
- B、窒息
- C、肺不张
- D、肺部感染
- E、贫血

答案：B

110 患者，女性，38 岁，身高 160cm，体重 45kg。因肺结核咯血收入院。夜班护士查房时发现该患者咯血约 200ml 后突然中断，呼吸极度困难，喉部有痰鸣音，表情恐怖，两手乱抓，眼球上翻，发绀。

此时护士最恰当的处理措施是

- A、立即通知医师
- B、立即气管插管
- C、清除呼吸道积血
- D、给予高流量氧气吸入
- E、应用呼吸兴奋剂

答案：C

111 发现该患者咯血约 200ml 后突然中断，呼吸极度困难，喉部有痰鸣音，表情恐怖，两手乱抓，眼球上翻，发绀。

护士针对该患者营养失调的护理措施，正确的是

- A、控制蛋白质的入量
- B、少吃牛奶豆浆、鸡蛋等
- C、控制水的入量
- D、给予高蛋白、高热量饮食
- E、减少维生素 B 和维生素 C 的摄入

答案：D

112 患儿，6 个月，患支气管肺炎，晚上突然烦躁不安，喘憋加重。呼 65 次/分，心率 180 次/分，心音低钝，两肺细湿啰音增多，肝脏比以前增大 2.0cm。患儿可能发生了

- A、急性心力衰竭
- B、脓胸
- C、脓气胸
- D、肺大疱
- E、肺不张

答案：A

113、患儿，6 个月，患支气管肺炎，晚上突然烦躁不安，喘憋加重。呼吸 65 次/分，心率 180 次/分，心音低钝，两肺细湿啰音增多，肝脏比以前增大 2.0cm。根据以上病情变化，首选的护理措施是

- A、保证热量
- B、半坐卧位
- C、控制感染
- D、供给足够的水量
- E、供给足够的蛋白质

答案：B

114、患儿，6个月，患支气管肺炎，晚上突然烦躁不安，喘憋加重。呼吸65次/分，心率180次/分，心音低钝，两肺细湿啰音增多，肝脏比以前增大2.0cm。出院时健康指导错误的是

- A、多晒太阳
- B、体育锻炼
- C、勤到公共场所
- D、定期健康检查
- E、按时预防接种

答案：C

115、导致COPD最常见的因素是

- A、吸烟
- B、职业粉尘
- C、大气污染
- D、感染
- E、蛋白酶-抗蛋白酶失调

答案：A

116、患者女，32岁，医嘱行¹³¹I甲状腺功能测定，护士指导患者在试验期间应忌食的食物是。

- A、芹菜
- B、紫菜
- C、花菜
- D、黄瓜
- E、西红柿

答案：B

117、关于肝硬化门脉高压患者的临床表现，错误的叙述是

- A、早期可出现脾大，脾功能亢进
- B、全身无出血倾向
- C、可出现黄疸蜘蛛痣、腹壁静脉曲张等
- D、腹部膨隆，可叩出腹部移动性浊音
- E、门静脉血液阻力增加是门脉高压的始动因素

答案：B

118、颅前窝骨折皮下瘀斑的典型体征是

- A、三主征
- B、“熊猫眼”征
- C、三凹征
- D、Murphy征
- E、五联征

答案：B

119、急性上呼吸道感染最常见的病原体是

- A、细菌
- B、病毒
- C、真菌
- D、支原体

E、葡萄球菌

答案： B

120、患者女， 28 岁孕 27 周。因胎儿畸形行引产术后 2 周，感自责、自罪，并有自伤行为，该患者最可能发生的心理障碍是

A、产后自残

B、产后抑郁

C、产后沮丧

D、产后焦虑

E、产后紧张

答案： B



金英杰医学

JINYINGJIE.COM