

全国护士执业资格考试

押题试卷(二)

专业务实

一、A1/A2型选择题(1~93题)

答题说明

以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 测量脉搏应首选()
- A. 颞浅动脉
B. 腘动脉
C. 桡动脉
D. 颈动脉
E. 肱动脉
2. 压疮淤血红润期的主要特点是()
- A. 皮下产生硬结, 表皮出现水疱
B. 组织坏死发黑, 炎性分泌物增多
C. 局部淤血导致血栓形成, 组织缺血缺氧
D. 浅层组织感染, 形成溃疡
E. 局部皮肤红、肿、热、痛
3. 治疗破伤风病人时, 注射破伤风抗毒素的作用是()
- A. 中和游离毒素
B. 清除毒素来源
C. 控制并解除痉挛
D. 防止并发症
E. 保持呼吸通畅
4. 禁止使用铁剂、动物血、肝类、瘦肉及绿叶蔬菜的试验饮食是()
- A. 胆囊造影饮食
B. 隐血试验饮食
C. 吸碘试验饮食
D. 肌酐试验饮食
E. 尿浓缩试验饮食
5. 对焦虑症患者的处理不恰当的是()
- A. 矫正病人歪曲的认知
B. 利用生物反馈信息训练病人放松
C. 督导病人进行放松式调理
D. 关注患者过多不适的主诉
E. 转移患者注意力, 减轻焦虑情绪
6. 下列具有自律性的心肌细胞为()
- A. 浦肯野纤维细胞
B. 心室肌细胞
C. 心内膜细胞
D. 乳头肌细胞
E. 窦房结细胞
7. 与消化性溃疡发生关系密切的细菌是()
- A. 链球菌
B. 霍乱弧菌
C. 幽门螺杆菌
D. 痢疾杆菌
E. 大肠杆菌
8. 服用下列药物时, 需常规测量脉搏或心率的是()

- A. 心得安
B. 安定
C. 洋地黄
D. 强的松
E. 氯丙嗪
9. 根据血压水平的定义和分类, 血压 130/88mmHg 属于()
A. 正常血压
B. 正常高值
C. I 级高血压
D. II 级高血压
E. III 级高血压
10. 传染病区, 中班护士与夜班护士床旁交班后, 隔离衣悬挂正确的是()
A. 挂在治疗室, 清洁面向外
B. 挂在治疗室, 清洁面向内
C. 挂在病室, 清洁面朝外
D. 挂在走廊, 清洁面朝外
E. 挂在走廊, 清洁面朝内
11. 急性胃炎频繁呕吐, 首先应观察()
A. 呕吐物性质及量
B. 皮肤出血点
C. 呼吸变化
D. 体温
E. 意识状态
12. 昏迷期肝性脑病患者清醒后可逐步增加蛋白质饮食而最适宜的蛋白质食品是()
A. 肉类
B. 乳类
C. 蛋类
D. 禽类
E. 豆类
13. 急性胰腺炎病人禁食时每天应补液多少()
A. 1000ml
B. 1500ml
C. 2000ml
D. 1500~2000ml
E. 2000~3000ml
14. 对压眶刺激出现痛苦表情, 没有言语应答, 并不能执行简单的命令的意识障碍病人处于下列哪种状态()
A. 昏迷
B. 嗜睡
C. 睁眼昏迷
D. 浅昏迷
E. 深昏迷
15. 对肝性脑病人一般禁止应用安眠药和镇静药物, 其原因是()
A. 避免掩盖病情, 加重昏迷
B. 防止感染
C. 预防脑水肿
D. 易致便秘
E. 影响利尿药作用
16. 慢性支气管炎发生和加重的重要因素是()
A. 大气污染
B. 冷空气刺激
C. 吸烟
D. 反复感染

E. 过敏反应

17. 护理程序的概念是()

A. 进行整体护理

B. 找出护理诊断

C. 设立预期目标

D. 提供护士的工作程序或方法

E. 实施护理措施后作评价

18. 传染病的流行过程必须具备哪三个基本环节()

A. 病原体、环境、易感人群

B. 病原体、环境、传染源

C. 传染源、传播途径、易感人群

D. 病原体、传播途径、易感人群

E. 传染源、传播途径、环境

19. 多尿是指成人 24h 尿量大于()

A. 1000ml

B. 1500ml

C. 2000ml

D. 2500ml

E. 3000ml

20. 由肾脏产生的最终合成血管紧张素 II 的激素是()

A. 肾素

B. 促红细胞生成素

C. 前列腺素族

D. 激肽类

E. 缓激肽

21. 为降低血氨浓度, 肝性脑病昏迷的患者可鼻饲给予()

A. 蛋汤

B. 豆浆

C. 鸡汤

D. 牛奶

E. 25%葡萄糖液

22. 肠套叠患儿的大便性状是()

A. 脓血便

B. 黏液便

C. 柏油便

D. 果酱样便

E. 蛋花汤样便

23. 急性胰腺炎的首发症状是()

A. 发热

B. 腹痛

C. 恶心

D. 呕吐

E. 休克

24. 十二指肠溃疡的好发部位是()

A. 降部

B. 升部

C. 降部和升部

D. 球部

E. 水平部

25. 急性胰腺炎患者禁食的目的是()

A. 避免胃扩张

B. 解除胰管痉挛

C. 控制饮食

D. 减少胰液分泌

E. 减少胃液分泌

26. 细菌性肺炎最常见的病原菌是()

A. 克雷伯杆菌

- B. 铜绿假单胞菌
C. 大肠杆菌
D. 肺炎链球菌
E. 葡萄球菌
27. 麻疹的主要传播途径是()
A. 消化道传播
B. 接触传播
C. 虫媒传播
D. 飞沫传播
E. 血液传播
28. 口底、颌下及颈部蜂窝织炎的最严重后果是()
A. 发热
B. 吞咽困难
C. 呼吸困难、窒息
D. 全身性感染
E. 化脓性海绵状静脉窦炎
29. 未母乳喂养或未做到及时有效母乳喂养的产妇,通常可于产后 3~4 天因乳房血管、淋巴管极度充盈可有发热,称为()
A. 泌乳热
B. 乳腺炎
C. 产后热
D. 产源热
E. 产褥感染
30. 为预防佝偻病,出生后开始服用维生素 D 的时间是()
A. 15 天
B. 5 个月
C. 2 个月
D. 6 个月
E. 4 个月
31. 小儿发育成熟最晚的系统是()
A. 淋巴系统
B. 循环系统
C. 消化系统
D. 神经系统
E. 生殖系统
32. 肾病综合征大量蛋白尿的原因是()
A. 血压高
B. 少尿
C. 肾小球滤过率降低
D. 水肿
E. 感染
33. 类风湿关节最基本的病理变化是()
A. 血管炎
B. 骨质增生
C. 周围神经病变
D. 关节滑膜炎
E. 软骨增生
34. 中医的五脏是指心、肝、脾、肺和()
A. 胃
B. 脑
C. 肾
D. 小肠
E. 三焦
35. 护士未认真核对,将患者液体输错,但及时发现未造成不良后果,该行为属于()
A. 二级乙等医疗事故
B. 三级甲等医疗事故

- C. 四级医疗事故
- D. 意外事故
- E. 不属于医疗事故
36. 临床护理工作中, 由一组护理人员应用护理程序的工作方法, 共同完成对一组患者的护理工作称为()
- A. 特级护理
- B. 小组护理
- C. 个案护理
- D. 综合护理
- E. 功能制护理
37. 一急诊患者在就诊过程中, 护士没有询问患者有无青霉素过敏史即为患者做青霉素试验, 造成患者休克死亡。护士的医疗过失行为所占的比重是()
- A. 轻微责任
- B. 主要责任
- C. 次要责任
- D. 同等责任
- E. 完全责任
38. 护士小王在上夜班时, 有一位患者的家属在熄灯后执意要进入病房探视, 小王担心影响患者休息加以阻拦, 但患者家属不听劝阻并和小王产生争执, 第二天还投诉到护士长。护士长应首先做的工作是()
- A. 了解情况
- B. 训斥小王
- C. 向家属解释
- D. 向家属道歉
- E. 告诉医生
39. 护士长因陈护士经常因为孩子请假、影响工作而不满; 陈护士则认为护士长对她不体谅、缺乏人情味, 为此两人关系一直比较紧张。影响她们关系的主要原因是()
- A. 角色压力过重
- B. 经济压力过重
- C. 角色责任模糊
- D. 角色权利争议
- E. 期望值差异
40. 领导影响力的权利性影响力是指()
- A. 知识因素
- B. 资历因素
- C. 品格因素
- D. 感情因素
- E. 才能因素
41. 大多数抗肿瘤药物的不良反应主要是()
- A. 低热
- B. 黄疸
- C. 少尿
- D. 失眠、头痛
- E. 骨髓抑制、胃肠道反应
42. 术后无需去枕平卧的麻醉方式是()
- A. 吸入麻醉
- B. 硬膜外阻滞麻醉
- C. 蛛网膜下腔阻滞麻醉
- D. 静脉麻醉
- E. 复合麻醉
43. 为监测 ICU 病室的环境情况作空气培养的间隔时间是()
- A. 10 天一次

B. 20 天一次

C. 30 天一次

D. 45 天一次

E. 60 天一次

44. 输入贮存过久的库存血时, 易引起 ()

A. 高钠血症

B. 低钙血症

C. 低钾血症

D. 高钾血症

E. 低钠血症

45. 某孕妇忘记了自己的末次月经, 但肯定提前了不少时间分娩, 娩出时婴儿身长 45cm, 体重 2500g, 皮下脂肪少, 头发、指甲已达指端, 估计该孕妇的可能为 ()

A. 16 周末

B. 20 周末

C. 26 周末

D. 32 周末

E. 36 周末

46. 阴道豆渣样白带见于 ()

A. 老年性阴道炎

B. 假丝酵母菌阴道炎

C. 滴虫阴道炎

D. 慢性宫颈炎

E. 外阴炎

47. 慢性宫颈炎最常见的病变是 ()

A. 宫颈糜烂

B. 宫颈肥大

C. 宫颈息肉

D. 宫颈腺腺体囊肿

E. 宫颈糜烂炎

48. 引起产后出血最常见的原因是 ()

A. 产道裂伤

B. 胎盘剥离不全

C. 宫缩乏力

D. 凝血机制障碍

E. 滞产

49. 肛裂发生的主要因素是 ()

A. 长期腹泻

B. 进食辛辣食物

C. 长期排尿困难

D. 大便干硬

E. 肛管慢性炎症

50. 患者, 男, 32 岁, 胃穿孔后行胃大部切除术, 术后第 2 天突发右上腹部剧痛, 伴明显腹膜刺激征。最可能发生了 ()

A. 吻合口出血

B. 吻合口梗阻

C. 倾倒综合征

D. 十二指肠残端破裂

E. 吻合口近端空肠段梗阻

51. 患者, 男性, 46 岁, 阿米巴痢疾, 为患者行保留灌肠时, 应让患者采取右侧卧位, 其目的是 ()

A. 使患者舒适安全

B. 缓解患者痛苦

C. 利于药液保留, 提高疗效

D. 减轻药物毒副作用

E. 减少对患者刺激

52. 患者, 女性, 30 岁, 结核病, 医嘱链霉素治

疗,链霉素皮试发生过敏性休克而出现中枢神经系统症状,其原因是()

- A. 有效循环血容量锐减
- B. 毛细血管扩张,通透性增加
- C. 肺水肿
- D. 骨衰竭
- E. 脑组织缺氧

53. 患者,女性,35岁,需留取粪便标本检查蛲虫,护士应告知患者标本采集的时间是()

- A. 早餐后立即采集
- B. 餐后4h内
- C. 上午11时
- D. 午休后1h内
- E. 晚上睡觉前

54. 患者,女性,25岁。伤寒,体温 38.5°C ,宜食用的食物是()

- A. 鸡蛋
- B. 豆腐
- C. 豆浆
- D. 稠米粥
- E. 鱼汤

55. 患儿,女,6岁,因家中起火造成大面积烧伤,护士应提供的护理级别是()

- A. 一级护理
- B. 二级护理
- C. 三级护理
- D. 特级护理
- E. 重症护理

56. 患者,女性,75岁,文盲,因头晕、头痛来医院就诊,对前来就诊的患者,门诊护士首

先应进行()

- A. 心理安慰
- B. 卫生指导
- C. 预检分诊
- D. 用药指导
- E. 查阅病历资料

57. 患者,女性,25岁。左下肢外伤后,未得到正确处理,而导致破伤风。为该患者左下肢伤口更换敷料后,其敷料处理方法是()

- A. 送焚烧炉焚烧
- B. 过氧乙酸浸泡后清洗
- C. 日光下暴晒后清洗
- D. 丢入污物桶后再集中处理
- E. 高压灭菌后再清洗

58. 患者,女性,60岁,腹泻,体温 $39\sim 40^{\circ}\text{C}$,持续数日,诊断“细菌性痢疾”。此患者体温热型为()

- A. 稽留热
- B. 波浪热
- C. 弛张热
- D. 间歇热
- E. 不规则热

59. 患者,女性,75岁,因脑血栓导致左侧偏瘫。住院3天后,护士发现其右侧骶尾部皮肤发红,并伴有肿、热、痛,皮肤未破损。此患者右侧骶尾部皮肤的改变为压疮的()

- A. 浅度溃疡期
- B. 坏死溃疡期
- C. 深度溃疡期
- D. 炎性浸润期

E. 淤血红润期

60. 患者, 女性, 30 岁, 静脉留置套管针第二天, 今晨输液液体滴入不畅, 局部无肿胀, 检查有回血, 护士首先应()

A. 检查管道, 抬高输液瓶位置

B. 更换针头重新穿刺

C. 盐水或肝素钠冲管

D. 减慢输液速度

E. 输液静脉上方热敷

61. 判断小儿体格发育的常用主要指标有()

A. 体重、身高、头围、腹围

B. 语言发育程度

C. 智力发育水平

D. 对外界反应能力

E. 动作能力或运动能力

62. 前囟饱满多见于()

A. 佝偻病

B. 头畸形

C. 呆小病

D. 脑积水

E. 甲状腺功能减低症

63. 乙肝疫苗初次免疫接种的年龄是()

A. 生后 24h 内

B. 2 个月以上

C. 8 个月以上

D. 3 个月以上

E. 1 岁以上

64. 患者, 男, 50 岁。被诊断为胃癌晚期, 患者对家属的照顾和护士工作不满, 要求停止治疗, 患者的心理反应属于()

A. 否认期

B. 愤怒期

C. 协议期

D. 忧郁期

E. 接受期

65. 母乳喂养有利于预防佝偻病的主要原因是()

A. 母乳中乳白蛋白含量多

B. 不饱和脂肪酸多

C. 糖含量高

D. SIgA 多

E. 钙、磷比例合适

66. 小儿断奶的季节的选择下列哪项更适宜()

A. 冬季

B. 夏季

C. 春秋季节

D. 夏秋季

E. 冬春季

67. 使用蓝光疗法时, 为使患儿皮肤均匀受热, 更换体位时间是()

A. 每 1h 一次

B. 每 2h 一次

C. 每 3h 一次

D. 每 4h 一次

E. 每 5h 一次

68. 某儿 2 岁, 发育正常, 其膳食安排下列哪项是正确的()

A. 随成人同吃普通膳食

B. 每日三餐外加点心 3 次

- C. 每日三餐外加点心 2 次, 维生素 D 15 万单位
- D. 每日三餐外加点心 1~2 次
- E. 每日三餐以流食、半流食为主
69. 青年女性患者, 患支气管扩张多年, 常反复咯血。就诊时又因剧烈咳嗽而致大咯血, 在观察中突然发现咯血中止, 病人表情恐怖, 张口瞪眼, 两手乱抓, 应考虑发生下列何种紧急状况而需立即抢救()
- A. 肺梗塞
- B. 窒息
- C. 休克
- D. 呼吸衰竭
- E. 心力衰竭
70. 关于小儿腹泻的治疗措施, 应除外()
- A. 纠正水、电解质紊乱
- B. 严重脱水应及时补液
- C. 及时使用止泻剂
- D. 给予助消化药
- E. 要注意补钾
71. 患者, 男性, 30 岁, 今晨在腰麻下行单纯肾切除术, 术前护士为其插导尿管, 目的是()
- A. 便于手术进行
- B. 避免术中出现尿失禁
- C. 避免术中误伤膀胱
- D. 引出尿液, 以防术中尿潴留
- E. 术后冲洗尿道, 以防感染
72. 患者, 女性, 40 岁, 因尿急、尿频、尿痛入院。遵医嘱行尿细菌培养, 护士留取尿标本的方法是()
- A. 收集 24h 尿
- B. 患者自己留尿
- C. 留取中段尿
- D. 留取前段尿
- E. 导尿
73. 患者, 女性, 35 岁, 已婚, 未育, 体检发现宫颈中度糜烂, 子宫颈刮片检查正常, 针对该病患者最合适的处理是()
- A. 局部药物治疗
- B. 宫颈锥切术
- C. 口服抗生素
- D. 物理治疗
- E. 门诊随访观察
74. 患者, 男性, 85 岁。无明显诱因出现精神失常, 表现能凭空听到已故的亲人呼唤他, 叫他也随他们而去, 称自己走到哪里那些已故的亲人都跟着他, 患者出现了()
- A. 正常人没有的知觉
- B. 歪曲的知觉
- C. 歪曲的感觉
- D. 虚幻的知觉
- E. 虚幻的感觉
75. 患抑郁症病人告诉你:“别在我这浪费时间了, 去和那些值得你费工夫的人谈谈吧。”你的最佳反应是()
- A. “不用担心, 我有的是时间”
- B. “如果你不想说, 我们就在这坐一会儿”
- C. “你这样孤独对你没有好处”
- D. “你这样说可不对”

E. “别这么说,你应该振作一点”

76. 患者,男性,因车祸急诊,查体可见眶周和球结膜下瘀斑,鼻腔有血性液体流出,应考虑该患者可能存在()

- A. 颅前窝骨折
- B. 硬脑膜外血肿
- C. 硬脑膜下血肿
- D. 颅中窝骨折
- E. 颅后窝骨折

77. 患者,女性,67岁,车祸后出现下列损伤,现场护士急救时优先处理的是()

- A. 胸壁损伤
- B. 张力性气胸
- C. 右侧胫骨开放性骨折
- D. 腓骨干骨折
- E. 右前臂皮肤擦伤

78. 某肿瘤化疗患者,出现恶心、呕吐并伴有腹痛、腹泻,患者因此拒绝继续化疗,面对这种情况责任护士采取了诸多措施,但应除外()

- A. 加强营养支持
- B. 观察腹痛、腹泻情况,对症处理
- C. 告知患者坚持化疗的重要性
- D. 改成晚间给药,降低反应
- E. 立即停药

79. 患者,男性,35岁,患有慢性胃溃疡7年。近日胃部疼痛,粪便颜色发黑。医生拟为患者行隐血试验。护士告诉患者3天内禁食的食物有()

- A. 面条

B. 猪肝

C. 白菜

D. 豆浆

E. 大米稀饭

80. 某医院的护理管理架构是护理部主任-科护士长-病区护士长。请问该医院护理管理的层次是()

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 四级
- E. 五级

81. 患者,女性,47岁,拟行子宫切除术,护士在术前为其导尿时,发现手套有破洞。此时正确的处理方法是()

- A. 立即更换无菌手套
- B. 用乙醇棉球擦拭破裂处
- C. 用无菌治疗巾包裹手指操作
- D. 用无菌医疗贴贴好破洞处再使用
- E. 为缩短操作时间,减轻患者痛苦,继续操作

82. 患者,女性,60岁,有心脏病史,可疑直肠癌,准备进行直肠指检,护士应协助患者采用的体位是()

- A. 端坐卧位
- B. 中凹卧位
- C. 膝胸卧位
- D. 俯卧位
- E. 仰卧位

83. 患者,女性,38岁,因外伤瘫痪导致尿失

禁,留置导尿,尿液出现浮浊、色黄,护理时应注意()

- A. 进行膀胱冲洗
- B. 观察尿量并记录
- C. 促进膀胱功能恢复
- D. 及时更换导尿管
- E. 经常清洗尿道口

84. 患者,男性,25岁,注射青霉素过程中,觉头晕、胸闷、面色苍白、脉细弱、血压下降,应立即注射的药物是()

- A. 异丙嗪
- B. 氢化可的松
- C. 去甲肾上腺素
- D. 尼可刹米
- E. 盐酸肾上腺素

85. 患者,男性,45岁,风湿性心脏病伴心功能不全,双下肢及身体下垂部位严重水肿,该患者每日饮食中应控制()

- A. 摄入盐量不超过 0.5g
- B. 摄入盐量不超过 2g
- C. 摄入钠量不超过 0.5g
- D. 摄入钠量不超过 2g
- E. 摄入盐量不超过 4g

86. 患者,男性,20岁,行扁桃体摘除术,术后应将冰袋置于()

- A. 颈前颌下
- B. 腋窝处
- C. 前额
- D. 胸部
- E. 头顶部

87. 热水坐浴禁用于()

- A. 急性盆腔炎
- B. 外阴部炎症
- C. 肛门部充血
- D. 痔疮术后
- E. 肛裂疼痛

88. 患者,女性,33岁。有系统性红斑狼疮5年,一直服用药物治疗,最近主诉视力下降,可能是因为服用了()

- A. 地塞米松
- B. 阿司匹林
- C. 抗疟药
- D. 吲哚美辛
- E. 布洛芬

89. 患者,女性,58岁,支气管哮喘发作入院,护士在对其说明服药注意事项时,合适的距离应为()

- A. 0~40cm
- B. 50~140cm
- C. 50~100cm
- D. 80~150cm
- E. 0~80cm

90. 患者,女性,20岁,自发性气胸就医,置胸腔闭式引流,下地活动时不慎将引流管脱出,护士首要的处理是()

- A. 给患者吸氧
- B. 通知医师紧急处理
- C. 将脱出的引流管重新置入
- D. 用手指提闭引流口周围皮肤
- E. 嘱患者缓慢呼吸

91. 患者, 男性, 右下肢开放性骨折术后, 麻醉床橡胶单的位置, 错误的是()

- A. 盖被纵向呈扇形三折于床的一侧
- B. 根据病情铺橡胶单与中单
- C. 防止橡胶单与病人直接接触
- D. 盖被开口背门
- E. 枕头横立于床头, 开口背门

92. 患者, 男性, 23 岁, 急性肾小球肾炎, 遵医嘱行爱迪计数检查, 应添加的防腐剂是()

- A. 10% 甲醛
- B. 20% 甲醛
- C. 40% 甲醛

D. 甲苯

E. 浓盐酸

93. 患者, 女, 63 岁, 因支气管扩张合并肺部感染、左心力衰竭入院治疗, 入院时体温 39℃, 呼吸急促, 端坐呼吸。遵医嘱给予地高辛治疗, 患者服用地高辛几天后, 出现恶心、呕吐、视物模糊, 护士应立即()

- A. 报告护士长
- B. 给予止吐药
- C. 做心电图检查
- D. 做好患者心理护理
- E. 停止服药并报告医生

二、A3/A4 型选择题 (94~120 题)

答题说明

以下提供若干个案例, 每个案例有若干个考题。请根据提供的信息, 在每题的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

(94~98 题共用题干)

患者, 女性, 36 岁, 车祸。患者外伤致脾破裂, 除立即手术外尚需输入大量血液。

94. 护士向家属解释输血的目的是为了补充()

- A. 血小板
- B. 血容量
- C. 凝血因子
- D. 血红蛋白
- E. 白蛋白和补体

95. 给患者输入大量库存血, 护士应注意防止发生()

- A. 低血钾, 碱中毒
- B. 高血钾, 酸中毒
- C. 高血钠, 酸中毒
- D. 低血钾, 酸中毒
- E. 高氯, 碱中毒

96. 给患者输入的是两个献血员的血液, 护士在中间应输入()

- A. 5% 葡萄糖注射液
- B. 5% 葡萄糖氯化钠注射液
- C. 10% 葡萄糖酸钙注射液
- D. 生理盐水注射液
- E. 3%~5% 氯化钠注射液

97. 为防止过敏反应发生, 护士可给患者肌内注射()

- A. 阿托品
- B. 肾上腺素
- C. 异丙嗪
- D. 强心特类药
- E. 盐酸肾上腺素

98. 如库存血不够, 需临时找献血员, 下列可做献血员的是()

- A. 几年前患过伤寒者
- B. 有肝炎史者
- C. 有过敏史者
- D. 发热者
- E. 凝血功能异常者

(99~101 题共用题干)

患者, 男性, 50 岁, 近日来反复上腹疼痛, 进食后 3h 左右疼痛明显, 进餐后可缓解, 夜间有明显的上腹痛, 排黑粪 4 天。

99. 考虑诊断为()

- A. 胃溃疡出血
- B. 胃癌出血
- C. 急性胰腺炎
- D. 门静脉高压出血
- E. 十二指肠溃疡出血

100. 护士为患者首先要采取的护理措施是()

- A. 立即输血
- B. 心理疏导
- C. 卧床休息

D. 进食温凉的流食

E. 禁食和胃肠减压

101. 医生给予患者法莫替丁 20mg 口服, 护士应如何指导患者服此药()

- A. 餐前服用
- B. 餐中服用
- C. 餐后 2h 服用
- D. 晨起空腹服
- E. 嚼碎服

(102~104 题共用题干)

患者, 男性, 35 岁, 患乙型肝炎住院 50 天, 痊愈出院。

102. 护士对床单位的处理应除外()

- A. 床垫、褥、棉胎暴晒 4h
- B. 病室用 2% 过氧乙酸加热熏蒸 2h
- C. 消毒时应关闭门窗
- D. 消毒液擦拭病床、床旁桌椅
- E. 消毒后开窗通风, 铺好备用床

103. 消毒患者的毛巾, 最佳的方法是()

- A. 喷雾消毒
- B. 微波消毒
- C. 日光暴晒
- D. 高压消毒
- E. 环氧乙烷熏蒸

104. 消毒患者的信件、票证, 宜采用的方法是()

- A. 高压消毒
- B. 微波消毒
- C. 日光暴晒

- D. 甲醛熏蒸消毒
- E. 环氧乙烷熏蒸

(105~107 题共用题干)

患者, 女性, 26 岁。已婚, 未生育, 停经 2 个月余, 阴道不规则出血 1 周, 自测尿妊娠试验阳性, 血 HCG 高于正常妊娠月份, B 超提示子宫大于正常妊娠月份, 双侧卵巢有黄素化囊肿。

105. 可能的诊断为()

- A. 葡萄胎
- B. 异位妊娠
- C. 先兆流产
- D. 不全流产
- E. 难免流产

106. 此患者确诊后首先应行()

- A. 预防性化疗
- B. 手术切除卵巢
- C. 子宫全切术
- D. 清除宫腔内容物
- E. 遵医嘱给止血药物

107. 患者同时有慢性宫颈炎, 患者思想压力较大, 护士解释慢性宫颈炎最常见的病变是()

- A. 宫颈滑膜炎
- B. 宫颈腺囊肿
- C. 宫颈息肉
- D. 宫颈肥大
- E. 宫颈糜烂

(108~110 共用题干)

患者, 女性 63 岁, 心力衰竭, 卧床 2 个月。近日骶尾部皮肤破溃, 家庭病床护士观察后认为是压疮的炎性浸润期。

108. 该护士解释她的判断是因为患者压疮的表现符合炎性浸润期的典型表现, 包括()

- A. 骶尾部皮肤呈紫色, 有皮下硬结, 并出现水疱
- B. 表皮有感染发生, 形成溃疡
- C. 局部坏死组织侵入真皮下层, 颜色变黑
- D. 患者主诉骶尾部疼痛、麻木感
- E. 表皮水疱破溃, 并有黄色液体渗出

109. 该护士认为患者的饮食护理应采用()

- A. 高维生素、高蛋白、低盐
- B. 高维生素、高脂肪、低蛋白
- C. 高热量、低蛋白、低盐
- D. 高维生素、高蛋白、低脂肪
- E. 高维生素、高蛋白、高糖类

110. 该护士为患者制订了详细的护理计划, 应除外()

- A. 骶尾部热置气圈
- B. 平卧时在颈、腰部垫海绵垫, 可侧卧
- C. 在无菌操作下抽出水疱内液体
- D. 每 2h 协助翻身 1 次, 定时查看皮肤状况
- E. 嘱患者穿宽松柔软衣服, 生理盐水清洗创面, 涂消毒溶液, 用无菌敷料包扎

(111~113 共用题干)

患者, 男性, 30 岁。诊断为“肺结核”。

111. 护士对其病室空气消毒时, 正确的方法是()

- A. 2%过氧乙酸喷洒
- B. 臭氧灭菌灯消毒
- C. 开窗通风
- D. 食醋熏蒸
- E. 甲醛熏蒸

112. 入院指导时告知患者,病区的清洁区是()

- A. 医护办公室
- B. 配膳室
- C. 病区走廊
- D. 化验室
- E. 患者浴室

113. 患者使用的体温计应每日消毒,正确的方法是()

- A. 0.1% 氯己定浸泡
- B. 2%碘酊擦拭
- C. 70%乙醇浸泡
- D. 煮沸消毒
- E. 微波消毒

(114~115 题共用题干)

患儿,男,1岁半。患口炎,食欲差,口腔黏膜有大小不等的糜烂面。

114. 患儿进食时口痛,护士应指导家长进食前为患儿涂()

- A. 0.1%依沙吡啶
- B. 2%利多卡因
- C. 3%过氧化氢
- D. 5%金霉素鱼肝油
- E. 10万U/ml制霉菌素鱼肝油

115. 护士给家长做健康指导,不恰当的是()

- A. 进普食
- B. 注意保持口周皮肤干燥
- C. 勤喂水
- D. 避免擦拭口腔
- E. 涂药时应用棉签在溃疡面上滚动式涂药

(116~117 题共用题干)

患者,女性,35岁,“胃切除术”4年。近2年患者头晕、心悸、气短,疲乏无力。诊断为缺铁性贫血。

116. 导致患者贫血的原因可能是()

- A. 铁吸收不良
- B. 铁不能利用
- C. 饮食中供铁不足
- D. 损失铁过多
- E. 育龄期女性需铁量增加

117. 指导患者口服铁剂的要点应除外()

- A. 用吸管服用液体铁剂,避免牙齿染色
- B. 如有消化道反应,可与果汁同服
- C. 可同服茶,促进铁吸收
- D. 宜于进餐后服用
- E. 血红蛋白正常后,需继续服铁6~8周

(118~120 题共用题干)

患者,25岁,因天气变化而出现咳嗽、咳痰、胸闷、呼气性困难。查体:双肺布满哮鸣音,桶状胸,发绀明显,诊断为支气管哮喘。

118. 针对该患者的饮食护理,错误的是()

- A. 多饮水

B. 忌食易过敏食物, 如鱼、虾等

C. 尽量鼓励病人多进食

D. 摄入富于营养的流质饮食

E. 摄入高维生素的流食

119. 针对该患者的情况, 护士应采取的主要措施是()

A. 改善通气, 缓解呼吸困难

B. 预防哮喘复发

C. 防止并发症

D. 避免吸入过敏原

E. 消除恐惧

120. 针对该患者的护理措施, 错误的是()

A. 哮喘发作时避免讲话及进食

B. 多饮水, 促进痰液排出

C. 避免接触过敏原

D. 无需给氧

E. 卧床休息, 取半卧位



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

实践能力

一、A1/A2 型选择题(1~92 题)

答题说明

以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. 符合慢性阻塞性肺气肿的体征是() | 5. 胃癌常向下列哪处淋巴结转移() |
| A. 叩诊呈鼓音 | A. 颈部淋巴结 |
| B. 单侧语颤减弱 | B. 左腋下淋巴结 |
| C. 单侧呼吸运动减弱 | C. 左锁骨上淋巴结 |
| D. 气管偏移 | D. 左锁骨下淋巴结 |
| E. 呼气时间延长 | E. 左腹股沟淋巴结 |
| 2. 一般体检测量脉搏的方法中, 正确的是() | 6. 浅昏迷与深昏迷的区别是() |
| A. 可用拇指诊脉 | A. 有无自主运动 |
| B. 病人剧烈活动后立即测量 | B. 有无大小便失禁 |
| C. 有脉搏短绌, 应两人同时分别测量心率、脉率 | C. 对声、光的反应 |
| D. 测量部位只有桡动脉 | D. 是否能被唤醒 |
| E. 测量前不必作解释工作 | E. 角膜反射、瞳孔对光反射及防御反射是否存在 |
| 3. 正常人瞳孔直径为() | 7. 闻及两肺满布湿啰音, 应考虑() |
| A. 1~2mm | A. 阻塞性肺气肿 |
| B. 2~5mm | B. 急性肺水肿 |
| C. 3~6mm | C. 支气管哮喘 |
| D. 5~7mm | D. 支气管扩张 |
| E. 7mm 以上 | E. 肺脓肿 |
| 4. 意识丧失病人的卧位常为() | 8. 指导腰椎间盘突出病人在术后进行直腿抬高试验(如图)的目的是() |
| A. 自动体位 | |
| B. 被动体位 | |
| C. 患侧卧位 | |
| D. 端坐位 | |
| E. 仰卧位 | |

- A. 防止足部肌肉萎缩
B. 防止深静脉血栓
C. 促进血液循环
D. 防止神经根粘连
E. 防止伤口感染
9. 病人呼吸气味中有大蒜味, 应考虑()
A. 尿毒症
B. 酮症酸中毒
C. 有机磷农药中毒
D. 肺癌
E. 支气管感染
10. 做内生肌酐清除率检查, 实验前三天的饮食是()
A. 高热量饮食
B. 高蛋白饮食
C. 无肌酐饮食
D. 多纤维素饮食
E. 正常饮食
11. 水痘患者作为唯一的传染源, 其具有传染性的时段()
A. 潜伏期
B. 出疹期
C. 出前 10 天至出疹后 5 天
D. 出疹前 10 天至第一批疹退
E. 出疹前 1~2 天至全部疱疹结痂
12. 肾病综合征初期水肿的特点是()
A. 全身水肿明显
B. 眼睑、面部水肿为主
C. 水肿呈低垂性水肿
D. 无胸腹水发生
E. 水肿一般不严重
13. 一氧化碳中度中毒的典型体征是()
A. 四肢乏力
B. 意识模糊
C. 血压上升
D. 口唇樱桃红色
E. 呼吸、循环衰竭
14. 人工肛门的护理方法正确的是()
A. 禁忌扩张造口
B. 定时灌肠, 训练排便习惯
C. 造口袋内排泄物超过 3/4 时应更换造口袋
D. 肛门袋宜长期持续使用, 少更换
E. 局部皮肤保持湿润
15. 尿液呈酱油色的疾病是()
A. 阻塞性黄疸
B. 急性溶血
C. 肝细胞性黄疸
D. 恶性痢疾
E. 晚期血丝虫病
16. 诊断癫痫最有价值的检查是()
A. CT
B. MRI
C. 脑电图
D. 心导管检查
E. 脑血管造影
17. 女性各阶段的生理特点正确的是()
A. 儿童后期卵巢内的卵泡有一定发育, 但并不分泌性激素
B. 青春期是卵巢生殖内分泌功能最旺的时期

- C. 月经初潮标志生殖器官发育成熟
- D. 围绝经期一般历时半年
- E. 绝经过渡期的突出表现为卵巢功能逐渐衰退
18. 单纯性甲状腺肿的主要病因是()
- A. 缺碘
- B. 甲状腺素释放障碍
- C. 甲状腺素合成障碍
- D. 食用海产品过多
- E. 垂体功能减弱
19. 早产儿生理性黄疸血胆红素最高不超过()
- A. 330 $\mu\text{mol/L}$
- B. 256.5 $\mu\text{mol/L}$
- C. 205.2 $\mu\text{mol/L}$
- D. 543 $\mu\text{mol/L}$
- E. 120 $\mu\text{mol/L}$
20. 深静脉血栓形成的患者, 抗凝治疗期间最严重的并发症是()
- A. 出血
- B. 继发性感染
- C. 动脉痉挛
- D. 血栓与静脉壁粘连并逐渐退化
- E. 形成再通静脉
21. 术后半卧位的目的不包括()
- A. 利于引流
- B. 利于呼吸
- C. 利于循环
- D. 防止膈下脓肿
- E. 利于排尿
22. 有关癌症的特征, 不正确的是()
- A. 表面高低不平
- B. 界限不清
- C. 固定, 不活动
- D. 质地坚硬
- E. 早期就有疼痛
23. 以下移植方法哪一类存活率最高()
- A. 自体移植
- B. 同质移植
- C. 充分配血及组织配型后移植
- D. 同种异体移植
- E. 异种异体移植
24. 乳腺癌根治术后护理, 以下哪项有利于伤口愈合()
- A. 加强口腔护理
- B. 术后三天帮助病人活动患肢
- C. 鼓励咳痰
- D. 半卧位利于引流
- E. 保持皮瓣下负压吸引通畅
25. 急性脓胸具有确诊意义的是()
- A. 胸痛、气促
- B. 肋间饱满
- C. 呼吸音减弱
- D. X线片示大片浓密阴影
- E. 胸穿抽出脓液
26. 胸外伤后, 出现胸壁软化, 是因为()
- A. 单根肋骨单处骨折
- B. 相邻多根肋骨多处骨折
- C. 单根肋骨多处骨折
- D. 多根肋骨单处骨折

E. 胸骨骨折

27. 幽门梗阻患者因长期呕吐会造成()

- A. 低钾低氯性代谢性碱中毒
- B. 低钾高氯性代谢性酸中毒
- C. 高钾低氯性呼吸性碱中毒
- D. 低钾低氯性代谢性酸中毒
- E. 高钾低氯性代谢性碱中毒

28. 急性腹膜炎发生休克的主要原因()

- A. 剧烈疼痛
- B. 腹膜吸收大量毒素, 血容量减少
- C. 肠内积液刺激
- D. 大量呕吐失液
- E. 腹胀引起呼吸困难

29. 关于直疝三角, 不正确的叙述是()

- A. 腹股沟斜疝由此突出
- B. 外侧边为腹壁下动脉
- C. 内侧边为腹直肌外边缘
- D. 底边为腹股沟韧带内侧
- E. 腹股沟斜疝内环位于其外侧

30. 白先生, 32岁, 既往有胃病史, 近一周来, 常感上腹部不适, 4h前突发上腹部剧烈疼痛, 伴有恶心、呕吐, 查体: 腹部压痛、肌紧张, 肝浊音界缩小, X线检查可见肠下游离气体, 首先考虑()

- A. 急性阑尾炎穿孔
- B. 胆囊炎穿孔
- C. 急性胰腺炎
- D. 溃疡病穿孔
- E. 急性肠梗阻

31. 以下哪项为缺铁性贫血患者较常见的受

损害部位()

- A. 呼吸道
- B. 淋巴结
- C. 泌尿道
- D. 消化道
- E. 皮肤黏膜

32. 社区获得性肺炎最常见的病原菌是()

- A. 立克次体
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 溶血性链球菌
- D. 衣原体
- E. 肺炎链球菌

33. 下列食物中属于痛风患者可以选择食用的是()

- A. 鸡肝
- B. 黄豆
- C. 海鲜类
- D. 牛奶
- E. 牛肉汤

34. 糖尿病专科护士向病区的糖尿病患者做健康宣教时, 告诉患者, 糖尿病患者常合并眼部疾病及肾脏病变, 原因是()

- A. 小动脉病变
- B. 主动脉病变
- C. 微血管病变
- D. 小血管病变
- E. 深动脉病变

35. 患者, 女性, 25岁, 每次月经过多, 持续时间长, 头晕耳鸣、心悸、乏力、贫血、面色苍白、气短。血常规提示: 小细胞低色素性

贫血。护士判断其贫血为()

- A. 出血性贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 溶血性贫血
- E. 维生素 B₁₂ 缺乏

36. 患者, 女性, 40 岁。胃大部切除术后第 6 天, 当班护士观察到患者体温上升至 38.7℃, 诉切口疼痛。该护士首先考虑患者为()

- A. 外科热
- B. 切口感染
- C. 盆腔脓肿
- D. 吻合口瘘
- E. 切口裂开

37. 患儿, 14 个月, 因发热、咳嗽、食欲降低、呕吐 4 天后出现惊厥入院。体检: 体温

39.5℃咽部充血明显, 前囟平坦。分诊护士考虑该患儿惊厥的原因首先可能是()

- A. 急性脑炎
- B. 低血糖
- C. 癫痫持续状态
- D. 缺血缺氧性脑病
- E. 高热惊厥

38. 某产妇, 30 岁, 骨盆外测量显示: 入口前后径 9.5cm, 对角径 11cm, 其他无异常。孕 39 周时胎心正常, 行缩宫素静脉滴注试产。护士发现产妇在试产过程中很焦虑, 该护士给予的护理措施正确的是()

- A. 专人看护
- B. 用宫缩后灌肠

C. 可应用少量镇静药

D. 勤肛查

E. 试产 2~4h, 胎头仍未入盆, 加强宫缩

39. 患儿男, 胎龄 36 周出生。护士发现患儿出生后 3 天出现皮肤黄染, 黄疸未消退, 无发热, 吃奶好, 面部及躯干皮肤黄染, 血胆红素 172 μmol/L (10mg/dl)。该护士首先应考虑的是()

- A. 母乳性黄疸
- B. 新生儿泌尿道感染
- C. 新生儿甲状腺功能亢进
- D. 先天性胆道闭锁
- E. 生理性黄疸

40. 患者, 女性, 40 岁, 患肝硬化 6 年。近日感腹胀、呼吸困难。B 超示大量腹水。护士采取的护理措施应除外()

- A. 安置患者平卧位
- B. 严格限制水、盐摄入
- C. 预防压疮
- D. 严格记录尿量
- E. 预防感染

41. 临产后的主要产力是()

- A. 腹肌收缩力
- B. 膈肌收缩力
- C. 产妇向下屏气
- D. 子宫收缩力
- E. 肛提肌收缩力

42. 出生后多长时间内将新生儿俯卧在母体胸前()

- A. 30min 内

- B. 40min 内
C. 50min 内
D. 60min 内
E. 70min 内
43. 痛经, 下述哪项不正确()
A. 原发性痛经生殖器官无器质性病变
B. 继发性痛经生殖器官有器质性病变
C. 多发于无排卵型月经
D. 痛经常于行经前数小时开始
E. 痛经者可用解痉药
44. 子宫脱垂是指子宫颈外口达()
A. 坐骨结节水平以上
B. 坐骨结节水平以下
C. 坐骨棘水平以上
D. 坐骨棘水平以下
E. 骶尾骨以下
45. 哪段时期可做阴道灌洗()
A. 月经期
B. 妊娠期
C. 产褥期
D. 排卵期
E. 阴道流血期
46. 急性肾小球肾炎最主要的临床表现是()
A. 水肿、少尿、高血压、蛋白尿
B. 水肿、少尿、血尿、高血压
C. 水肿、少尿、蛋白尿、血尿
D. 蛋白尿、氮质血症、高血压
E. 血尿、少尿、高血压、氮质血症
47. 婴幼儿最常见的贫血是()
A. 感染性贫血
B. 失血性贫血
C. 溶血性贫血
D. 缺铁性贫血
E. 营养性巨幼细胞贫血
48. 护理法洛氏三联症患儿, 要注意保证入量, 防止脱水。其目的是()
A. 防止便秘
B. 防止休克
C. 防止血栓栓塞
D. 防止心力衰竭
E. 防止肾功能衰竭
49. 小儿扁桃体炎的好发年龄为()
A. 新生儿
B. 1 岁
C. 1~3 岁
D. 4~10 岁
E. 14~15 岁
50. 口服补液盐治疗腹泻适用于()
A. 频繁呕吐者
B. 新生儿腹泻
C. 腹胀明显者
D. 重度脱水者
E. 轻、中度脱水者
51. 患者, 男性, 25 岁, 体检时发现缺铁性贫血。最常见的原因是()
A. 缺乏维生素
B. 骨髓造血不良
C. 铁需要量过多
D. 慢性失血
E. 叶酸缺乏

52. 患者, 男性, 75 岁, 突然剧烈头痛, 呕吐, 随后出现昏迷。鉴别患者是脑出血或蛛网膜下腔出血的依据是()
- A. 体温高低
B. 有否肢体疼痛
C. 白细胞多少
D. 脑脊液是否血性
E. 有否颈强直
53. 患者, 女性, 26 岁, 前胸、双上肢烧伤急诊入院, 主诉口干、剧烈疼痛, 尿少。体检: 脉搏细速, 血压 75/60mmHg, 血容量减少的原因是()
- A. 剧烈疼痛
B. 心功能不全
C. 血浆渗出到组织间隙和创面
D. 心力衰竭
E. 末梢血管扩张
54. 患儿男, 10 岁, 确诊水痘, 现处于出疹期, 自述皮肤瘙痒难忍。护士给予患儿的护理措施正确的是()
- A. 指导其可隔衣服挖抓皮疹患处
B. 皮疹完全消退前不可洗澡, 以防继发感染
C. 局部可涂抹地塞米松霜
D. 遵医嘱口服抗组胺药物
E. 皮疹处不可涂抹炉甘石洗剂
55. 患者, 女性, 62 岁。突然出现心前区疼痛伴大汗 2h, 急诊就医, 诊断为急性心肌梗死。给患者的护理措施中, 下列正确的是()
- A. 鼓励病人大量进食
B. 尽量避免搬运
C. 增加探望, 增加信心
D. 静脉输液速度宜快
E. 如有便秘立即灌肠
56. 患者, 女性, 50 岁。肝硬化病史 6 年, 今日饮酒后突然大量呕血, 伴神志恍惚、四肢湿冷、血压下降, 医嘱予以输血、补液, 该患者输新鲜血的主要目的是防止发生()
- A. 自发性腹膜炎
B. 心力衰竭
C. 肾衰竭
D. 肝性脑病
E. 水、电解质紊乱
57. 患者, 男性, 40 岁。因发热、寒战、咳嗽、呼吸急促 9h 来诊, 查体: 体温 38.7℃, 脉搏 140 次/分, 呼吸 36 次/分, 神志朦胧, 皮肤潮红, 双肺有湿啰音, 瞳孔等大等圆, 对光反射(-), 初步诊断为肺部感染, 给予抗生素等对症处理, 生命体征 q2h 监测, 护士在观察病情中发现其瞳孔缩小, 烦躁, 肢体有抽动及震颤, 及时报告医师, 经再次详细询问发病经过时, 其家属告知发病前曾食用大量的水果、新鲜蔬菜, 立即进行了一系列的实验室检查。最可能的诊断是()
- A. 亚硝酸盐中毒
B. 煤气中毒
C. 有机磷农药中毒
D. 酒精中毒
E. 安眠药中毒
58. 患者, 男性, 45 岁, 因饱餐后出现右上腹疼痛而入院, 诊断为胆囊结石, 应忌食()

- A. 蛋白食物
- B. 纤维食物
- C. 高纤维素食物
- D. 油腻食物
- E. 高维生素食物

59. 患者, 女性, 55 岁。护士为其测量脉搏时发现, 每隔 2 个正常搏动后出现 1 次期前收缩, 称为 ()

- A. 二联律
- B. 三联律
- C. 间歇脉
- D. 水冲脉
- E. 绌脉

60. 丁先生, 50 岁, 急性肾衰少尿期, 患者突然呼吸困难, 头痛头晕, 软瘫, 心律不齐, 心动过缓, 腹胀, 应考虑 ()

- A. 高血钾症
- B. 低血钾症
- C. 水中毒
- D. 酸中毒
- E. 尿毒症

61. 李女士, 52 岁, 化脓性胆管炎, 剖腹术后病情危重, 下列哪项处理不要 ()

- A. 入住 ICU 病房
- B. 每 15min 观察 1 次 BP、P、R
- C. 每 15min 观察 1 次神态
- D. 每 15min 观察 1 次肢体活动
- E. 术后用抗菌素

62. 王先生, 头顶部伤口, 换药后宜用哪种包扎方法 ()

- A. 四头带
- B. 丁字带
- C. 腹带
- D. 胸带
- E. 回反形细带

63. 慢性宫颈炎临床最常见的病理类型是 ()

- A. 宫颈细胞非典型增生
- B. 宫颈腺体囊肿
- C. 宫颈息肉
- D. 宫颈肥大
- E. 宫颈糜烂样改变

64. 某女士流产 2 次, 无早产史, 足月产 1 次, 现有一女, 其生育史可简写为 ()

- A. 1-0-2-1
- B. 1-2-0-1
- C. 2-0-1-1
- D. 1-1-0-2
- E. 0-1-2-1

65. 某女士, 口服避孕药物进行避孕已 2 年, 因工作忙, 当晚漏服, 询问指导, 应告知补服时间为 ()

- A. 3h 内
- B. 6h 内
- C. 9h 内
- D. 12h 内
- E. 24h 内

66. 一名 6 个月婴儿, 喂面条后发生腹泻 2 天, 稀水样便 5~6 次/天, 量中等, 偶吐奶, 尿量略减少, 前囟及眼窝稍凹陷。下列哪项措施不

要()

- A. 口服抗生素
- B. 暂停辅食
- C. 继续喂母乳
- D. 加强臀部护理
- E. 给予口服补液盐

67. 某孕妇, 30 岁, 既往体健, 近 2 年来发现 HBS-Ag 阳性, 但无任何症状, 肝功能正常。经过十月怀胎, 足月顺利分娩 4300g 女婴, 为阻断母婴传播, 对此新生儿最适宜的预防方法是注射()

- A. 乙肝疫苗
- B. 丙种球蛋白
- C. 高效价乙肝免疫球蛋白
- D. 乙肝疫苗+丙种球蛋白
- E. 乙肝疫苗+高效价乙肝免疫球蛋白

68. 患者, 女性, 33 岁, 宫内妊娠 39 周, G₃P₂, 无难产史, 3h 前开始规律宫缩。急诊入院检查: 宫缩持续 46s, 间隔 3min, 胎心 141 次/分, 头位宫口开大 4cm, 羊膜囊明显膨出, 骨盆内诊正常。此时正确的处理是()

- A. 破膜后住院, 立即剖宫产
- B. 立即住院待产
- C. 灌肠以促进产程, 减少污染
- D. 急诊室留观
- E. 送产房消毒接生

69. 孕妇, 停经 16 周, 2 个月来间断少量阴道出血, 检查腹部无明显压痛、反跳痛, 子宫颈口未开, 子宫增大如孕 8 周, 最可能的诊断为()

- A. 稽留流产
- B. 先兆流产
- C. 不全流产
- D. 难免流产
- E. 意外流产

70. 患者, 男性, 27 岁, 前臂行石膏细带包扎后 3h。患者向护士诉手指剧痛。护士查体, 发现手指发凉、发绀, 不能自主活动。该护士首先考虑为()

- A. 低血容量性休克
- B. 石膏绷带包扎过紧
- C. 神经损伤
- D. 体位不当
- E. 静脉栓塞

71. 患者, 男性, 36 岁, 近 2 个月以来出现皮肤紫癜, 近 3 天出现牙龈出血不止, 体温 39℃, 贫血进行性加重, 伴乏力、头晕、心悸, 肝、脾、淋巴结不大, 胸骨无压痛。化验: 血红蛋白、白细胞、血小板低手正常, 骨髓增生极度减低。该患者可能是()

- A. 急性再生障碍性贫血
- B. 急性白血病
- C. 血小板减少性紫癜
- D. 血友病
- E. 缺铁性贫血

72. 患儿, 8 个月, 因抽搐急诊。患儿冬季出生, 人工喂养; 睡眠烦躁不安、多汗。近日常气温回升, 经常户外活动。今日突然出现全身抽搐, 约 15s, 停止后精神、食欲无异常。患儿最可能的诊断是()

- A. 败血症
- B. 半乳糖血症
- C. 脑膜炎
- D. 营养不良
- E. 手足搐搦症

73. 妊娠合并心脏病孕妇, 心功能 III 级, 行剖宫产术。术后安全返回病房, 子宫收缩好, 血压正常, 护士对该产妇的护理措施中正确的是()

- A. 清淡饮食, 防止便秘
- B. 尽早协助哺乳, 促进子宫收缩
- C. 不宜再妊娠, 产后 36h 后行绝育术
- D. 产后 3 天按医嘱应用抗生素
- E. 产后 24h 严密观察生命体征, 每 4h 一次

74. 患者, 女性, 75 岁, 患高血压性心脏病 9 年, 近 2 年来患者明显感觉体力下降, 轻微日常活动即感心悸、呼吸困难, 休息较长时间后症状方可缓解。护士判断此患者目前的心功能处于()

- A. 前驱期
- B. I 级
- C. II 级
- D. III 级
- E. 心力衰竭

75. 患者, 女性, 45 岁, 因大量饮酒后出现上腹部持续疼痛 2h 来院急诊, 为减轻疼痛, 患者的常见体位是()

- A. 平卧位
- B. 半卧位
- C. 头低脚高位

- D. 端坐卧位
- E. 弯腰屈膝侧卧位

76. 患者, 男性 40 岁, 因甲亢接受放射性碘治疗。治疗后护士应嘱患者定期复查, 以便及早发现()

- A. 甲状腺癌变
- B. 甲状腺危象
- C. 粒细胞减少
- D. 突眼恶化
- E. 永久性甲状腺功能减退

77. 患者, 女性, 35 岁, 因股骨干骨折给予持续骨牵引, 下列护理不妥的是()

- A. 足部不抵床栏
- B. 及时清除骨针孔血痂
- C. 抬高床脚
- D. 常测患肢长度
- E. 鼓励按照要求做患肢活动

78. 无菌注射器(如图), 护士可用手触摸的部位是()

- A. (1)
- B. (2)
- C. (3)
- D. (4)
- E. (5)

79. 患者, 女性, 65 岁, 患急性心肌梗死, 病情平稳, 没有并发症, 第 1 周末护理措施应该是

()

A. 床上活动四肢

B. 乙醇湿化给氧

C. 高热量、高蛋白饮食

D. 大、小便由人扶到卫生间

E. 进食、洗漱向护理人员协助

80. 患者, 男性, 27 岁, 印刷厂彩印车间工人。

因特发性血小板减少性紫癜住院, 应用糖皮质激素治疗半月后好转出院。护士进行出院前的健康指导时, 错误的是()

A. 必须调换工种

B. 坚持饭后服药

C. 避免到人多聚集的地方

D. 注意自我病情监测

E. 上若无新发出血可自行停药

81. 如图所示的热型, 该患者的热型属于()

A. 稽留热

B. 弛张热

C. 间歇热

D. 不规则热

E. 回归热

82. 患者, 男性, 40 岁, 胃癌。在硬膜外麻醉下行胃大部切除术, 手术顺利, 术后安返病房。

护士应注意观察的并发症是()

A. 胃肠吻合瘘

B. 输入襟梗阻

C. 术后出血

D. 早期倾倒综合征

E. 碱性反流性食管炎

83. 患者, 女性, 55 岁, 车祸造成腹部损伤, 护士第一时间得知其有开放性膀胱破裂, 首先要准备的抢救措施是()

A. 积极止痛

B. 给予抗生素抗感染

C. 进行手术前准备

D. 留置导尿

E. 准备抗休克药物

84. 患者, 女性, 66 岁, 诊断为尿毒症, 精神不振, 下腹无胀满, 24h 尿量为 80ml。护士判断该患者的排尿情况属于()

A. 蛋白尿

B. 无尿

C. 少尿

D. 尿量偏多

E. 尿量偏少

85. 患者, 女性, 30 岁, 孕 18 周, 诊断淋病入院。护士向其解释淋病对分娩及胎儿和新生儿的影响后, 孕妇出现下列哪一项表述时, 表明护士仍需要对其进行健康教育()

A. “淋病会导致胎儿窘迫”

B. “淋病会导致新生儿肺炎”

C. “我不想让我丈夫知道这件事”

D. “我会因此发生盆腔感染”

E. “孕晚期我要注意胎膜早破的症状”

86. 患者, 女性, 69 岁。因患肺癌行多次放疗,

护士进行皮肤护理正确的是()

- A. 保持皮肤清洁干燥
- B. 肥皂水清洗
- C. 热敷理疗
- D. 外用抗组胺类药物
- E. 按摩皮肤

87. 患者, 女性, 40 岁。诊断为膀胱结石, 进行碎石术后, 护士发现膀胱冲洗液颜色较红时正确的处理是()

- A. 立即送手术室复查
- B. 尽快输新鲜血
- C. 加快冲洗速度
- D. 用冰盐水冲洗
- E. 手动高压冲洗

88. 患者, 男性, 25 岁。消化性溃疡患者, 给予胶体次枸橼酸铋钾+克拉霉素+呋喃西林三联治疗期间出现黑便, 担心病情加重。行粪便隐血试验, 报告呈阴性。此时应向患者解释其黑便原因是()

- A. 溃疡出血
- B. 溃疡癌变
- C. 呋喃西林不良反应
- D. 克拉霉素不良反应
- E. 胶体次枸橼酸铋钾不良反应

89. 某女性, 28 岁, 月经周期为 30 天, 上月月经是 4 月 18 日, 护士为其计算的排卵日期大约在 5 月()

- A. 1 日
- B. 4 日

C. 9 日

D. 12 日

E. 14 日

90. 患儿, 7 个月, 冬季出生。母亲孕期及哺乳期坚持口服钙剂及维生素 D, 母乳喂养, 未添加辅食。现患儿有枕秃, 夜惊等症状, 怀疑最可能的原因是()

- A. 患儿食量过小
- B. 日光照射不足
- C. 维生素 D 补充量不足
- D. 母亲补钙量不足
- E. 未及时添加辅食

91. 患者, 女性, 60 岁, 肝衰竭。为患者做口腔护理时, 护士应重点观察的内容是()

- A. 有无口腔溃疡
- B. 有无肝臭
- C. 有无真菌感染
- D. 有无牙龈红肿
- E. 有无口唇干裂

92. 患者, 男性, 65 岁, 常年有咳嗽, 咳少量白痰。近 4 个月咳嗽加剧, 偶有血痰、乏力、低热, 抗感染治疗效果不显著。胸部 X 线检查未见异常。患者吸烟 18 年, 每天 1 包。首先考虑可能的情况是()

- A. 慢性咽喉炎
- B. 慢性支气管炎
- C. 支气管哮喘
- D. 支气管肺癌
- E. 肺

二、A3/A4 型选择题(93~120 题)

答题说明

以下提供若干个案例,每个案例有若干个考题。请根据提供的信息,在每题的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

(93~95 题共用题干)

赵女士,68 岁,患肝硬化已 5 年,近日发现牙龈出血、夜间睡眠时流涎呈粉红色,皮肤有许多出血点,且有尿频、尿急、腰痛就医,经检查后确认为肝硬化、脾功能亢进、全血细胞减少,伴泌尿系感染。

93. 全血细胞是指()

- A. 淋巴细胞、嗜酸性粒细胞
- B. 红细胞、白细胞及血小板
- C. 杆状核粒细胞及嗜碱性粒细胞
- D. 单核细胞
- E. 中性粒细胞

94. 泌尿系统感染是由于()

- A. 红细胞减少
- B. 中性粒细胞减少
- C. 血小板减少
- D. 淋巴细胞减少
- E. 嗜酸性粒细胞减少

95. 皮肤、牙龈出血是由于()

- A. 有中毒颗粒
- B. 血小板减少
- C. 嗜酸性粒细胞减少
- D. 中性粒细胞减少
- E. 淋巴细胞减少

(96~98 题共用题干)

40 岁某先生因右小腿严重外伤后,发生气性坏疽,住院治疗。

96. 首先的处理是()

- A. 给氧
- B. 高压氧治疗
- C. 止痛
- D. 手术
- E. 加强营养

97. 下列哪项处理不必要()

- A. 高压氧治疗
- B. 手术
- C. 隔离
- D. 应用青霉素
- E. 避光、安静

98. 该患者外伤后如何处理可避免发生气性坏疽()

- A. 彻底清创缝合
- B. 清创后伤口敞开
- C. 应用 TAT
- D. 应用青霉素
- E. 应用甲硝唑

(99~100 题共用题干)

患者,男性,34 岁,近 2 年饮食没有规律,并

嗜烟、酒,出现饥饿痛及半夜痛醒。进餐或服用碱性药物可使症状缓解。

99. 首先考虑该患者可能患有()

- A. 胃溃疡
- B. 慢性胃炎
- C. 胃息肉
- D. 十二指肠球部溃疡
- E. 十二指肠球炎

100. 3h 前饱餐后,患者突然感到上腹部剧痛,随即向全腹扩散,出冷汗,平卧不敢翻身。查体:体温正常,脉搏有力,90 次/分;腹部平坦、无胃型,腹式呼吸表浅,肠鸣音消失,肝区浊音界消失,腹呈板样强直伴压痛及反跳痛,以中上腹为显著。考虑该患者可能的并发症是()

- A. 急性胰腺炎
- B. 十二指肠球部溃疡穿孔
- C. 急性阑尾炎
- D. 急性胃肠炎
- E. 急性胆囊炎

(101~103 题共用题干)

患者,女性,55 岁。家住平房,生煤火取暖,晨起感到头痛、头晕、视物模糊而接倒,被他人发现后送至医院。急查血液碳氧血红蛋白试验呈阳性,诊断为 CO 中毒。

101. 二氧化碳中毒纠正缺氧,给予高流量吸氧()

- A. 8~10L/min
- B. 2~4L/min

C. 6~8L/min

D. 4~6L/min

E. 7~9L/min

102. 有可能出现的并发症是()

- A. 迟发性脑病
- B. 水电解质紊乱
- C. 肺水肿
- D. 昏迷
- E. 脑水肿

103. 急性一氧化碳中毒迟发性脑病主要的临床表现是()

- A. 呼吸循环衰竭
- B. 去大脑皮质状态
- C. 意识障碍
- D. 大小便失禁
- E. 震颤麻痹

(104~106 题共用题干)

患者,女性,55 岁。特殊职业,在生产有机磷农药工作中违反操作规定,出现有机磷中毒症状,头晕、头痛、乏力、支气管分泌物增多、呼吸困难,逐渐出现烦躁不安、谵妄、抽搐及昏迷。

104. 诊断有机磷农药中毒的主要指标是()

- A. 典型症状
- B. 呕吐物
- C. 瞳孔缩小
- D. 意识障碍
- E. 全血胆碱酯酶测定

105. 有机磷农药对人体的毒性主要在于()

- A. 引起急性肾衰竭
- B. 使血液凝固发生障碍
- C. 抑制中枢神经系统
- D. 抑制乙酰胆碱酯酶活力
- E. 增加乙酰胆碱的产生

106. 有机磷农药中毒最常见的抗胆碱药阿托品, 其作用是()

- A. 缓解肌肉震颤
- B. 缓解肌肉抽搐
- C. 促使昏迷患者苏醒
- D. 使瞳孔缩小
- E. 抑制腺体分泌

(107~110 题共用题干)

患者, 男性, 35 岁, 吸烟 16 年, 每天 25 支左右, 冷库工作 9 年。近来, 右小腿持续性剧烈疼痛, 不能行走, 夜间加重, 到医院就诊, 体检: 右小腿皮肤苍白, 肌萎缩, 足背动脉搏动消失。

107. 可能的诊断是()

- A. 血栓闭塞性脉管炎
- B. 动脉硬化闭塞
- C. 下肢静脉血栓
- D. 动脉栓塞
- E. 动静脉瘘

108. 目前该病人的病变属于哪一阶段()

- A. 局部缺血期
- B. 营养障碍期
- C. 组织坏死期
- D. 缺血性痉挛期

E. 晚期

109. 目前该病人的最主要的护理诊断是()

- A. 知识缺乏
- B. 组织灌注量改变
- C. 潜在皮肤完整性受损
- D. 舒适的改变: 疼痛
- E. 有外伤出血的危险

110. 为缓解症状, 重要的护理措施是()

- A. 患肢用热水袋保暖
- B. 要求病人绝对戒烟
- C. 抬高患肢
- D. 减少麻醉性镇痛药的应用
- E. 鼓励病人增加运动锻炼

(111~113 题共用题干)

1 岁男婴, 发热 4 天, 伴咳嗽, 流涕, 眼结膜充血, 流泪, 半天前发现患儿耳后, 颈部、发缘有稀疏的不规则红色丘斑疹, 疹间皮肤正常, 体温 39.5℃, 心肺正常。

111. 护士考虑该患儿最有可能的诊断是()

- A. 风疹
- B. 麻疹
- C. 猩红热
- D. 幼儿急疹
- E. 水痘

112. 护士告诉家长患儿疹退后的皮肤改变, 正确的是()

- A. 无色素沉着, 无脱屑
- B. 有色素沉着, 无脱屑
- C. 无色素沉着, 有脱屑

D. 有色素沉着, 有脱屑

E. 有色素沉着, 有疤痕

113. 护士指导家长患儿应隔离至出疹后()

A. 3 天

B. 5 天

C. 7 天

D. 10 天

E. 14 天

(114~115 题共用题干)

患者, 男性, 33 岁, 左腰部撞伤 4h。局部疼痛、肿胀, 有淡红色血尿, 诊断为右肾挫伤, 采用非手术治疗。

114. 能及时反映肾出血情况的是()

A. 腰部肿块大小

B. 腰部疼痛

C. 呼吸、体温

D. 肢体温度

E. 尿量、尿色

115. 为患者采取的护理措施应除外()

A. 绝对卧床休息 2~4 周

B. 动态观察血尿颜色变化

C. 维持水、电解质平衡

D. 血尿消失即可下床活动

E. 做好术前准备

(116~117 题共用题干)

患者, 女性, 30 岁, 妊娠 8 个月。孕期检查发现: 尿糖(+++), 空腹血糖 7.8mmol/L, 餐后 2h 血糖 16.7mmol/L, 诊断为妊娠期糖尿病。

116. 该患者最适宜的治疗是()

A. 单纯饮食控制治疗

B. 运动治疗

C. 综合生活方式干预治疗

D. 口服降糖药治疗

E. 胰岛素注射治疗

117. 治疗过程中, 如果患者出现极度乏力、

头昏、心悸、多汗等, 应考虑该孕妇发生()

A. 上呼吸道感染

B. 饥饿

C. 高血糖反应

D. 低血糖反应

E. 糖尿病酮症酸中毒

(118~120 题共用题干)

患者, 女性, 25 岁, 因突发剑突下钻顶样剧烈疼痛而入院, 自诉疼痛呈间歇性, 发作时疼痛剧烈、辗转不安、大汗淋漓, 可突然自行缓解, 缓解期无任何症状。体检示剑突下有轻度深压痛。WBC $11.5 \times 10^9/L$ 。

118. 根据该患者的临床表现, 应考虑为()

A. 急性胆囊炎

B. 急性胆管炎

C. 胆囊穿孔

D. 胆道蛔虫症

E. 慢性胆囊炎

119. 为明确诊断, 应首选哪项检查()

A. X 线腹部平片

B. CT

C. B 超

D. MRI

E. PTC(经皮肝穿刺胆管造影)

120. 应采取哪项处理方案()

A. 急诊手术

B. 择期手术

C. ERCP(经内镜道行使胆管造影)术

D. 中药治疗

E. 非手术治疗



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

全国护士执业资格考试

押题试卷（二）

参考答案及解析

专业实务

1. C 【解析】测量脉搏首选桡动脉,其次为颈动脉、肱动脉、腘动脉、足背动脉、胫后动脉和股动脉等。(C对)
2. E 【解析】压疮分四期:①淤血红润期:受压部位出现暂时性的血液循环障碍,局部皮肤表现为红、肿、热、痛,解除压力30min后,皮肤颜色不能恢复正常。②炎性浸润期:局部红肿向外浸润、扩大、变硬;皮肤颜色转为紫红色,压之不褪色;表皮水疱形成,病人有疼痛感。③浅度溃疡期:表皮水疱破溃,显露出潮湿红润的疮面,有黄色渗出液体渗出;感染后表面有炎性液体覆盖,致使浅表层坏死,溃疡形成,疼痛加剧。④坏死溃疡期:坏死组织发黑,脓性分泌物增多,有臭味,感染向周围深部组织扩展,侵入真皮下层及肌肉层,可到达骨面。⑤无法分期的压疮:典型特征:全层组织缺失,溃疡底部有腐肉覆盖(黄色、黄褐色、灰色、绿色或褐色),或者伤口床有焦痂附着(碳色、褐色或黑色)。(E对)
3. A 【解析】破伤风抗毒素中含有特异性抗体,能中和游离毒素,可用于破伤风的感染预防。(A对)
4. B 【解析】隐血试验饮食适用于消化道出血,胃癌,消化性溃疡,伤寒,原因不明贫血等需作大便隐血试验的患者。方法:试验期三天,禁止食用铁剂、动物血、肝类、瘦肉及绿叶蔬菜。(B对)
5. D 【解析】对于焦虑症患者,主要护理措施为教导患者放松技巧,从而转移患者注意力,减轻焦虑情绪,而无须关注患者过多不适的主诉。(D对)
6. E 【解析】心肌细胞能够在没有外来刺激的条件下,自动地发生节律性兴奋的特性,称为自动节律性窦房结的自律性最高,为心脏的正常起搏点。(E对)
7. C 【解析】消化性溃疡病主要指发生于胃和十二指肠的慢性溃疡,是一多发病、常见病。溃疡的形成有各种因素,其中酸性胃液对黏膜的消化作用是溃疡形成的基本因素,胃酸分泌过多、幽门螺杆菌感染和胃粘膜保护作用减弱等因素是引起消化性溃疡的主要环节。胃癌与胃溃疡密切相关,胃幽门螺杆菌也是胃癌的重要因素之一。(C对)
8. C 【解析】洋地黄类药物具有正性肌力和减慢心率的作用,心脏毒性反应为各种心律失常,

在服用期间,需常规测量脉搏或心率。(C)

9. B 【解析】正常血压:收缩压 $<120\text{mmHg}$,舒张压 $<80\text{mmHg}$;正常高值:收缩压 $120\sim 139\text{mmHg}$,舒张压 $80\sim 89\text{mmHg}$;I级高血压:收缩压 $140\sim 159$,舒张压 $90\sim 99$;II级高血压:收缩压 $160\sim 179$,舒张压 $100\sim 109$;III级高血压:收缩压 >180 ,舒张压 >110 。所以该患者血压属于正常高值。(B对)

10. D 【解析】使用过的隔离衣挂于半污染区,清洁面朝外;挂在污染区,污染面朝外。(D对)

11. A 【解析】急性胃炎频繁呕吐,要观察呕吐物性质及量,通过观察呕吐物判断有无胃内出血。(A对)

12. E 【解析】昏迷期肝性脑病患者清醒后可逐步增加优质蛋白,例如大豆蛋白质等植物蛋白,以利于吸收利用。(E对)

13. E 【解析】人正常生理液体需要量为 $2000\sim 3000\text{ml}$,所以每天应补液 $2000\sim 3000\text{ml}$ 。(E对)

14. D 【解析】昏迷可分为浅昏迷和深昏迷;嗜睡患者可正确回答问题,当无外界刺激时又入睡;睁眼昏迷时患者嗜睡,也可存在一定的睡眠-觉醒周期缄默不语,肢体不动,可伴有中脑或间脑损伤的临床体征。轻度昏迷患者的意识及随意运动丧失,可偶有不自主的自发动作。对外界事物、声、光刺激无反应,可偶有不自主的自发动作及眼球转动。对强烈刺激如指大腿内侧或压迫眶上孔可出现痛苦表情,用针划足底可有防御反射性屈曲或躲避运动,不能回答问题和执行简单的命令。各种反射及生命体征无明显改变。轻度昏迷时患者的各种反射(如吞咽反射、咳嗽反射、角膜反射及瞳孔反射等)都存在,同时呼吸、脉搏、血压大多正常。部分患者有大小便潴留或失禁。深昏迷患者肌肉松弛,无任何自主动作,可有去大脑强直现象,对外界一切刺激均无反应。角膜反射、瞳孔反射、咳嗽反射及吞咽反射均消失;各种浅深反射和病理反射消失。生命体征不稳定,大小便失禁。(D对)

15. A 【解析】肝性脑病病人的主要临床表现是意识障碍、行为失常和昏迷。肝性脑病病人应用安眠药和镇静药物时会导致无法判断是疾病发展导致的意识障碍还是因为使用药物的原因。(A对)

16. D 【解析】慢性支气管炎是由于感染或非感染因素引起气管、支气管黏膜及其周围组织的慢性非特异性炎症。其病理特点是支气管腺体增生、黏液分泌增多。临床出现有连续两年以上,每年持续三个月以上的咳嗽、咳痰或气喘等症状,慢性支气管炎的外因有:①吸烟。②感染因素:感染是慢性支气管炎发生发展的重要因素,但目前尚无足够证据说明为其首发因素。只认为是慢性支气管炎的继发感染和加剧病变发展的重要因素。③理化因素:如刺激性烟雾、粉尘、大气污染。④气候。⑤过敏因素。(D对)

17. D 【解析】护理程序就是指导护理人员以满足护理对象身心需要, 恢复或促进健康为目标, 科学地确认护理对象的健康问题, 有计划地为护理对象提供系统、全面、整体护理的一种工作方法。护理程序是一种工作方法或程序。(D 对)

18. C 【解析】传染病流行过程的条件包括: 传染源、传播途径和人群易感性, 能够散播病原体的人或动物叫传染源。传播途径主要有空气传播、饮食传播、生物媒介传播等。人群易感性是指对某种传染病缺乏免疫力而容易感染该病的人。(C 对)

19. D 【解析】无尿是指成人 24h 尿量少于 100ml 或闭尿, 少尿是指成人 24h 尿量少于 400ml 或每小时小于 17ml, 正常成人保量为 24h 1000ml~2000ml, 多尿是指成人 24h 尿量大于 2500ml。(D 对)

20. A 【解析】肾素也被称为血管紧张素原酶, 肾素是肾小球旁器的球旁细胞释放的一种蛋白水解酶, 肾素经肾静脉进入血液, 能催化肝脏分泌进入血浆中的血管紧张素原转变成血管紧张素 I(10 肽) 和增加醛固酮的生成。增加肾小管对 NaCl 和水的重吸收。血液和肺组织中的转换酶使血管紧张素 I 降解为血管紧张素 II(8 肽), 后者可被氨基肽酶水解为血管紧张素 III(7 肽)。这三种血管紧张素均有生物活性, 其中血管紧张素 II、III 的生物活性较强, 而后者在血中的浓度较低, 故以血管紧张素 II 的生物活性最强。血管紧张素原和转换酶等经常存在于血浆中, 肾素的释放是决定血浆中血管紧张素浓度的关键性条件(A 对)。促红细胞生成素是由肾皮质肾小管周围间质细胞和肝脏分泌的一种激素样物质, 能够促进红细胞生成。(A 对)

21. E 【解析】肝性脑病昏迷病人应给予低蛋白、高热量饮食, 可鼻饲 25%葡萄糖液供给热量, 以减少体内蛋白质的分解, 其他的含蛋白过高, 不宜鼻饲。(E 对)

22. D 【解析】果酱样便: 为血和黏液混合的红色黏血便样, 像红色果酱, 有时为深红色的血水, 患儿常伴有阵发性哭吵, 频繁呕吐, 面色苍白等症状, 常见于小儿(2 岁以下)肠套叠。脓血便常见于细菌性痢疾, 柏油便常见于消化道出血, 蛋花汤样便常见于小儿腹泻。(D 对)

23. B 【解析】急性胰腺炎的主要表现和首发症状是腹痛, 常在暴饮暴食或饮酒后突然发生。(B 对)

24. D 【解析】十二指肠溃疡好发于球部, 前壁较常见。(D 对)

25. D 【解析】急性胰腺炎患者禁食的目的是防止食物进入十二指肠, 刺激胰液分泌, 加重病情发展。(D 对)

26. D 【解析】肺炎是指终末气道、肺泡和肺间质的炎症, 可由病原微生物、理化因素、免疫损伤、过敏及药物所致。细菌性肺炎是最常见的肺炎, 细菌性肺炎的常见细菌有肺炎链球菌、

流感嗜血杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、大肠埃希菌、厌氧菌、军团菌等,其中肺炎链球菌是细菌性肺炎最常见的致病菌。(D对)

27. D 【解析】麻疹是由麻疹病毒引起的急性呼吸道传染病。临床症状有发热、咳嗽、流涕、眼结膜充血、口腔粘膜有红晕的灰白小点,主要通过飞沫直接传播,由衣物、玩具等间接传播甚少见。(D对)

28. C 【解析】口底、颌下及颈部蜂窝织炎,感染起源于口腔和面部,迅速波及咽喉,可引起喉头水肿而压迫气管,导致呼吸困难甚至窒息。(C对)

29. A 【解析】未母乳喂养或未做到及时有效母乳喂养的产妇,通常可于产后3~4天因乳房血管、淋巴管极度充盈而发发热,称为泌乳热,体温高达38.5~39℃,一般仅持续数小时,最多不超过16h,体温即下降,不属病态。(A对)

30. A 【解析】维生素D的每日预防量为400IU。出生后15天开始每天都应补充400IU维生素D并持续整个冬季(A对)。

31. E 【解析】小儿生长发育的规律为神经系统发育最早,生殖系统发育最晚,淋巴系统先快而后萎缩。(E对)

32. C 【解析】由于肾小球滤过膜通透性增加,大量血浆蛋白漏出,远远超过肾小管的回收能力,形成大量蛋白尿。(C对)

33. D 【解析】类风湿关节炎最基本的病理改变是关节滑膜炎,当累及软骨和骨质时出现关节畸形。(D对)

34. C 【解析】脏,古称藏,是人体内心、肝、脾、肺、肾五个脏器的合称。五脏的主要生理功能是生化和储藏精、气、血、津液和神,故又名五神脏。(C对)

35. E 【解析】医疗事故是指医疗机构及其医务人员在医疗活动中,违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规,过失造成患者人身损害的事故,该案例中由于及时发现未造成不良后果,不属于医疗事故。(E对)

36. B 【解析】①小组护理是将护理人员和病人分成若干小组,一个或一组护士负责一组病人的护理方式。②个案护理是指一个病人所需要的全部护理由一名当班护士全面负责。③功能制护理是以工作中心为主的护理方式,将工作的特点和内容划分几个部分,如处理医嘱的主班护士、治疗护士、药疗护士、生活护理护士等。④综合护理是将多种护理方法一起运用,如将功能制护理和责任制护理一起运用。⑤责任制护理是由责任护士和相应辅助护士对病人进行有计划有目的地整体护理,病人从入院到出院。(B对)

37. E 【解析】①完全责任,指医疗事故损害后果完全由医疗过失行为造成。②主要责任,

指医疗事故损害后果主要由医疗过失行为造成,其他因素起次要作用。③次要责任,指医疗事故损害后果主要由其他因素造成,医疗过失行为起次要作用。④轻微责任,指医疗事故损害后果绝大部分由其他因素造成,医疗过失行为起轻微作用,该护士在护理操作中没有严格执行操作规程,认真履行查对制度,造成患者死亡的严重后果,应负完全责任。(E对)

38. A 【解析】患者投诉到护士长,护士长应先了解情况后再处理事情,而不是没有了解就去训斥小王或直接道歉,这样会让小王对护士长失望,并感委屈,同时会让家属以后难以遵守医院规章制度。(A对)

39. E 【解析】护士长希望陈护士能认真工作,不能因为孩子影响工作,而陈护士则希望护士长能体谅作为妈妈得照顾孩子的情况,两个人对相互的希望有差异,又没有沟通,所以造成关系紧张。(E对)

40. B 【解析】权利性影响力是通过职务、地位等权利产生的影响力,具有强制性和不可抗拒性的特点,资历因素是不可改变的。(B对)

41. E 【解析】各种抗肿瘤药的不良反应。①骨髓抑制:抗肿瘤药大多均有不同程度的骨髓抑制的不良反应,一般多先出现中性粒细胞减少,其次出现血小板减少。②胃肠道反应:恶心、呕吐,大多数抗肿瘤药具有不同程度的恶心、呕吐。③肝、肾损害。④出血性膀胱炎。⑤心、肺、神经毒性。脱发、听力减退、色素沉着等。(E对)

42. B 【解析】吸入麻醉、静脉麻醉、复合麻醉属于全身麻醉,硬膜外阻滞麻醉和蛛网膜下腔阻滞麻醉属于椎管内麻醉,全身麻醉和蛛网膜下腔阻滞麻醉术后需要去枕平卧 6~8 小时,硬膜外麻醉穿刺时不穿透蛛网膜,不会引起头痛,故术后需要平卧 4~6 小时,但不必去枕(B对)。

43. C 【解析】ICU 患者是医院感染的易感人群,ICU 病室的环境情况每月要进行一次空气培养。(C对)

44. D 【解析】因为库存血中红细胞裂解将钾释放出来进入血液中,库存时间越久,血钾越高,输入大量库存血会导致高钾血症。(D对)

45. E 【解析】16 周末从外生殖器可确定胎儿性别,部分孕妇自觉有胎动。20 周末皮肤暗红,出现胎脂,全身覆盖毳毛,并可见一些头发。出生后已有心跳、呼吸、排尿及吞咽运动。24 周末各脏器均已发育,皮下脂肪开始沉积但量少,故皮肤仍呈皱缩状,出现眉毛及眼毛。28 周末皮下脂肪不多,皮肤呈粉红色。有呼吸运动,但肺泡 II 型细胞中表面活性物质含量低,故此期出生者易患特发性呼吸窘迫综合征,如加强护理可以存活。32 周末皮肤呈深红色,面部毳毛已开始脱落。36 周末胎儿身长约 45cm,体重约 2500g。皮下脂肪发育良好,毳毛明显减少,面部皱褶消失。指(趾)甲已达指(趾)端。此期出生者生活力良好。(E对)

46. B 【解析】老年性阴道炎白带多为淡黄色,假丝酵母菌阴道炎白带为白色豆渣样白带,滴虫阴道炎为稀薄泡沫样白带,慢性宫颈炎多为血性白带。(B对)
47. A 【解析】子宫颈糜烂是慢性宫颈炎炎性病变过程中最多见的局部特征。宫颈表面呈红色病变,是鳞状上皮脱落被柱状上皮所代替,鳞状上皮下的血管显露出来而表现出红色病变。糜烂面与周围的正常鳞状上皮有清楚的界限。因非真正糜烂,又称“假性糜烂”。(A对)
48. C 【解析】胎儿娩出后 24h 内出血量超过 500ml 者称为产后出血,80%发生在产后 2h 内。晚期产后出血是指分娩 24h 以后,在产褥期内发生的子宫大量出血,多见于产后 1~2 周。产后出血的发病原因依次为子宫收缩乏力、软产道裂伤、胎盘因素及凝血功能障碍,宫缩乏力是产后出血最常见的原因,占 70%。(C对)
49. D 【解析】肛裂是肌管周围皮肤全层裂开,继发感染所形成的慢性溃疡。粪便干硬造成排便时机械性损伤。(D对)
50. D 【解析】十二指肠残端破裂是毕 II 式手术后最严重的并发症,多发生在手术后 24~48h。表现为上腹突发剧烈疼痛和腹膜刺激征,需立即手术。(D对)
51. C 【解析】阿米巴痢疾病变部位多在回盲部,取右侧卧位,以提高疗效。(C对)
52. E 【解析】链霉素过敏反应和青霉素过敏反应相同,主要症状有①呼吸系统症状:由喉头水肿、支气管痉挛和肺水肿引起,表现为胸闷、气促、哮喘、呼吸困难等。②循环系统症状:由于周围血管扩张导致有效循环血量不足引起,表现为面色苍白、冷汗、发绀、脉细弱、血压下降等。③中枢神经系统症状:由于脑组织缺氧引起(E对),表现为头晕眼花、抽痛、意识丧失、大小便失禁等。④皮肤过敏症状:瘙痒、荨麻疹等。(E对)
53. E 【解析】蛲虫检查时间为临睡前或晨起前,将透明胶带贴在肛门周围,取下后粘于玻片上送检。(E对)
54. D 【解析】伤寒由伤寒杆菌引起的急性消化道传染病,饮食应供给易消化、流质饮食,多饮水,避免高脂肪、高蛋白、高纤维饮食,鱼汤、鸡蛋、豆腐、豆浆含蛋白质高,不应食用。(D对)
55. D 【解析】分级护理分为四个级别:特级护理、一级护理、二级护理和三级护理。(1)特级护理:①病情危重,随时可能发生病情变化需要进行抢救的患者;②重症监护患者③各种复杂或者大手术后的患者④严重创伤或大面积烧伤的患者(D对):⑤使用呼吸机辅助呼吸,并需要严密监护病情的患者:⑥实施连续性肾脏替代治疗(CRRT),并需要严密监护生命体征的患者:⑦其他有生命危险,需要严密监护生命体征的患者。(2)一级护理:①病情趋向稳定的重症患者:②手术后或治疗期间需要严格卧床的患者;③生活完全不能自理且病情不稳定的

患者:④生活部分自理,病情随时可能发生变化的患者。(3)二级护理:①病情稳定,仍需卧床的患者②生活部分自理的患者。(4)三级护理:①生活完全自理且病情稳定的患者:②生活完全自理且处于康复期的患者。(D对)

56. C 【解析】门诊护士掌握急诊就诊标准,通过一问、二看、三检查,初步判断疾病的轻重缓急,及时分诊到各专科诊室,门诊护士的主要任务是预检分诊和维持门诊秩序。(C对)

57. A 【解析】破伤风患者须隔离护理,破伤风感染后更换的敷料应立即送焚烧炉焚烧。(A对)

58. A 【解析】①稽留热:体温持续在 $39\sim 40^{\circ}\text{C}$,达数日或数周,24h波动范围不超过 1.0°C 。②弛张热:体温持续在 39°C 以上,波动幅度大,24h内体温波动范围超过 2°C ,但都在正常水平以上。③间歇热:体温骤升可达 39°C 以上,持续数小时,又迅速降至正常水平或正常以下,持续数小时至数日又如此反复发作。④不规则热:发热时体温波动的范围极不规则,持续时间也不一定,体温曲线毫无规律。体温常在 38°C 左右或波动于 $37\sim 40^{\circ}\text{C}$ 之间。(A对)

59. E 【解析】压疮分四期:①淤血红润期:受压部位出现暂时性的血液循环障碍,局部皮肤表现为红、肿、热、痛,解除压力30min皮肤颜色不能恢复正常,皮肤完整。②炎性浸润期:局部红肿向外浸润、扩大、变硬:皮肤颜色转为紫红色,压之不褪色:表皮水疱形成,病人有疼痛感。③浅度溃疡期:表皮水疱破溃,显露出潮湿红润的疮面,有黄色渗出液体渗出:感染后表面有炎性液体覆盖,致使浅表层坏死,溃疡形成,疼痛加剧。④坏死溃疡期:坏死组织发黑,脓性分泌物增多,有臭味,感染向周围深部组织扩展,侵入真皮下层及肌肉层,可到达骨面。⑤无法分期的压疮:典型特征:全层组织缺失,溃疡底部有腐肉覆盖(黄色、黄褐色、灰色、绿色或褐色),或者伤口床有焦痂附着(棕色、褐色或黑色)。(E对)

60. C 【解析】该患者局部无肿胀,检查有回血,说明留置针未穿破血管,液体未渗出血管外,应给予盐水或肝素钠冲管(C对),若检查无回血、局部肿胀、留置针到期,应更换留置针。(C对)

61. A 【解析】小儿体格发育的常用主要指标是①体重指所有器官、组织及体液的总重量,是代表体格生长以及营养状况的重要指标。②身高(高)指从头顶到足底的全身长度,是代表骨骼发育的重要指标。③上臂围用来评估小儿营养状况。④头围。⑤腹围。⑥坐高。(A对)

62. D 【解析】前囟饱满见于脑积水、脑瘤、脑出血等疾病,因出现颅内压增高,而前囟凹陷见于极度消瘦或脱水者。前囟过小或早闭见于小头畸形。前囟迟闭、过大见于佝偻病、先天性甲状腺功能减低症等。(D对)

63. A 【解析】乙肝疫苗接种时间为出生24h内、1月龄、6月龄。(A对)

64. B 【解析】结合患者的情绪表现,患者常表现为发怒、抱怨等,对有关的医护工作不满,属于愤怒期。(B对)
65. E 【解析】佝偻病即维生素D缺乏性佝偻病是由于婴幼儿、儿童、青少年体内维生素D不足,引起钙、磷代谢紊乱,产生的一种以骨骼病变为特征的全身、慢性、营养性疾病。母乳中的钙、磷比例合适,有利于预防佝偻病。(E对)
66. C 【解析】小儿4~6个月后逐渐增加辅食次数,从少到多,从稀到稠,从软到硬,并逐渐减少喂奶次数。可在春秋季节断奶,因为这时气候不冷不热,各种食品又较丰富;而夏天太热,食物容易变质,易引起肠道传染病,冬天天寒,孩子易多病,夜间喂养不便。(C对)
67. B 【解析】蓝光疗法每2h一次更换体位一次,可仰卧、侧卧、俯卧交替。俯卧需要有人巡视,以免因口鼻受压而影响呼吸。(B对)
68. D 【解析】①幼儿的膳食:此期儿童生长发育仍快,且活动量较婴儿大。因此,营养素及能量需要仍然相对较高,宜食用含优质蛋白高,营养丰富,制作细、软、碎,易消化的食物。进餐次数以一日三餐加上、下午各一次点心为宜。②学龄前儿童膳食:4~7岁儿童膳食基本接近成人。主食软饭转为普通米饭。面食菜肴同成人。但应避免过于坚硬、油腻、辛辣的食品。③学龄期儿童膳食食物种类与成人相同。应供给丰富的营养及充足能量,保证生长发育需要。故膳食安排应取得孩子的好配合。④青春发育期少年的膳食:青春发育期是身体突飞猛进的时期,应供给足够的热量和蛋白质。同时注意维生素和钙、铁、碘等微量元素的补充;以满足骨骼生成需要和预防青春期贫血和单纯性甲状腺肿。(D对)
69. B 【解析】患者咯血,且出现表情恐怖,张口瞪眼,两手乱抓,为窒息的表现。(B对)
70. C 【解析】小儿腹泻避免使用止泻剂,因为止泻剂在抑制胃肠蠕动的同时,可增加细菌繁殖和毒素吸收。(C错,本题选C)
71. D 【解析】腰麻前行导尿术并留置导尿管主要目的是引出尿液,排空膀胱,并防止术中尿潴留。(D对)
72. C 【解析】行尿细菌培养时,为防止标本污染,应清洗会阴、消毒尿道口后留取中段尿5ml。(C对)
73. D 【解析】治疗宫颈炎症最常用的方法为物理治疗,局部药物治疗适合用于糜烂面积较小,炎症浸润较浅的病例;未育女性尽量不使用手术治疗,最好用物理治疗如激光、冷冻、微波(D对)
74. D 【解析】错觉是对客观事物歪曲的知觉,幻觉是没有现实刺激作用于感觉器官时出现的知觉体验,是一种虚幻的知觉。(D对)

75. B 【解析】抑郁症是自杀率最高的精神疾病,应协助阻断患者负面的想法,增加正向的看法,要在护理人员观察的环境中,避免独处。(B对)

76. A 【解析】

骨折部位	瘀斑部位	脑脊液漏
颅前窝	熊猫眼症、兔眼症	鼻漏
颅中窝	耳后乳突处	耳、鼻漏
颅后窝	耳后及枕下部、咽后壁	无

所以该患者为颅前窝骨折。(A对)

77. B 【解析】机械性损伤的患者最先采取的措施是抢救生命,优先处理张力性气胸;判断伤情,保持呼吸道通畅;迅速止血,补充血容量;包扎封闭体腔伤口,填塞、封闭开放的胸壁伤口;有效固定骨折、脱位的关节;安全转运(B对)

78. E 【解析】恶心、呕吐等消化道症状为化疗药物常见的副作用,应耐心与患者沟通解释,帮助其树立信心,不能据此停药。(E对)

79. B 【解析】大便隐血试验:试验期3天,禁止食用铁剂、动物血、肝类、瘦肉及绿叶蔬菜。(B错,本题选B)

80. C 【解析】管理架构是护理部主任-科护士长-病区护士长,共有三级。(C对)

81. A 【解析】戴无菌手套时发现无菌手套有破溃、潮湿、变色时应更换新的手套。(A)

82. C 【解析】膝胸卧位:适用矫正子宫后倾或胎位不正,促进产后子宫复原以及肛门、直肠及乙状结肠镜检查。(C对)

83. A 【解析】长期留置导尿管的患者,发生尿液浑浊、沉淀或有结晶时应提示逆行性泌尿感染,鼓励患者多饮水并进行膀胱冲洗。(A对)

84. E 【解析】患者发生青霉素过敏性休克,青霉素过敏时应:①就地抢救,立即停药,使病人平卧。②首选肾上腺素立即皮下注射,0.1%盐酸肾上腺素成人剂量0.5~1ml,病儿酌减,如症状不缓解,可每隔半小时皮下或静脉注射0.5ml,直至脱离险期,此药是抢救过敏性休克的首选药物,它具有收缩血管、增加外周阻力、兴奋心肌、增加心输量及松弛支气管平滑肌的作用。③纠正缺氧:改善呼吸给予氧气吸入,当呼吸受抑制时,应立即进行口对口呼吸,并肌内注

射尼可刹米或洛贝林等呼吸兴奋剂。喉头水肿影响呼吸时,应立即准备气管插管或配合施行气管切开术。④抗过敏抗休克:根据医嘱立即给地塞米松 5~10mg 静脉注射或用氢化可的松 200mg 加 5%或 10%葡萄糖液 500ml 静脉滴注,根据病情给予升压药物,如多巴胺、间羟胺等。病人心跳骤停,立即行胸外心脏按压。⑤纠正酸中毒和抗组胺类药物,按医嘱应用。⑥密切观察,详细记录:密切观察病人体温、脉搏、呼吸、血压、尿量及其他临床变化。(E 对)

85. D 【解析】患者心功能不会伴严重水肿,应限制钠的摄入,摄入量不超过 2g/天。(D)

86. A 【解析】冰袋应置于颈前颌下,防止和减少局部出血。(A 对)

87. A 【解析】急性盆腔炎禁止热水坐浴、阴道灌洗和不必要的妇科检查,以防炎症扩散。(A 对)

88. C 【解析】抗疟药主要治疗盘状狼疮,通常用磷酸氯喹每日 250~500mg,其衍生物排泄缓慢,可在体内蓄积,引起视网膜退行性病变,故应定期查眼底。(C 对)

89. C 【解析】人际沟通的距离包括四种①亲密距离:护患双方的距离<50cm,护患能互相触摸的距离,用于爱抚、查体、治疗等活动时;②个人距离:沟通双方相距 50~100cm,是护患沟通的理想距离,如护士向病人解释护理操作等;③社会距离:双方相距 1~4m,主要用于工作单位或社会活动时,如护士同事在一起工作时;④公众距离:相距 4m 以上,用于上课、讲演等活动。(C 对)

90. D 【解析】自发性气胸的首要急救是封闭皮肤引流口,防止发生开放性气胸。(D 对)

91. D 【解析】麻醉床盖被向着床面,便于接收手术后病人。麻醉床的盖被没有严格要求必须开口向门或是背门,主要是方便术后的病人过床。(D 错,本题选 D)

92. C 【解析】40%甲醛,每 30ml 尿液加一滴,固定尿中有机成分,用于 12h 尿细胞计数。甲苯可以保持尿中的化学成分不变,每 100ml 的尿中加入 0.5%~1%甲苯 10ml,常用于尿蛋白定量、尿糖定量等:浓盐酸防止尿液中激素被氧化,防腐,24h 尿液中加 5~10ml,可用于酮类固醇检查。(C 对)

93. E 【解析】洋地黄中毒或过量的临床表现:①胃肠道反应:食欲下降、厌食、恶心、呕吐;②神经系统症状:视物模糊、黄视、绿视、乏力、头晕。根据题意可知患者发生了洋地黄中毒反应,发生洋地黄中毒时应立即停药并报告医生(E 对)

94. B 【解析】该患者脾破裂导致大量出血,输血能迅速补充血容量,防止失血性休克。(B 对)

95. B 【解析】库存血含有血液的各种成分,但白细胞、血小板、凝血酶原等成分破坏较多,导致钾离子含量增多,酸性增高。大量输注可引起高钾血症和酸中毒。(B 对)

96. D 【解析】输血前后及输两袋血中间均应输入少量生理盐水。(D 对)

97. C 【解析】异丙嗪能预防过敏反应发生,可在输血前肌内注射。(C对)
98. A 【解析】伤寒病愈满一年可参加献血,有传染病史、疾病急性期及过敏史者、凝血功能异常者均不适合献血。(A对)
99. E 【解析】十二指肠溃疡疼痛位置在上腹正中或稍偏右,疼痛时间为餐后3~4h,夜间有明显上腹痛,十二指肠溃疡的疼痛为空腹痛,进餐后缓解,胃溃疡的疼痛为进餐时疼痛,餐后1~2h缓解,该患者为空腹痛,伴有出血,考虑为十二指肠溃疡出血。(E对)
100. E 【解析】胃肠减压可吸出胃肠道内容物和气体,减少胃肠内积气及减少胃酸及胰液等消化液分泌。(E对)
101. B 【解析】法莫替丁为H₂受体拮抗剂,药物应在餐中或餐后即刻服用,也可把1天的剂量在睡前服用(B对)。
102. A 【解析】物品在阳光下暴晒6h才能达到消毒效果。(A错,本题选A)
103. E 【解析】环氧乙烷穿透力强,具有高效光谱杀菌的作用,适用于医疗器械、化纤织物、皮毛、棉、塑料制品等的消毒灭菌。(E对)
104. D 【解析】患者的信件、钱币等不耐湿,不耐高温,应选用化学消毒灭菌法中的熏蒸法,将消毒剂加热或加入氧化剂,使之产生气体进行消毒。临床上常用的有甲醛气体熏蒸消毒。(D对)
105. A 【解析】阴道出血是葡萄胎最常见的症状,B超提示子宫大于正常妊娠月份。葡萄胎因滋养细胞增生,产生大量绒毛膜促性腺激素(HCG),由于大量HCG的刺激,双侧或一侧卵巢呈多发性囊肿改变,称之卵巢黄素化囊肿。根据题干可判断为葡萄胎。(A对)
106. D 【解析】葡萄胎的诊断一经确定后,应立即予以清除,年龄超过40岁的患者,恶变率较年轻妇女高4~6倍,可直接切除子宫,保留附件,对于具有恶变倾向的葡萄胎患者选择性地采取预防性化疗。(D对)
107. E 【解析】宫颈糜烂是慢性宫颈炎最常见的一种病理变化。(E对)
108. A 【解析】炎性浸润期:局部红肿向外浸润、扩大、变硬;皮肤颜色转为紫红色,压之不褪色;表皮水疱形成,病人有疼痛感。(A对)
109. A 【解析】该患者有心力衰竭、压疮,应给与高热量、高蛋白、高维生素、低盐饮食。(A对)
110. A 【解析】已发生压疮的患者的床铺要松软平整,尽可能地经常改换卧床患者的体位,帮助患者翻身,一般每2~3h翻身一次,必要时每1h翻身一次,最长不超过4h。翻身动作要轻柔,避免推、拖、拉等,以防止擦伤皮肤。经常检查患者骨骼突出处以及受压部位,定期按摩

全背或受压处,按摩时自上而下,压力由轻到重,再由重到轻,切勿擦伤皮肤。受压局部要垫气圈、棉圈、海绵垫等。形成的小气疱可自行吸收,大的水疱可在无菌操作下抽出水疱内液体,用生理盐水清洗创面,涂消毒溶液,用无菌敷料包扎。患者骶尾部皮肤已破溃,不宜垫置气圈。

(A 错,本题选 A)

111. A 【解析】2%过氧乙酸可用于环境喷洒消毒,过氧乙酸为强氧化剂,有很强的氧化性,遇有机物放出新生态氧而起氧化作用,由于过氧乙酸在空气中具有较强的挥发性,对空气进行杀菌、消毒具有良好的效果。(A 对)

112. B 【解析】未被病原微生物污染的区域称为清洁区,包括:治疗室、配餐室、更衣室、值班室、库房等以及隔离病区以外的地区。(B 对)

113. C 【解析】体温计用 70%乙醇用于浸泡消毒。(C 对)

114. B 【解析】患儿因口腔疼痛而影响进食。局部涂 2%利多卡因以减轻疼痛(B 对)。

115. A 【解析】口炎患儿应选用温凉流质、半流质饮食,避免酸、粗、硬刺激性食物。(A 错,本题选 A)

116. A 【解析】胃切除后胃酸分泌减少,影响铁吸收,导致缺铁性贫血。(A 对)

117. C 【解析】铁剂的服用最好在两餐之间服药;既减少对胃黏膜的刺激,又有利于吸收,同时服用维生素 C、果汁能促进铁剂的吸收。牛奶、茶、咖啡、抗酸药等与铁剂服用会影响吸收;用吸管或服药后漱口,以防牙齿被染黑;铁剂服用至血红蛋白正常后 6~8 周。(C 错,本题选 C)

118. C 【解析】指导病人摄入营养丰富的清淡饮食,避免牛奶、蛋、鱼、虾等易过敏的食物及胡椒、生姜等刺激性食物,嘱戒烟酒,患者处于发绀,应少食,避免窒息。(C 错,本题选 C)

119. A 【解析】该患者目前呼吸困难,发绀,应先予患者鼻导管低流量、持续湿化吸氧,改善呼吸。(A 对)

120. D 【解析】支气管哮喘患者应用解痉药物和抗炎药物及给予鼻导管低流量,持续湿化吸氧。(D 错,本题选 D)

实践能力

1. E 【解析】慢性阻塞性肺疾病是一种具有气流受限特征的肺部疾病,主要为呼气时间延长。(E 对)

2. C 【解析】脉搏即 1 分钟内脉搏搏动的次数。在安静状态下,正常成年人的脉率在 60~100 次/分之间。脉搏的测量部位首选部位是桡动脉,其次是颞浅动脉、颈动脉、肱动脉等(D 错)。测量方法以桡动脉为例,病人在静息状态下正常脉搏计数 30s(B 错),将所测得数值乘以 2,即为脉率的数据。如果脉搏异常或者病情危重的患者应测 1min。脉搏短绌的测量方法:两位护士同时测量,一人负责听心率,另一人负责测脉率,由听心率者发出“起”“停”的口令,两人同时开始,测 1min,分别得出 2 个数据,记录方法为分数形式:心率/脉率。(C 对)同时应注意在测量脉数时应先向病人做好解释,并且不能用拇指测量脉搏,因为拇指的动脉搏动会影响脉搏计数(A、E 错)。(C 对)

3. B 【解析】在自然光线下正常人瞳孔直径为 2~5mm,圆形,两侧等大、等圆,边缘整齐。小于 2mm 称为瞳孔缩小,大于 5mm 为瞳孔扩大,双侧瞳孔缩小常见于有机磷中毒、吗啡、氯丙嗪等药物中毒;双侧瞳孔扩大常见于颅内压增高、颅脑损伤、颠茄类药物中毒。(B 对)

4. B 【解析】自动体位是病人自动采取的卧位,适用于清醒病人;被动卧位是病人自身无改变卧位的能力,躺在被安置的卧位,如昏迷、极度衰弱、瘫痪等病人(B 对);患侧卧位是病人侧向有功能障碍的或患病侧肢体,预防压疮形成,临床经常使用于长期卧床病人,与仰卧位交替更换以减少局部受压时间,防止压疮的发生;端坐位用于急性肺水肿,心包积液及支气管哮喘发作的病人,由于极度呼吸困难患者常常被迫端坐。床头抬高 70°~80°,床尾抬高 15°~20°,此卧位可减轻病人的体力消耗。(B 对)

5. C 【解析】胃癌的转移途径有直接浸润、淋巴转移、血行转移及腹腔种植转移。淋巴道转移是胃癌最常见的转移方式,随着癌瘤侵犯的深度及广度的增加,可沿胸导管转移到左锁骨上淋巴结,甚至两侧锁骨上淋巴结都可转移。(C 对)

6. E 【解析】浅昏迷:随意活动消失,对疼痛刺激有反应,各种生理反射(吞咽、咳嗽、角膜反射、瞳孔对光反应等)存在,体温、脉搏、呼吸多无明显改变,可伴谵妄或躁动。深昏迷:随意活动完全消失,对各种刺激皆无反应,各种生理反射消失,可有呼吸不规则、血压下降、大小便失禁全身肌肉松弛、去大脑强直等,浅昏迷与深昏迷的主要区别是各种刺激反应是否存在。(E 对)

7. B 【解析】阻塞性肺气肿两肺呼吸音减弱,呼气延长,有干、湿啰音;急性肺水肿体征:口唇

甲床紫绀,咳大量粉红色泡沫痰,双肺听诊布满肺湿啰音,血压下降;支气管哮喘发作时双肺呈过度充气状态,哮鸣音广泛,呼吸音延长;支气管扩张早期或干性支气管扩张症可无肺部阳性体征,继发感染可在病变区听到局限性、固定性湿啰音,有时可闻及哮鸣音;肺脓肿早期常无异常体征,脓肿形成后病变部位听诊浊音,呼吸音减低,数天后可闻及支气管呼吸音和湿啰音;随着肺脓肿增大,可出现空瓮音。(B对)

8. D 【解析】腰椎间盘突出病人术后进行直腿抬高试验的目的是防止神经根粘连。(D对)

9. C 【解析】酮症酸中毒呼吸有烂苹果味;有机磷农药中毒呼吸气味中有大蒜味。(C对)

10. C 【解析】为避免饮食对内生肌酐的影响,应食用无肌酐饮食,连续进食低蛋白饮食3天,每日蛋白质应少于40g,并禁食肉类(无肌酐饮食),试验期禁食肉类、鱼类、鸡、鸭类等食物,试验当天忌饮茶和咖啡,停用利尿剂。(C对)

11. E 【解析】水痘具有传染性,出疹前1~2天至疱疹结痂为止均具有传染性。(E对)

12. B 【解析】肾病综合征中水肿是最常见的临床表现,开始从眼睑、面部开始,以后逐渐波及全身,呈凹陷性,严重水肿还可以出现胸腔、腹腔、心包积液。(B对)

13. D 【解析】①一氧化碳轻度中毒:血液中COHb浓度10%~20%,头痛、头晕,四肢无力,胸闷。②一氧化碳中度中毒:血液中COHb浓度30%~40%,浅昏迷,皮肤多汗、面色潮红、口唇呈樱桃红色。③一氧化碳重度中毒:血液中COHb浓度50%以上,深昏迷、各种腿反射消失,有惊厥、脑水肿、呼吸衰竭、肺水肿、休克、心肌损害。(D对)

14. B 【解析】造口术后1周或造口处伤口愈合后,每日扩张造瘘口1次,防止造口狭窄。当造口袋二分之一容量被排泄物充满时,需及时更换。造口周围皮肤应尽量保持干燥,及时清除流出的粪液,要定时训练排便习惯。(B对)

15. B 【解析】急性溶血、血型不符合的输血,都会导致尿液呈现酱油色,阻塞性黄疸及肝细胞性黄疸尿液为胆红素尿。(B对)

16. C 【解析】癫痫患者脑电图可有特异性改变,是癫痫首选辅助检查,对癫痫诊断及分型有重要意义。(C对)

17. E 【解析】儿童后期卵巢有发育,也会逐渐分泌性激素;卵巢生殖内分泌功能最旺的时期是育龄期,月经初潮标志着女性已经步入了青春期,生殖器官发育成熟一般要到成年;绝经期是指月经停止,绝经之前已存在卵巢逐步衰退的阶段,大约2~4年,在不同的人长短不一,称为绝经前期。绝经之后卵巢功能更为低下,但不一定立即完全消失,一般也要经历2~3年,也有长达6~8年,甚至更长。(E对)

18. A 【解析】单纯性甲状腺肿原因有:甲状腺素原料缺乏,如水土流失的山区;甲状腺素需要

量增高,如青春期、妊娠期及绝经期妇女;甲状腺素合成分泌障碍,如食物、药物作用。单纯性甲状腺肿主要病因是碘量不足。(A对)

19. B 【解析】临床上以足月儿血清总胆红素超过 $205.2\mu\text{mol/L}$ (12mg/dl), 早产儿超过 $256.5\mu\text{mol/L}$ (15mg/dl) 称为高胆红素血症。(B对)

20. A 【解析】抗凝治疗期间需定期检测凝血功能,关注有无出血倾向。(A对)

21. E 【解析】半卧位有利于血液循环,并增加防潮气量,利于呼吸(B对),可减轻腹部张力使病人舒适,可使腹部渗血渗液流入盆腔以避免形成膈下脓肿。(D对)因为这种体位可以减少腹部肌肉牵拉受力,减少病人的疼痛及伤口缝线张力。另外,半卧位还可减轻中毒症状,盆腔与上腹部及膈下相比较,淋巴及血循环丰富,吸收能力强,取半坐位,引流液流向盆腔,有利于引流和使感染局限化(A、C对)。(E错,本题选E)

22. E 【解析】癌症的局部表现:①肿块:癌细胞恶性增殖所形成的,可用手在体表或深部触摸到,表面不平滑,不易推动(A、B对),恶性肿瘤表面质地坚硬如肝癌(D对)。②疼痛:有些早期感觉不到疼痛,出现疼痛往往提示癌症已进入中、晚期。开始多为隐痛或纯痛(E错),夜间明显。以后逐渐加重,变得难以忍受,昼夜不停。一般止痛药不起作用。疼痛一般是癌细胞侵犯神经造成的。③溃疡:由于某些体表癌的癌组织生长快,营养供应不足,出现组织坏死所形成的。如某些乳腺癌可在乳房处出现火山口样或菜花样溃疡,分泌血性分泌物,并发感染时可有恶臭味。④出血:癌组织侵犯血管或癌组织小血管破裂而产生的。如肺癌病人可咯血,痰中带血;胃、结肠、食管癌则可使血。⑤梗阻:癌组织迅速生长而造成的梗阻。当梗阻部位在呼吸道可导致呼吸困难;食管癌梗阻食管则吞咽困难;胆道部位的癌可以阻塞胆总管而导致黄疸;膀胱癌阻塞尿道而出现排尿困难等。(E错,本题选E)

23. A 【解析】自体移植无排斥反应,存活率最高。(A对)

24. E 【解析】乳癌根治术后伤口护理:保持引流通畅,皮瓣下引流管持续负压吸引,防止皮瓣下积液,防止皮瓣移动。术后伤口用弹力细带加压包扎,使胸壁与皮瓣紧密贴合,包扎松紧度要适当,以能容的!根手指为宜,一般维持7~10天。(E对)

25. E 【解析】急性脓胸:致病菌进入胸腔引起感染炎性渗出,造成胸腔炎性或脓性积液,称为脓胸。急性脓胸辅助检查有CT检查、B超、X线,但脓腔穿刺抽得脓液可最后确切诊断。脓液的外观、性状、颜色及气味,对判断致病菌的种类有一定帮助。(E对)

26. B 【解析】仅有1根肋骨骨折称为单根肋骨骨折,2根或2根以上肋骨骨折称为多发性肋骨骨折,肋骨骨折可以同时发生在双侧胸部,每肋仅一处折断者称为单处骨折,有两处以上折断者称为双处或多处骨折,多根多处肋骨骨折或多根肋骨骨折合并多根肋软骨骨骺脱离或双

侧多根肋软骨骨折或骨骺脱离,则造成胸壁软化,称为胸壁浮动伤,又称为连枷胸。(B对)

27. A 【解析】幽门梗阻患者病人往往因胃胀而厌食,抗酸药亦渐无效。由于呕吐次数增加,脱水日渐严重,体重下降。病人头痛、乏力、口渴,但又畏食,重者可出现虚脱。由于胃液丢失过多,可发生手足搐搦,甚至惊厥。由于胃酸丢失过多,患者可出现代谢性碱中毒。胃液大量丢失时可伴 Cl^- 、 K^+ 的丢失和细胞外液容量减少,低血 Cl^- 时,同时负离子 HCO_3^- ; 增多以补偿之,细胞外液容量减少时,由于醛固酮分泌增多,促进 Na^+ 重吸收而促使开和 K^+ 排出增多。

(A对)

28. B 【解析】腹膜炎形成后,腹腔渗液中大量的细菌与毒素经腹膜吸收、循淋巴管进入血液中,产生败血症的一系列症状,导致患者出现低血压及休克表现。(B对)

29. A 【解析】直疝三角外侧边是腹壁下动脉(B对),内侧边是腹直肌外侧边缘(C对),底边为腹股沟韧带(D对)。此处腹壁缺乏完整的腹肌覆盖,且腹横筋膜又比周围部分薄。因此易发生病。腹股沟直疝在此由后向前突出(A错),故称直疝三角。由于直疝三角是由腹直肌外缘、腹壁下动脉及腹股沟韧带三个边界构成。中老年或者体弱者往往这部分为腹壁的薄弱区,当腹内压不适当地增高时,使腹腔内容物由此突出,在下腹部可见一半球形的肿物。(A错,本题选A)

30. D 【解析】X线检查可见膈下游离气体说明是空腔脏器穿孔,应为胃溃疡穿孔或其他空腔脏器溃疡穿孔。胆囊炎穿孔胆汁进入腹腔,不会有气体。(D对)

31. E 【解析】贫血最常见的受损部位是皮肤黏膜,以口唇、口腔黏膜、甲床最明显。(E对)

32. E 【解析】社区获得性肺炎最常见的类型为细菌性肺炎,细菌性肺炎常见的致病菌有肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、大肠埃希菌、厌氧菌、军团菌等,其中肺炎链球菌是细菌性肺炎最常见的致病菌。(E对)

33. D 【解析】痛风患者应严格控制饮食,避免高嘌呤如动物内脏、鱼虾类、河蟹、肉类、菠菜、黄豆、扁豆、疏豆、浓茶、酒等食物,应进食碱性食物,如牛奶、鸡蛋、马铃薯、各类蔬菜、柑橘类水果等。(D对)

34. C 【解析】糖尿病肾病是糖尿病常见的并发症,是糖尿病全身性微血管病变表现之一,临床特征为蛋白尿,渐进性肾功能损害,高血压、水肿,晚期出现严重肾功能衰竭,是糖尿病患者的主要死亡原因之一。糖尿病会损坏眼底微血管,可以导致视力衰退,甚至失明,称为糖尿病视网膜病变。(C对)

35. B 【解析】该患者月经量多,持续时间长,导致慢性失血,使体内储存铁耗竭,这也是成人缺铁性贫血的主要原因。缺铁性贫血为小细胞低色素性贫血,出血性贫血为正常细胞性贫血,

维生素 B₁₂ 缺乏导致的贫血为大细胞性贫血, 血常规提示: 小细胞低色素性贫血, 所以该患者为缺铁性贫血。(B 对)

36. B 【解析】外科热发生时间为术后 2~3 天, 一般不超过 38.5℃, 该案例中患者发热, 体温为 38.7℃, 时间为术后 6 天且切口疼痛, 应考虑切口感染。(B 对)

37. E 【解析】小儿高热惊厥初次发病在 2 个月至 5~6 岁之间, 在上呼吸道感染、发热性传染病等发热性疾病的初期, 体温在 38℃ 以上时突然出现惊厥, 该患儿体温为 39.5℃, 所以该患儿最可能发生高热惊厥。(E 对)

38. A 【解析】试产时要专人看护(A 对), 试产期间禁灌肠, 不得使用镇静剂, 肛查只能在宫缩间歇时进行(B、C、D 错), 第一产程不能超过 2h, 若超过应行会阴侧切或剖宫产(E 错)。(A 对)

39. E 【解析】新生儿生理性黄疸一般于出生后 2~3 天出现, 4~5 天达高峰, 足月儿在生后 10 天左右消退; 早产儿约有 80% 生后出现黄疸, 可持续 3~4 周消退, 期间小儿一般情况良好, 食欲正常。该患儿为早产儿, 考虑生理性黄疸。(E 对)

40. A 【解析】大量腹水会抬高膈肌, 出现、腹胀、呼吸困难, 应取半卧位。少量腹水患者建议平卧位, 以增加肝、肾血流量。(A 错, 本题选 A)

41. D 【解析】子宫收缩力是临产后的主要产力, 贯穿于分娩全过程。临产后的宫缩能使宫颈管缩短消失、宫口扩张、先露下降和胎盘娩出。(D 对)

42. A 【解析】在生完孩子 30min 内, 接产的医生或护士应把孩子抱给母亲, 使母亲婴儿裸体接触 30min 以上, 产后母婴皮肤早接触, 有助于母亲乳汁分泌(下奶)及母婴感情交流。当母亲听到婴儿的哭声, 母亲和婴儿皮肤的接触或婴儿吸吮刺激乳头及乳晕上的感觉神经末梢, 脑部便会分泌一种激素, 促进乳汁分泌。同时这种激素还会使母亲的子宫肌肉收缩, 尽快复原, 减少产后出血。(A 对)

43. C 【解析】痛经可分为原发性痛经和继发性痛经。原发性痛经是周期性月经期痛但没有器质性疾病, 而继发性痛经常见于子宫内膜异位症、肌瘤、盆腔炎症性疾病、子宫腺肌病、子宫内膜息肉和月经流出道梗阻。痛经的机制与前列腺素活性有关。痛经患者体内的前列腺素的含量高于没有痛经的患者。前列腺素(PG) 释放增加; 分泌期子宫内膜及血中 PG_{2a} 异常升高, 诱发子宫肌收缩从而产生痉挛性疼痛, 无排卵性子宫内膜因无黄体酮刺激, 前列腺素浓度很低, 一般不发生痛经。同时可引起胃肠道反应。下腹疼痛是痛经的主要症状, 按痛最早于经前 12h, 月经第一日最剧烈。痛经的治疗一般为对症治疗, 一般给镇痛、解痉类药物。(C 错, 本题选 C)

44. D 【解析】子宫脱垂,是指子宫从正常位置沿阴道下降,宫颈外口达坐骨棘水平以下,甚至子宫全部脱出于阴道口以外。(D对)
45. D 【解析】阴道灌洗应选择阴道无流血时期,月经期在月经干净后可行阴道灌洗,妊娠期不可行阴道灌洗,以免导致流产,产褥期恶露未干净,不可行阴道灌洗。(D对)
46. B 【解析】急性肾小球肾炎由 β 溶血性链球菌感染引起的一种免疫复合物性肾小球肾炎,典型表现为水肿、血尿、高血压、少尿。(B对)
47. D 【解析】婴幼儿常应喂养不当,添加辅食过晚导致铁摄入不足而出现营养性缺铁性贫血。(D对)
48. C 【解析】脑血栓和脑脓肿为法洛氏三联症最严重的并发症之一。由于法洛氏三联症患儿长期缺氧,紫绀,因而红细胞增多,血球压积增高,血液黏稠,血流速度缓慢,为脑血管内形成血栓创造条件,如继发感染可形成感染性血栓,或由于脑组织缺氧,脑组织软化,引起细菌感染形成脑脓肿,应鼓励患儿多喝水防止血液过于黏稠形成血栓。(C对)
49. D 【解析】扁桃体又称扁桃腺,是位于儿童鼻腔、口腔与咽部的腺体组织,因外形像扁桃而得名,是免疫系统的一部分。小儿扁桃体炎属于上呼吸道感染,感染部位通常是指腭扁桃体,而非咽扁桃体和鼻扁桃体。该扁桃体常在1岁后开始发育,4~10岁时发育达最高峰,故此时是小儿扁桃体炎最高发的年龄段。(D对)
50. E 【解析】口服补液盐成分是氯化钠 3.5g、碳酸氢钠 2.5g、枸橼酸钾 1.5g 和葡萄糖 20g,加水至 1000ml 后饮用,用于治疗小儿消化不良和秋季腹泻引起的轻度及中脱水。(E对)
51. D 【解析】慢性失血,使体内储存铁耗竭,是成人缺铁性贫血的主要原因(D对)。
52. E 【解析】蛛网膜下腔出血最具特征性的体征是有脑膜刺激征,包括颈强直,Kernig 征、Brudzinski 征。(E对)
53. C 【解析】大面积烧伤的热力作用,使毛细血管通透性增加,导致大量血浆外渗至组织间隙、创面,引起有效循环血容量锐减,而发生低血容量性休克。(C对)
54. D 【解析】水痘患者皮肤瘙痒难受时不可直接挖抓,可分散其注意力,或用温水洗浴,局部涂炉甘石洗剂或 5%碳酸氢钠溶液,亦可遵医嘱口服抗组胺药物,疱疹破溃、有继发感染者,局部可用抗生素软膏。(D对)
55. B 【解析】急性心梗患者急性期应绝对卧床休息,保持安静;低盐、低热量饮食,少量多餐,控制输液速度,防止心力衰竭发生,同时保持大便通畅。(B对)
56. D 【解析】肝硬化病人需输新鲜血,因库存血含氨多易诱发肝性脑病。故该患者输新鲜血的目的是为了防止肝性脑病。(D对)

57. C 【解析】有机磷农药是农业应用广泛的杀虫剂, 主要抑制胆碱酯酶活性, 可表现毒蕈碱样症状、烟碱样症状和中枢神经系统症状, 瞳孔的特征性改变为瞳孔缩小, 为针尖样。根据题意, 考虑为患者食用了杀虫剂未洗干净的水果和蔬菜导致有机磷中毒。(C 对)

58. D 【解析】胆囊结石患者可进食高蛋白、高维生素、高热量、低脂肪、易消化的食物, 禁油腻、粗糙、辛辣饮食, 戒烟、酒, 同时调节饮食种类, 挑选符合口味的饮食, 以增加食欲。(D 错, 本题选 D)

59. B 【解析】每隔一个正常搏动后出现一次期前收缩称为二联律, 每隔两个正常搏动后出现一次期前收缩, 称为三联律。间歇脉: 在一系列正常均匀的脉搏中, 出现一次提前而较弱的搏动, 其后有一较正常延长的间歇(即代偿性间歇)。水冲脉是指脉搏急促有力, 骤起骤落, 如潮水涨落。绌脉在同一单位时间内脉率少于心率。(B 对)

60. A 【解析】急性肾衰少尿期电解质紊乱可有高血钾、低血钠、高血镁、高血磷、低血钙等。尤其是高钾血症, 严重者可导致心跳骤停。高钾可导致病人腹胀, 消化不良, 抑制心肌收缩, 导致心律不齐, 全身无力。(A 对)

61. D 【解析】该患者有化脓性胆管炎, 又是剖腹术后, 病情危重应入住 ICU 进行监护, 密切观察生命体征和神志, 该患者无肢体功能障碍, 无需每 15min 观察 1 次肢体活动。(D 错, 本题选 D)

62. E 【解析】头部包扎常用回反形绷带法包扎(E 对)。四头带是用来固定头、下颌、鼻、眼或膝关节等部位的敷料, 丁字带常用于脚的包扎, 腹带和胸带常用于腹部手术和胸部手术后伤口的减压包扎。(E 对)

63. E 【解析】宫颈糜烂样改变是慢性宫颈炎最常见病理改变。宫颈糜烂样改变可能是宫颈原始鳞柱交接部的外移, 为生理性宫颈糜烂, 也可能是病理性的, 如炎症时宫颈柱状上皮充血水肿等。(E 对)

64. A 【解析】其生育史可简写为第一个数字是代表怀孕次数(不包括流产早产), 第二个数字是代表是早产数, 第三个数字是代表是人流数, 第四个数字是代表有子女数, 所以该女士生育史可简写为 1-0-2-1。(A 对)

65. D 【解析】口服避孕药漏服要在要在 12h 内补服。(D 对)

66. A 【解析】小儿腹泻时呕吐严重时可禁食 4~6h(不禁水), 好转后尽早恢复喂养, 母乳喂养的患儿可继续母乳喂养, 缩短每次哺乳时间, 少量多次喂养, 暂停添加辅食。轻、中度脱水无明显呕吐者可给予口服补液盐。婴儿腹泻期间要做好臀部护理, 保持臀部清洁干燥。病毒性肠炎腹泄不需用抗生素, 细菌性肠炎腹泄根据病原菌, 选择抗生素, 或根据药敏试验结果调整。

大肠杆菌选羟氨苄青霉素、庆大霉素口服片、多粘菌素 E, 重症用三代头孢菌素。鼠伤寒沙门氏菌口服羟氨苄青霉素, 重症用三代头孢菌素。空肠弯曲菌用大环内酯类。金黄色葡萄球菌肠炎用新青 II、万古霉素。真菌性肠炎停用抗生素, 口服制霉菌素。该患儿未明确肠道感染细菌不可随意乱用抗生素。(A 错, 本题选 A)

67. E 【解析】乙肝母婴传播阻断法: 孩子出生后尽快在不同的部位注射乙肝疫苗和乙肝免疫球蛋白, 孩子满月时和 6 个月时再分别注射一次乙肝疫苗。(E 对)

68. B 【解析】该孕妇已有规律宫缩, 宫缩逐渐加强, 宫缩间隔时间变短, 胎心加快, 宫口已开大 4cm, 是临产的征兆, 应立即住院待产, 羊膜未破, 所以还不能送产房消毒接生。(B 对)

69. A 【解析】①稽留流产: 宫口未开, 子宫小于孕周, 胎盘或胎儿在子宫内已死亡, 但未自然排出, 确诊后应尽快排出子宫。②先兆流产: 妊娠 28 周前, 先出现少量的阴道流血、继而出现阵发性下腹痛或腰痛, 盆腔检查宫口未开, 胎膜完整, 无妊娠物排出, 子宫大小与孕周相符。③不全流产: 不全流产是指部分胚胎已排出体外, 尚有部分残留在子宫腔内, 一般子宫小于停经周数, 宫颈口已扩张。④难免流产: 阴道流血量增多, 阵发性腹痛加重。子宫大小与停经周数相符或略小, 宫颈口已扩张, 但组织尚未排出。(A 对)

70. B 【解析】患者行石膏绷带包扎后 3h 后出现手指发凉、发绀, 不能自主活动, 应考虑为石膏绷带包扎过紧, 导致手指供血不良导致。(B 对)

71. A 【解析】急性再生障碍性贫血骨髓象为增生极度减低, 全血细胞减少, 为正细胞贫血, 皮肤出现紫癜, 该患者临床表现及骨髓象检查符合急性再生障碍性贫血诊断。(A 对)

72. E 【解析】维生素 D 缺乏性手足搐搦症又称佝偻病性手足搐搦症或佝偻病性低钙惊厥, 多见于 1 岁内小儿, 尤以 3~9 个月发病率最高, 春季多见, 抽搐停止后多常。精神、食欲无异常。(E 对)

73. A 【解析】妊娠合并心脏病产后 72h 内严密观察生命体征, 安置心电监测, 心功能 I~II 级的产妇可以母乳喂养, III 级或以上应及时回乳, 遵医嘱继续使用抗生素预防感染, 不宜妊娠者在产后 1 周做绝育术。综上所述, BCDE 选项错误, A 对。(A 对)

74. D 【解析】心功能的分级: I 级: 患者患有心脏病但活动量不受限制, 平时一般活动不引起疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。II 级: 心脏病患者的体力活动受到轻度的限制, 休息时无自觉症状, 但平时一般活动下可出现疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。III 级: 心脏病患者体力活动明显限制, 日常生活活动即引起上述的症状。IV 级: 心脏病患者不能从事任何体力活动。休息状态下也出现心衰的症状, 体力活动后加重。(D 对)

75. E 【解析】弯腰屈膝侧卧位可减轻腹部肌张力, 减轻疼痛。(E 对)

76. E 【解析】放射性碘治疗易导致永久性甲状腺功能减退。(E 对)
77. B 【解析】骨牵引有创口,不能清除针孔处的血痂,防止细菌从针孔处进入引起感染。(B 错,本题选 B)
78. D 【解析】注射器能够接触的只有针栓、空筒外面如题干图中的(4)及活塞柄。(D 对)
79. A 【解析】急性心肌梗死第一周应卧床休息,以免加重心脏负荷,心肌缺血加重。(A 对)
80. E 【解析】糖皮质激素治疗期间患者抵抗力弱,应尽量少到人多的地方,以免引起感染;在印刷厂工作接触的材料可能是引起特发性血小板减少性紫癜的因素,应调换工种;糖皮质激素治疗特发性血小板减少性紫癜主要是减少血小板抗体的生成、降低毛细血管脆性和刺激骨髓造血。对急性和慢性型的急性出血发作均有疗效。控制出血的作用明显,多数患者在数天后出血停止,两周内血小板数开始上升。但停药后易复发,血小板正常后应小剂量维持 3~6 个月,患者不可自行停药。(E 错,本题选 E)
81. B 【解析】①稽留热 39~40℃,可持续数天或数周,在 24h 内波动范围小于 1℃。常见于伤寒、肺炎球菌性肺炎等疾病。②间歇热:即高热期和无热期交替出现,反复发作。常见于疟疾等疾病。③弛张热:体温大于 39℃,但波动幅度比较大,在 24h 内体温波动范围在 1℃以上,最低体温仍然高于正常水平。常见的疾病有败血症、化脓性疾病。④不规则热:体温 24h 变化不规则,持续时间不定。常见于流行性感、肿瘤等。(B 对)
82. C 【解析】胃大部切除后 24h 最容易发生出血,因此术后首先观察出血情况。(C 对)
83. E 【解析】膀胱破裂的早期可以出现病人休克,所以积极预防抢救休克是首先应该实行的措施。晚期治疗主要是膀胱修补和一般支持性的处理。(E 对)
84. B 【解析】24h 尿量不足 100 时称为无尿,24h 尿量少于 400ml 为少尿,24h 尿量超过 2500ml 为多尿。(B 对)
85. C 【解析】淋病具有传染性,必须告知其丈夫。治疗期间禁止性生活,注意隔离。污染物如内裤、浴巾以及其他衣物等应煮沸消毒,分开使用洗浴用具。(C 错,本题选 C)
86. A 【解析】放疗对皮肤的伤害:皮肤出现红斑、有灼烧感和刺痒感,继续照射时皮肤由鲜红色渐变为暗红色,以后有脱屑,称为干反应。高度充血、水肿、水泡形成,有渗出液、糜烂,称湿反应。溃疡形成或坏死,侵犯至真皮造成放射性损伤,难以愈合。放疗后数日或更长时间,照射部位可出现皮肤萎缩、毛细血管扩张、淋巴引流障碍、水肿、色素沉着,称为后期反应。患者的内衣宜柔软、宽大、吸湿性强,保持皮肤清洁干燥,防止干反应发展为湿反应。照射也可用温水和柔软毛巾轻轻沾洗,忌用肥皂,不可涂酒精、油膏等刺激性药物,因氧化锌为重金属可产生二次射线加重皮肤损伤,故照射野内不可贴胶布。避免冷热刺激如热敷、热水袋、

冰袋,外出时防止日光直接照射,应予遮挡。(A对)

87. C 【解析】膀胱石碎石术后患者均会出现血尿,膀胱冲洗液颜色较深时,应加快冲洗速度,以免形成血块堵塞尿路。(C对)

88. E 【解析】胶体次枸橼酸铋钾的不良反应:服药期间口内可能带有氨味,并可使舌、粪便染成黑色,也可能出现恶心等消化道症状,但停药后即消失。偶见一些轻度过敏反应。克拉霉素不良反应:可见恶心,内,胃灼热,腹痛腹泻,头痛。暂时性转氨酶升高,停药后可恢复。呋喃西林不良反应:口服有过敏反应,如休克、气喘、气闷、皮疹等:尚有胃肠道反应、药热、嗜酸性粒细胞增多症及神经症状如幻听、幻视、幻觉、头晕、失眠及多发性末梢神经炎等,局部应用偶尔引起皮肤过敏反应。(E对)

89. B 【解析】女性的排卵日期一般在下次月经来潮前的14天左右。下次月经来潮的第1天算起,倒数14天或减去14天就是排卵日,排卵日及其前5天和后4天加在一起称为排卵期。该女性月经周期为30天,上月月经是4月18日,则下次月经是5月18号,5月18号减去14天就是5月4号。(B对)

90. C 【解析】佝偻病初期多为神经兴奋性增高的表现,如易激惹、烦闹、多汗刺激头皮而摇头出现枕秃等。此期常无骨骼病变,骨骼X线可正常。佝偻病是由于维生素D缺乏导致的疾病。(C对)

91. B 【解析】护士在给肝衰竭患者做口腔护理时,应重点观察有无肝臭,肝臭是肝性脑病的预警。(B对)

92. D 【解析】吸烟是原发性支气管肺癌的重要危险因素,持续加剧的干咳,血痰、低热,抗感染效果不显著应排除炎症,可做纤维支气管镜检查明确诊断。(D对)

93. B 【解析】全血细胞是指红细胞、白细胞及血小板,白细胞根据形态差异可分为颗粒和无颗粒两大类,无颗粒的白细胞有淋巴细胞和单核细胞两种。颗粒白细胞(粒细胞)中含有特殊染色颗粒,用瑞氏染料染色可分辨出三种颗粒白细胞即中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞。绝大部分的粒细胞是中性粒细胞。(B对)

94. B 【解析】白细胞也通常被称为免疫细胞,其主要作用是吞噬细菌、防御疾病。当病菌侵入人体体内时,白细胞能通过变形而穿过毛细血管壁,集中到病菌入侵部位,将病菌包围吞噬。绝大部分的粒细胞是中性粒细胞,中性粒细胞在抗感染中起重要的防御作用,嗜酸性粒细胞主要参与寄生虫的感染过程,淋巴细胞主要参与体内的免疫反应。(B对)

95. B 【解析】血小板在人体中主要参与止血、伤口愈合,血小板减少可导致出血。(B对)

96. D 【解析】气性坏疽首要治疗是行清创引流。(D对)

97. E 【解析】患者抵抗力低下应给予保护性隔离,患者脾功能亢进可行脾切除,可应用抗生素抗感染如青霉素类,综合比较五项 E 项是最不合理的,不一定需要避光安静。(E 错,本题选 E)
98. B 【解析】气性坏疽是由梭状芽孢杆菌所引起的一种严重急性特异性感染,主要发生在肌组织广泛损伤的病人,少数发生在腹部或会阴部手术后的伤口处。本病的防治包括早期彻底清创,敞开伤口,预防其发生。(B 对)
99. D 【解析】十二指肠溃疡疼痛位置在上腹正中或稍偏右,疼痛时间为餐后 3~4h,为饥饿痛,夜间有明显上腹痛,进餐后可缓解。(D 对)
100. B 【解析】患者有溃疡病史,突发剧烈腹痛,腹式呼吸表浅,肠鸣音消失,肝区浊音界消失,腹部呈板样强直伴压痛及反跳痛,考虑十二指肠球部溃疡穿孔。(B 对)
101. A 【解析】氧疗是治疗 CO 中毒最有效的方法,迅速用鼻导管给予高浓度吸氧,浓度 60%,流量 8~10L/min,有条件可用高压氧舱治疗。(A 对)
102. A 【解析】一氧化碳急性中毒症状恢复后经过数天或者数周表现正常或接近正常的“假愈期”会再次出现以急性痴呆为主的一组神经精神症状即迟发性脑病。(A 对)
103. B 【解析】部分急性一氧化碳中毒患者在急性期意识障碍恢复正常后,经过一段时间的假愈期,突然出现以锥体系神经损害及大脑同灶性功能障碍、精神意识障碍和椎体外系神经障碍为主的脑功能障碍。一般发生在急性中毒后的两个月内。(B 对)
104. E 【解析】全血胆碱酯酶活力是诊断有机磷农药中毒、判断中毒程度、疗效及预后估计的主要指标。轻度中毒全血胆碱酯酶活力一般在 70%~50%,中度中毒全血胆碱酯酶活力降至 50%~30%,重度中毒全血胆碱酯酶活力降至 30%以下。(E 对)
105. D 【解析】当有机磷进入人体后,磷酸基与酶的活性部分紧密结合,形成磷酸化胆碱酯酶而丧失分解乙酰胆碱的能力,以致体内乙酰胆碱大量蓄积,并抑制仅有的乙酰胆碱酯酶活力,使中枢神经系统及胆碱能神经过度兴奋,最后转为抑制和衰竭,表现一系列症状和体征。(D 对)
106. E 【解析】阿托品为阻断 M 胆碱受体的抗胆碱药,能解除平滑肌的痉挛(包括解除血管痉挛,改善微血管循环);抑制腺体分泌;解除迷走神经对心脏的抑制,使心跳加快;散大瞳孔,使眼压升高;兴奋呼吸中枢。(E 对)
107. A 【解析】患者有吸烟史,右小腿持续性剧烈疼痛,不能行走,右小腿皮肤苍白,肌萎缩,足背动脉搏动消失,为血栓闭塞性脉管炎的临床表现。(A 对)
108. B 【解析】临床上将血栓闭塞性脉管炎分为三期:①局部缺血期:是以血管痉挛为主。表

现为患肢动脉供血不足,出现肢端发凉、怕冷及间歇性跛行等。少数患者可伴有游走性浅静脉炎。患肢胫后动脉和足背动脉搏动明显减弱;皮肤温度低于正常;足背静脉充盈时间延长②营养障碍期:此期除血管痉挛继续加重外,还有明显的血管壁增厚,血栓形成,常出现静息痛,并伴有趾甲生长缓慢、增厚变形,皮肤干燥变薄、苍白,汗毛脱落和肌肉萎缩等。常有肌肉抽搐,尤以夜间明显。患肢胫后动脉和足背动脉搏动消失;足背静脉充盈时间进一步延长。③组织坏死期:患肢动脉完全闭塞,肢体远端发生干性坏疽。皮肤呈暗红或黑褐色,逐渐向上扩展,可形成经久不愈的溃疡。若病变继续发展,可出现一个或多个足趾坏疽,继发感染后转为湿性坏疽。此期患者疼痛剧烈,常彻夜难眠,屈膝抱足为此期的典型体位。患者出现静息痛,夜间疼痛更甚,为营养障碍期。(B对)

109. D 【解析】该患者右小腿持续性剧烈疼痛,不能行走,所以该患者目前主要的诊断为舒适的改变:疼痛。(D对)

110. B 【解析】血栓闭塞性脉管炎病因尚未明确,与多种因素有关:①外来因素:主要有吸烟、寒冷与潮湿的生活环境、慢性损伤和感染。②内在因素:自身免疫功能紊乱、性激素和前列腺素失调及遗传因素。上述因素中,主动或被动吸烟是参与本病发生和发展的重要环节,所以应要求病人戒烟。(B对)

111. B 【解析】麻疹的皮疹特点为淡红色充血性斑丘疹,大小不等,压之褪色,可融合呈暗红色,疹间皮肤正常,3~5天出齐,出疹顺序为头面部—颈—躯干—四肢;风疹的皮疹特点为斑丘疹,疹间有正常皮肤,退疹后无色素沉着及脱屑,出按顺序为面部—躯干—四肢;猩红热的皮肤弥漫充血,上有密集针尖大小丘疹,持续3~5天退疹,1周后全身大片脱皮;水痘为全身性分批出现的皮肤粘膜斑疹、丘疹、疱疹和结痂并存为特点,该患儿为耳后、颈部、发缘有稀疏的不规则红色丘斑疹间皮肤正常,所以应为麻疹。(B对)

112. D 【解析】麻疹退疹后有色素沉着和细小脱屑。(D对)

113. B 【解析】出疹前5天至出疹后5天均有传染性,如合并肺炎,传染性可延长至出疹后10天,所以采取呼吸道隔离至出疹后5天,有并发症者延至出疹后10天。此题没有说明是否有并发症,所以应该选择隔离至出疹后5天。(B对)

114. E 【解析】该患者诊断为右肾挫伤,肾出血量越多,血尿颜色越深,尿量越多(E对)。

115. D 【解析】绝对卧床休息2~4周,即使血尿消失,仍需继续卧床休息至预定时间。过早下地活动可能再度出血。(D错,本题选D)

116. E 【解析】妊娠期血糖控制标准:空腹3.3~5.6mmol/L,餐后2小时4.4~6.7mmol/L,对通过饮食治疗不能控制的妊娠期糖尿病孕妇,为避免低血糖或酮症酸中毒的发生,胰岛素是其

主要的治疗药物。目前该孕妇的血糖较高,应用胰岛素治疗。(E对)

117. D 【解析】低血糖早期会出现面色苍白、出汗、心悸、四肢颤抖及饥饿感等早期低、血糖症状,常由于注射胰岛素后未及时进餐导致的。(D对)

118. D 【解析】胆道蛔虫症的典型临床表现,是阵发性剑突下钻顶样绞痛,突发忽止,发作时病人辗转不安,呻吟不止,缓解时平息如常。体征轻微,剑突偏右有深压痛,很少有反跳痛及肌紧张。症状与体征相分离是本病的特点。如若合并胆道感染可出现腹痛、畏寒发热、轻度黄疸等。(D对)

119. C 【解析】B超是检查胆道蛔虫病的首选方法,本病B超检查可见蛔虫体。(C对)

120. E 【解析】胆道蛔虫症的治疗原则是解痉、镇痛、利胆、驱虫、控制感染、纠正水电解质失调。绝大多数病人可用非手术疗法治愈,仅在出现严重并发症时才考虑手术治疗。(E对)

