

## 二试+延考 中医模拟题

1. 中医学理论体系的确立标志为

- A. 《五十二病方》《黄帝内经》《难经》《伤寒杂病论》
- B. 《黄帝内经》《难经》《伤寒杂病论》《神农本草经》
- C. 《五十二病方》《黄帝内经》《难经》《神农本草经》
- D. 《五十二病方》《黄帝内经》《伤寒杂病论》《神农本草经》
- E. 《五十二病方》《难经》《伤寒杂病论》《神农本草经》

【答案】B

2. 人体是一个有机整体，其“五脏六腑之大主”是

- A. 脑
- B. 心
- C. 五脏
- D. 经络
- E. 肾

【答案】B

3. 五志相胜，思所胜的是

- A. 喜
- B. 怒
- C. 悲
- D. 恐
- E. 忧

【答案】D

4. 主管人体生长发育的脏是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

【答案】E

5. 寒邪的性质和致病特征是


- A. 凝滞而主痛
- B. 黏滞而病程缠绵
- C. 病证善行而数变
- D. 病状沉重而疫困
- E. 升散而袭阳位

【答案】A

6. 思虑过度对气机的影响是

- A. 气乱
- B. 气陷
- C. 气上
- D. 气结
- E. 气收

【答案】D



金英杰医学

JINYINGJIE.COM

7. 肝胆疾病日久不愈，引发癥积或结石，其发病类型是

- A. 感邪即发
- B. 徐发
- C. 继发
- D. 合病
- E. 伏而后发

【答案】C

8. 决定病证虚实变化的主要病机是

- A. 脏腑功能的盛衰
- B. 阴精阳气的盛衰
- C. 气血的盛衰
- D. 正邪的盛衰
- E. 邪气的有无

【答案】D

9. 邪气亢盛，结聚于内，阻滞经络，气血不能外达所形成的病机是

- A. 真实假虚
- B. 由实转虚
- C. 实中夹虚
- D. 真虚假实
- E. 因虚致实

【答案】A

10. “阴胜则寒”的证候性质是

- A. 假热证
- B. 假寒证
- C. 虚寒证
- D. 实寒证
- E. 阴盛伤阳证

【答案】D

11. 阴阳不相维系，双方排斥而格拒可出现

- A. 阳胜则热，阴盛则寒
- B. 阳虚则寒，阴虚则热
- C. 阴盛格阳，阳盛格阴
- D. 阴损及阳，阳损及阴
- E. 阴虚阳亢，阳虚阴盛

【答案】C

12. 据《灵枢·天年》，人生二十岁的表现是

- A. 五脏始定，血气已通，其气在下，故好走
- B. 血气始盛，肌肉方长，故好趋
- C. 五脏大定，肌肉坚固，血气盛满，故好步
- D. 肝气始衰，肝叶始薄，胆汁始灭，目始不明
- E. 筋骨坚，发长极

【答案】B

13. 治疗温热病血热塞盛、发斑、吐衄等，应选用的药物是

- A. 石膏



英杰医学  
YINGJIE.COM

- B. 知母
- C. 金银花
- D. 连翘
- E. 玄参

【答案】E

14. 治疗夜盲症，应选用的药物是

- A. 砂仁
- B. 苍术
- C. 豆蔻
- D. 藿香
- E. 厚朴

【答案】B

15. 善于治疗血淋，尿血，应选用的药物是

- A. 车前子
- B. 泽泻
- C. 石韦
- D. 木通
- E. 滑石

【答案】C

16. 附子与干姜具有的共同功效是

- A. 补火助阳
- B. 回阳救逆
- C. 温肺化饮
- D. 温中止呕
- E. 温经止痛

【答案】B

17. 具有活血通经、补肝肾、强筋骨、利水通淋、引血下行功效的药物是

- A. 蒲黄
- B. 川芎
- C. 红花
- D. 郁金
- E. 牛膝

【答案】E

18. 下列各项，不属牛膝功效的是

- A. 活血通经
- B. 强健筋骨
- C. 引火归原
- D. 利尿通淋
- E. 补益肝肾

【答案】C

19. 患者，男，42岁。一周来入睡困难，甚至彻夜难眠，口苦心烦，舌质红，舌苔黄，脉弦数。用药应首选的药物是

- A. 酸枣仁
- B. 柏子仁



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

- C. 磁石
- D. 朱砂
- E. 首乌藤

【答案】D

20. 具有补气升阳、托毒生肌功效，治疗痈疽不溃的药物是

- A. 人参
- B. 西洋参
- C. 黄芪
- D. 党参
- E. 山药

【答案】C

21. 患者，男，48岁。头晕目暗，两目干涩，视物晕眩，腰膝疼痛，用药应首选的药物是

- A. 决明子
- B. 枸杞子
- C. 石决明
- D. 牡蛎
- E. 车前子

【答案】B

22. 患者，女，39岁。痈疽溃后，腐肉不去，新肉难生，用药应首选的药物是

- A. 乌梅
- B. 升药
- C. 炉甘石
- D. 硫黄
- E. 蟾酥

【答案】B

23. 桑螵蛸与海螵蛸具有的共同功效是

- A. 固表止汗
- B. 固精止遗
- C. 益脾止泻
- D. 敛肺止咳
- E. 止血止带

【答案】B

24. 患者，女，31岁。大便溏泻，纳谷不香，心悸失眠，用药应首选的药物是

- A. 莲子
- B. 芡实
- C. 金樱子
- D. 山药
- E. 磁石

【答案】A

25. 手足蠕动多属于

- A. 热极生风
- B. 虚风内动
- C. 狂犬病
- D. 痛证



金英杰医学

JINYINGJIE.COM

E. 破伤风

【答案】B

26. 小儿食指络脉偏红的临床意义是

A. 疳积

B. 里热

C. 表证

D. 疼痛

E. 惊风

【答案】C

27. 阴寒内盛的舌色是

A. 淡紫舌

B. 淡白舌

C. 绛紫舌

D. 青紫舌

E. 淡红舌

【答案】A

28. 数脉的特征是

A. 一息五至

B. 一息四至

C. 一息五至以上，不足七至

D. 一息七至以上

E. 一息八至

【答案】C

29. 下列各项，不会出现迟脉的是

A. 虚寒证

B. 正常人

C. 实热证

D. 实寒证

E. 痰热证

【答案】E

30. 阳气亏虚，心阳不振，无力鼓动气血，脉流不畅时的脉象是

A. 伏脉

B. 牢脉

C. 迟脉

D. 缓脉

E. 沉脉

【答案】C

31. 诊断肺病按诊常用的胸穴是

A. 中府


B. 巨阙

C. 太冲

D. 中极

E. 日月

【答案】A



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

32. 下列各项，不属于“证候相兼”的是

- A. 表例同病
- B. 表实寒证
- C. 表实热证
- D. 里实寒证
- E. 里虚热证

【答案】A

33. 久病、重病呃逆不止，声低气怯的临床意义是

- A. 胃气衰败
- B. 脾胃气虚
- C. 脾胃阳虚
- D. 热邪客胃
- E. 寒邪客胃

【答案】A

34. 先恶寒战栗，继而汗出者属于

- A. 盗汗
- B. 自汗
- C. 蒸汗
- D. 冷汗
- E. 战汗

【答案】E

35. 妇女怀孕厌食、呕恶称为

- A. 少食
- B. 厌食
- C. 恶阻
- D. 恶食
- E. 纳呆

【答案】C

36. 腰部经常酸软而痛的临床意义是

- A. 肾虚
- B. 寒湿
- C. 瘀血阻络
- D. 结石阻滞
- E. 带脉损伤

【答案】A

37. 肺阴亏虚，虚火灼络的肺癆病的临床表现是

- A. 左胸心前区憋闷作痛，时痛时止
- B. 胸痛剧烈，面色青灰，手足青冷
- C. 胸痛，壮热面赤，喘促鼻扇
- D. 胸痛，颧赤盗汗，午后潮热，咳痰带血
- E. 胸痛，壮热，咳吐脓血腥臭痰

【答案】D

38. 患者月经周期基本正常，但经量较常量明显减少，甚至点滴即净的临床意义是

- A. 脾气亏虚，肾气不足，冲任不固；或阳盛血热，肝郁化热，阴虚火旺，热扰冲任，血海不



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

宁

- B. 营血亏虚，肾精不足；或阳气虚衰，生血不足，血海空虚；或气滞，寒凝血瘀，痰湿阻滞，冲低觉阻
- C. 肝气郁滞，脾肾亏虚；或冲任气血失调，血海蓄溢失常
- D. 热伤冲任，迫血妄行；戴气虚，冲任不固；或瘀阻胞络，络伤血溢
- E. 精血亏虚，血海失充；寒凝瘀阻，痰湿阻滞，冲任气血不畅

【答案】E

39. 患者大便带血，或便血相混，或便后滴血，或全为血便的临床意义是

- A. 脾虚、肾虚或食滞胃肠
- B. 肝脾不调
- C. 湿热疫毒，阻滞肠道，肠络受损
- D. 气不摄血或胃肠积热、湿热蕴脾、气血瘀滞
- E. 脾虚中气下陷

【答案】D

40. 《素问·太阴阳明论》认为四肢不用病理是

- A. 肝风动摇
- B. 脾病不能为胃行其津液
- C. 阳气偏阻
- D. 气血不足
- E. 风寒湿袭

【答案】B

41. 以下除哪项外均可见喘证

- A. 麻黄汤证
- B. 桂枝汤证
- C. 麻杏石甘汤证
- D. 桂枝加厚朴杏子汤证
- E. 小青龙汤证

【答案】B

42. 小建中汤证“心中悸而烦”，其病机是

- A. 心阳虚，脾不运化，水气凌心
- B. 心阳虚，神失所养
- C. 肾阳虚，水气泛滥
- D. 脾虚而气血不足，心火上炎
- E. 中焦虚寒，气血不足，复被邪扰

【答案】E

43. “正在心下，按之则痛”是下列何证的主症

- A. 苓桂术甘汤证
- B. 桂枝人参汤证
- C. 大陷胸汤证
- D. 小陷胸汤证
- E. 大陷胸丸证

【答案】D

44. 患者，女，50岁。素易感冒。此次低热3天，伴恶风、汗出，鼻塞、干呕，二便调，舌淡苔薄，脉弱。临床最佳辨证是



英杰医学  
YINGJIE.COM

- A. 桂枝二越婢一汤证
- B. 麻黄汤证
- C. 小建中汤证
- D. 桂枝汤证
- E. 桂枝新加汤证

【答案】D

45. 用小柴胡汤时，若病人口渴，其加减应为

- A. 去半夏加重人参、甘草
- B. 去半夏，加人参至四两半，加栝蒌根四两
- C. 去半夏，加重人参，加五味子、栝蒌实
- D. 去半夏、黄芩，加栝蒌根
- E. 去半夏、黄芩，加五味子、栝蒌根

【答案】B

46. 以下哪项不属于白虎汤证必见之证

- A. 发热
- B. 口渴
- C. 汗出
- D. 脉滑
- E. 不大便

【答案】E

47. 叶天士《温热论》中提到，温邪上受，首先犯

- A. 清窍
- B. 脑
- C. 肺
- D. 上焦
- E. 咽喉

【答案】C

48. 《温热论》中提到“营分受热”的情况，如从湿热陷入者，宜加下列哪组药物

- A. 水牛角(代犀角)、竹叶
- B. 羚羊角、竹叶
- C. 赤芍、丹皮
- D. 水牛角(代犀角)、银花露
- E. 银花、连翘

【答案】D

49. 以下哪项不是湿热证湿在肌肉的临床表现

- A. 恶寒
- B. 发热
- C. 身重
- D. 关节疼痛
- E. 脘闷

【答案】E

50. 邪热入营的清营汤证“反不渴”是因为

- A. 邪热不甚
- B. 兼有痰邪



精英医学  
YINGJIE.COM



- C. 兼有瘀血
- D. 邪热蒸腾营阴上泛
- E. 热扰心神而不觉

【答案】D

1. 下列各项中，除哪项外都是九味羌活汤组成的药物

- A. 防风 川芎
- B. 当归 陈皮
- C. 苍术 细辛
- D. 白芷 生地
- E. 黄芩 甘草

【答案】B

2. 小青龙汤组成的药物中含有

- A. 芍药 甘草
- B. 杏仁 半夏
- C. 半夏 生姜
- D. 生姜 大枣
- E. 茯苓 半夏

【答案】A

3. 天王补心丹的辨证要点是指

- A. 失眠，惊悸，舌红苔黄，脉细数
- B. 失眠，心悸，手足心热，舌红少苔，脉细数
- C. 虚烦失眠，咽干口燥，舌红，脉弦细
- D. 精神恍惚，悲伤欲哭，舌红苔少，脉细
- E. 心悸失眠，体倦食少，舌淡，脉细弱

【答案】B

4. 柴葛解肌汤的功用是

- A. 解肌发表
- B. 解肌透疹
- C. 解肌清热
- D. 解肌疏风
- E. 透疹解毒

【答案】C

5. 血府逐瘀汤组成的药物中除“桃红四物”和甘草外，其余的药物是

- A. 官桂 干姜 蒲黄 五灵脂
- B. 乌药 香附 枳壳 延胡索
- C. 柴胡 桔梗 枳壳 牛膝
- D. 香附 牛膝 没药 五灵脂
- E. 麝香 没药 葱白 鲜生姜

【答案】C

6. 大陷胸汤的药物组成是

- A. 大黄 厚朴 枳实



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

- B. 大黄 芒硝 甘遂
- C. 大黄 芒硝 厚朴
- D. 芒硝 枳实 甘遂
- E. 芫花 甘遂 大戟

【答案】B

7. 四神丸的功用是

- A. 涩肠固脱，温补脾肾
- B. 温肾暖脾，固肠止泻
- C. 温中涩肠，益气固脱
- D. 健脾益气，渗湿止泻
- E. 补气健脾，涩肠止泻

【答案】B

8. 麻子仁丸适用于

- A. 阴虚便秘
- B. 血虚便秘
- C. 阳虚便秘
- D. 气虚便秘
- E. 燥热伤津便秘

【答案】E

9. 下列不属于生化汤组成的药物是

- A. 桂枝
- B. 川芎
- C. 桃仁
- D. 全当归
- E. 炙甘草

【答案】A

10. 桂枝茯苓丸适用于

- A. 脾阳不足，聚湿成饮，咳痰稀白，胸膈不快者
- B. 中阳不足，饮停心下，胸胁支满，心悸目眩者
- C. 脾失健运，痰停中脘，流溢四肢，臂疼肢肿者
- D. 下焦虚寒，小便白浊，频数无度，凝如膏糊者
- E. 妊娠下血，血色紫黯，腹痛拒按，胎动不安者

【答案】E

11. 阳明温病，津亏便秘者，治当首选

- A. 济川煎
- B. 增液汤
- C. 麦门冬汤
- D. 麻子仁丸
- E. 地黄饮子

【答案】B

12. 当归拈痛汤的功用是

- A. 清热养阴，和血止痛
- B. 健脾利水，祛风止痛
- C. 散寒除湿，和血止痛



金腾医学  
JINTENGJIE.COM

- D. 利湿清热, 疏风止痛
- E. 温阳健脾, 和血止痛

【答案】D

13. 枳实导滞丸组成的药物中不含有

- A. 大黄 泽泻
- B. 枳实 黄芩
- C. 神曲 茯苓
- D. 黄连 白术
- E. 木香 半夏

【答案】E

14. 生地、熟地同用的方剂是

- A. 地黄饮子
- B. 一贯煎
- C. 百合固金汤
- D. 炙甘草汤
- E. 独活寄生汤

【答案】C

15. 以宣降肺气、清热化痰为主要功用的方剂是

- A. 泻白散
- B. 桑杏汤
- C. 定喘汤
- D. 苇茎汤
- E. 清气化痰丸

【答案】C

16. 医学道德是一种职业道德, 它不是

- A. 只存在于从事医生职业活动的人们中间
- B. 在内容上具有稳定性、连续性
- C. 在形式上比较具体、生动
- D. 医务人员容易理解、接受
- E. 人道主义精神的集中体现

【答案】A

17. “我们诊治病人时就要有‘如临深渊, 如履薄冰’的态度, 一定要认真仔细, 避免误诊漏诊、延误病情。病人以性命相托, 我们怎能不诚惶诚恐”。他的临床思维和诊治模式是

- A. 为病家谋利益
- B. 和病人在一起
- C. 平等对待病人
- D. 不伤害病人
- E. 不为妇人施堕胎术

【答案】B

18. 我国卫生部于 1988 年制定的医务人员医德规范 7 条内容中, 不直接涉及医患关系的是

- A. 第 2 条
- B. 第 3 条
- C. 第 4 条
- D. 第 5 条



英杰医学

E. 第 6 条

【答案】E

19. 中医四诊的道德要求是

- A. 安神定志
- B. 认真负责
- C. 保守秘密
- D. 知情同意
- E. 尊重患者

【答案】A

20. 人体试验必须坚持的原则中不包括

- A. 知情同意原则
- B. 经济利益原则
- C. 科学对照原则
- D. 医学目的原则
- E. 维护患者利益原则

【答案】B

21. 关于医学道德教育意义的叙述，不包括

- A. 医疗服务水平的提高
- B. 促进卫生健康事业发展
- C. 形成良好的医德医风
- D. 形成稳定的人格倾向
- E. 形成良好的医德行为和习惯

【答案】D

22. 表现为典型弛张热的疾病是

- A. 风湿热
- B. 渗出性胸膜炎
- C. 疟疾
- D. 布鲁杆菌病
- E. 肺炎球菌性肺炎

【答案】A

23. 正常心尖搏动的位置是

- A. 左侧第 5 肋间锁骨中线内 0.5~1.0cm 处
- B. 左侧第 5 肋间锁骨中线外 0.5~1.5cm 处
- C. 左侧第 5 肋间锁骨中线内 1.5~2.0cm 处
- D. 左侧第 5 肋间锁骨中线外 1.5~2.0cm 处
- E. 左侧第 5 肋间锁骨中线内 2.0~2.5cm 处

【答案】A

24. 下列属于湿啰音的听诊特点的是

- A. 是气流冲击管腔内黏稠分泌物引起震动所致
- B. 是气流通过狭窄的气道时发生漩涡所致
- C. 性质多变
- D. 部位较恒定
- E. 呼气时更加清楚

【答案】D



金英杰医学  
JINGYING.COM

25. 出现小细胞低色素性贫血的常见疾病是

- A. 缺铁性贫血
- B. 巨幼细胞贫血
- C. 失血性贫血
- D. 溶血性贫血
- E. 再生障碍性贫血

【答案】A

26. 引起白细胞总数及中性粒细胞增多的疾病是

- A. 伤寒
- B. 流行性感
- C. 化脓性感染
- D. 脾功能亢进
- E. 系统性红斑狼疮

【答案】C

27. 下列各项, 属于保护性抗体的是

- A. 抗 HBc-IgA 阳性
- B. 抗-HBs 阳性
- C. 抗-HBe 阳性
- D. 抗 HBc-IgG 阳性
- E. 抗 HBc-IgM 阳性

【答案】B

28. 引起病理性尿比重减低的疾病是

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 慢性肾衰竭
- C. 糖尿病
- D. 心功能不全
- E. 脱水

【答案】B

29. 痰液直接涂片镜检出现淋巴细胞增多的疾病是

- A. 肺结核
- B. 肺水肿
- C. 支气管哮喘
- D. 支气管炎
- E. 肺炎链球菌肺炎

【答案】A

30. 浆膜腔积液化验结果为: 淡黄色, 比重为 1.016, 黏蛋白定性阴性, 细胞数为  $80 \times 10^6/L$ 。考虑的疾病是

- A. 胸膜炎
- B. 恶性肿瘤
- C. 结核性腹膜炎
- D. 肝硬化
- E. 心包炎

【答案】D

31. 放射防护学和放射治疗学的基础主要应用 X 线的特性是



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

- A. 摄影效应
- B. 荧光效应
- C. 生物效应
- D. 电离效应
- E. 穿透性

【答案】C

32. 支气管肺炎的基本病变是

- A. 渗出
- B. 增殖
- C. 纤维化
- D. 钙化
- E. 肺水肿

【答案】A

33. 周围型肺癌是指肿瘤发生在

- A. 主支气管
- B. 肺叶支气管
- C. 肺段支气管
- D. 肺段以下、细支气管以上
- E. 细支气管以下

【答案】D

34. 十二指肠溃疡的好发部位是

- A. 降部
- B. 升部
- C. 水平部
- D. 球部
- E. 壶腹部

【答案】D

35. 急性化脓性骨髓炎骨改变的 X 线表现在发病多长时间可出现

- A. 即刻 2 周
- B. 3 天内
- C. 3~7 天
- D. 1~2 周
- E. 2 周以上

【答案】E

36. 属慢性肺心病肺动脉高压 X 线检查表现的是

- A. 双肺纹理增多
- B. 右心室肥厚
- C. 右下肺动脉干扩张
- D. 双肺透亮度增高
- E. 右心房肥大

【答案】C

37. 关于慢性呼吸衰竭对代谢及电解质的影响，以下哪项欠妥

- A.  $\text{PaCO}_2$  明显升高导致呼吸性酸中毒
- B. 严重缺氧因乳酸及无机磷生成增多，可出现代谢性酸中毒



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

- C. 长期  $\text{PaCO}_2$  升高经机体代偿可出现  $\text{HCO}_3^-$  代偿性增多，出现呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒
- D. 当  $\text{PaCO}_2 > 80\text{mmHg}$  时，可对呼吸中枢产生兴奋作用
- E. 慢性呼吸衰竭患者的酸碱失衡类型与病情、病程及用药等均有相关性

【答案】D

38. 特别适用于伴有心力衰竭的高血压患者的降压药物是

- A. 利尿剂
- B. 血管紧张素转换酶抑制剂
- C. 钙拮抗剂
- D.  $\alpha$  受体阻滞剂
- E.  $\beta$  受体阻滞剂

【答案】B

39. 诊断慢性胃炎最可靠的方法是

- A. X 线钡餐检查
- B. 胃液分析
- C. 胃镜加活检
- D. 血清胃泌素测定
- E. 大便隐血试验

【答案】C

40. 胃溃疡的好发部位是

- A. 胃小弯
- B. 胃底
- C. 胃大弯
- D. 胃窦部
- E. 贲门

【答案】A

41. 鉴别消化性溃疡和胃癌最有价值的检查是

- A. 大便隐血试验
- B. 胃黏膜脱落细胞检查
- C. X 线钡餐检查
- D. 胃液分析
- E. 电子胃镜

【答案】E


42. 下列关于幽门管溃疡的叙述，错误的是

- A. 多发生于幽门孔 2cm 以内
- B. 男性多发
- C. 呈高胃酸分泌
- D. 周期性节律性疼痛多典型
- E. 内科治疗效果较差

【答案】D

43. 诊断恶性溃疡最有价值的是

- A. 粪便隐血持续阳性
- B. 胃液分析缺乏
- C. 内镜见溃疡形状不规则，底部凹凸不平



英杰医学  
JINYINGJIE.COM

- D. 胃组织学检查有核质变异细胞
- E. X 线检查看到胃内充盈缺损

【答案】C

44. 临床分级为轻、中度的溃疡性结肠炎的首选治疗药物是

- A. 强的松
- B. 6-MP
- C. 柳氮磺吡啶
- D. 替硝唑
- E. 羟氨苄青霉素

【答案】C

45. 重症胰腺炎并发胰腺脓肿多出现在

- A. 发病 2~3 周后
- B. 发病 4~5 周后
- C. 发病 6~7 周后
- D. 发病 8~9 周后
- E. 发病 10 周后

【答案】A

46. 患者，女，因月经量多 2 年，出现贫血表现，经检查诊断为缺铁性贫血，其首选的治疗方  
法是

- A. 口服铁剂
- B. 注射铁剂
- C. 口服叶酸
- D. 增加营养
- E. 输血

【答案】A

47. 女性患者，56 岁，身高 155cm，体重 55kg，体检发现空腹血糖 6.4mmol/L，做口服葡萄糖  
耐量试验，空腹血糖 6.6mmol/L，餐后 2 小时血糖 8.4mmol/L，正确的是

- A. 可诊断糖尿病
- B. 应重复口服葡萄糖耐量试验
- C. 可排除糖尿病
- D. 空腹血糖过高
- E. 糖耐量降低

【答案】E

48. 关于短暂性脑缺血发作，以下哪项表述不正确

- A. 局部脑动脉血供不足引起局部脑组织或视网膜缺血，出现短暂的神经功能缺失
- B. 临床症状 24 小时内完全恢复
- C. 不易反复发作
- D. 患者不仅易发生脑梗死，也有心肌梗死的风险
- E. 患者近 1 周内发生卒中的风险为 4%~10%，90 天内发生卒中的风险为 10%~20%

【答案】C

49. 食管胃底静脉曲张破裂大出血患者首选的止血药是

- A. 垂体后叶素
- B. 西咪替丁



- C. 硝酸甘油
- D. 安络血
- E. 止血敏

【答案】A

50. 男性患者，24岁，在烈日下未加防护进行强体力劳动，大量出汗后感口渴难耐，随即饮用大量冷白开水，约1小时后感周身乏力，双腿疼痛行走困难，并逐渐出现下肢肌肉痉挛强直，前来急诊，该患者最可能的诊断是

- A. 癫痫发作
- B. 热痉挛
- C. 热衰竭
- D. 热射病
- E. 低血糖症

【答案】B

1. 患者，女，63岁。咳嗽反复发作半年，咳声重浊，痰多色白，痰出咳平，每于早晨咳甚痰多，胸闷脘痞，呕恶食少，舌苔白腻，脉濡滑。其证候诊断是

- A. 肝火犯肺证
- B. 痰湿蕴肺证
- C. 痰热郁肺证
- D. 肺阴亏耗证
- E. 风热犯肺证

【答案】B

2. 肺胀的病位在肺，继则影响到

- A. 心、脾，后期病及于肾
- B. 脾、肾，后期病及于心
- C. 肝、肾，后期病及于心
- D. 肝、脾，后期病及于心
- E. 心、肝，后期病及于肾

【答案】B


3. 赵某，男，76岁。反复咳喘26年多。胸部膨满，呼吸浅短难续，张口抬肩，倚息不能平卧，咳嗽，痰白如沫，咯吐不利，胸闷心慌，形寒汗出，腰膝酸软，小便清长，舌暗紫，脉沉细数无力。其诊断是

- A. 肺胀之痰浊壅肺证
- B. 肺胀之肺肾气虚证
- C. 肺胀之阳虚水泛证
- D. 肺胀之痰热郁肺证
- E. 喘证之正虚喘脱证

【答案】B

4. 治疗肺痿之肾虚血瘀证，应首选的方剂是

- A. 麻黄升麻汤
- B. 甘草干姜汤
- C. 清燥救肺汤



英杰医学

D. 七味都气丸合柴胡疏肝散

E. 麦门冬汤

【答案】D

5. 李某，女，80岁。反复咳嗽35年多，现症：咳吐涎沫，喘促短气，食少，形寒肢凉，小便数，舌淡，苔薄白，脉虚弱。此病证的证机概要是

A. 肺气虚寒，气不化津，津反为涎

B. 肺阴亏耗，虚火内炽，灼津为痰

C. 肺肾两虚，气不摄纳，气虚血瘀

D. 阴损及阳，阳损及阴，终致阴阳两虚

E. 肺肾气虚，脾阳虚弱

【答案】A

6. 下列选项中，属于惊悸与怔忡鉴别要点

A. 惊悸为持续性，怔忡为阵发性

B. 怔忡日久不愈，可转化为惊悸

C. 怔忡为上下冲逆，发自少腹

D. 惊悸不能自控，活动后加重

E. 惊悸发生多与情绪有关，怔忡无精神因素亦可发生

【答案】E

7. 李某，女，40岁。平素胆小易惊，两日前因受惊吓而心悸不宁，坐卧不安，不寐多梦，恶闻声响，食少纳呆，苔薄白，脉细弦。其治疗

A. 安神定志丸

B. 归脾汤

C. 甘麦大枣汤

D. 黄连温胆汤

E. 酸枣仁汤

【答案】A

8. 胸痹的辨证，应首辨的要点是

A. 标本虚实

B. 病情轻重

C. 寒热虚实

D. 脉象变化

E. 外感内伤

【答案】A

9. 王某，女，56岁，有冠心病史4年。近日来心悸而痛，胸闷气短，动则更甚，自汗，面色㿔白，四肢欠温，舌质淡胖，边有齿痕，苔白腻，脉沉细迟。此病证诊断为

A. 心悸心血不足证

B. 胸痹气阴两虚证

C. 胸痹心肾阳虚证


D. 心悸心阳不振证

E. 胸痹痰浊闭阻证

【答案】C

10. 孙某，男，75岁。胸闷气短，心悸，动则加剧，神疲乏力，五心烦热，两颧潮红，或伴腰膝酸软，头晕耳鸣，舌暗红少苔，脉细数无力。此病证的证机概要是

A. 心气不足，血行无力，心脉瘀滞



- B. 气阴两虚，津液不足，心失所养
- C. 血行瘀滞，胸阳痹阻，心脉不畅
- D. 阴寒凝滞，心阳痹阻，心脉闭塞
- E. 心气不足，阴血亏耗，血行瘀滞

【答案】B

11. 不寐的治疗原则为

- A. 益气养血，补益肝肾
- B. 清热化痰，安神定志
- C. 补虚泻实，调整阴阳
- D. 先治其标，后治其本
- E. 补虚扶正，充髓养脑

【答案】C

12. 赵某，男，52岁。突然昏仆，不省人事，面色苍白，目合口张，鼻鼾息微，手撒肢冷，汗多，大小便自遗，肢体软瘫，舌痿，脉细弱或脉微欲绝。治疗应首选的方剂是

- A. 归脾汤
- B. 参附汤合生脉散加味
- C. 六味地黄丸
- D. 肾气丸
- E. 补阳还五汤

【答案】B

13. 李某，女，19岁。反复发作不愈，神疲乏力，心悸气短，失眠多梦，面色苍白，体瘦纳呆，大便溏薄，舌质淡，苔白腻，脉沉细而弱。其治疗应首选的方剂是

- A. 定痫丸
- B. 龙胆泻肝汤合涤痰汤加减
- C. 左归丸合天王补心丹加减
- D. 通窍活血汤
- E. 六君子汤合归脾汤

【答案】E

14. 下列选项中，不属于痴呆诊断依据的是

- A. 记忆力减退，理解力下降
- B. 性情孤僻，表情淡漠，语言重复
- C. 抽象思维能力下降
- D. 无理由地欣快，易于激动或暴怒
- E. 精神错乱，语无伦次，静而多喜

【答案】E

15. 下列各项，不属于《医宗必读》中治泻九法的是

- A. 清凉
- B. 疏利
- C. 解表
- D. 酸收
- E. 燥脾

【答案】C

16. 陆某，男，45岁。正值夏季盛暑之季，今日在户外劳动后两小时即出现泄泻腹痛，泻下

急迫，粪色黄褐，气味臭秽，肛门灼热，烦热口渴，小便短黄，舌质红，苔黄腻，脉滑数。其治疗应首选的方剂是

- A. 枳实导滞丸
- B. 白头翁汤
- C. 芍药汤
- D. 藿香正气散
- E. 葛根苓连汤

【答案】E

17. 陈某，男，75岁。反复便秘1年余，大便干，排出困难，小便清长，四肢不温，腹中冷痛，腰膝酸冷，舌淡苔白，脉沉迟。此病证的证机概要

- A. 阳气虚衰，阴寒凝结
- B. 脾虚胃寒，失于温养
- C. 阴寒内盛，凝滞胃肠
- D. 寒凝胃脘，阳气被遏，气机阻滞
- E. 脾肺气虚，传送无力

【答案】A

18. 杜某，女，46岁。1年来腹大胀满，形似蛙腹，朝宽暮急，面色苍黄，脘闷纳呆，肢冷浮肿，小便短少不利，舌淡胖，苔淡白，脉沉细无力。治疗此病证首选的方剂是

- A. 实脾饮
- B. 调营饮
- C. 茵陈术附汤
- D. 柴胡疏肝散合胃苓汤
- E. 附子理苓汤

【答案】E

19. 齐某，女，45岁。有癥积病史3年。现症：脘腹坚满，青筋显露，胁下癥结痛如针刺，面色晦暗薰黑，口干不欲饮水，舌质紫暗有紫斑，脉细涩。其证机概要

- A. 肝郁气滞，脾运不健，湿浊中阻
- B. 湿热壅盛，蕴结中焦，浊水内停
- C. 肝脾瘀结，络脉滞涩，水气停留
- D. 脾肾阳虚，不能温运，水湿内聚
- E. 肝肾阴虚，津液失布，水湿内停

【答案】C

20. 疟疾的基本病机是

- A. 暑湿伏于少阳
- B. 湿毒伏于阳明
- C. 疟邪伏于阳明
- D. 疟邪伏于少阳
- E. 暑湿伏于半表半里，邪正交争

【答案】D

21. 下列各项，不属水肿病理因素的是

- A. 风邪
- B. 水湿
- C. 痰浊
- D. 疮毒

E. 瘀血

【答案】C

22. 治疗水肿肾阳衰微证，首选的方剂是

- A. 实脾饮
- B. 五皮饮合胃苓汤
- C. 疏凿饮子
- D. 济生肾气丸合真武汤
- E. 麻黄连翘赤小豆汤

【答案】D

23. 下列关于石淋的各项叙述中，错误的是

- A. 小便排出砂石为主症
- B. 排尿时突然中断，尿道窘迫疼痛
- C. 突发一侧腰腹绞痛，疼痛难忍，痛引少腹
- D. 结石大，阻塞尿路者，用金钱草煎汤代茶
- E. 治疗以清热利湿、排石通淋为主

【答案】D

24. 治疗悬饮络气不和证，应首选的方剂是

- A. 香附旋覆花汤
- B. 柴枳半夏汤加减
- C. 椒目瓜蒌汤
- D. 己椒苈黄丸
- E. 苓桂术甘汤合小半夏加茯苓汤

【答案】A

25. 消渴的病变脏腑主要是

- A. 肝、脾、肾
- B. 脾、胃、肾
- C. 心、肝、肾
- D. 肺、脾、肾
- E. 肺、胃、肾

【答案】E

26. 治疗内伤发热血瘀发热证，首选的方剂是

- A. 复元活血汤
- B. 桂枝茯苓丸
- C. 天台乌药散
- D. 血府逐瘀汤
- E. 黄连温胆汤

【答案】D

27. 治疗颤证阳气虚衰证，应首选的方剂是

- A. 附子理中丸
- B. 龟鹿二仙膏
- C. 金匱肾气丸
- D. 人参养荣汤
- E. 地黄饮子

【答案】E

28. 下列各组经脉中，未按气血循行流注顺序排列的是

- A. 胆经、肝经、肺经
- B. 心经、小肠经、肾经
- C. 大肠经、胃经、脾经
- D. 肾经、心包经、三焦经
- E. 三焦经、胆经、肝经

【答案】B

29. 十二经脉的别络从本经分出的部位是

- A. 腕踝关节以下
- B. 肘膝关节以下
- C. 肘膝关节以上
- D. 肩关节、髀枢周围
- E. 四肢末端的指、趾部

【答案】B

30. 六阴经中，与原穴为同一腧穴的是

- A. 井穴
- B. 荣穴
- C. 输穴
- D. 经穴
- E. 合穴

【答案】C

31. 手阳明大肠经的络穴是

- A. 商阳
- B. 合谷
- C. 阳溪
- D. 偏历
- E. 温溜

【答案】D

32. 心的募穴是

- A. 极泉
- B. 膻中
- C. 巨阙
- D. 鸠尾
- E. 天池

【答案】C

33. 不属于本经母穴的是穴的是

- A. 太渊
- B. 复溜
- C. 解溪
- D. 侠溪
- E. 厉兑

【答案】E

34. 特定穴中，多用于治疗急性病的是

- A. 募穴



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

- B. 原穴
- C. 郄穴
- D. 络穴
- E. 输穴

【答案】C

35. 治疗周围性面瘫，应选择的头穴线是

- A. 顶额前斜线
- B. 顶颞后斜线
- C. 顶旁 2 线
- D. 颞前线
- E. 颞后线

【答案】D

36. 下列各项中，属于表里经配穴的是

- A. 咳嗽取尺泽、鱼际
- B. 感冒取列缺、合谷
- C. 膝痛取阳陵泉、阴陵泉
- D. 胃痛取中脘、内庭
- E. 痛经取地机、隐白

【答案】B

37. 治疗寒湿内盛型泄泻，除主穴外，应加用

- A. 内庭
- B. 中脘
- C. 神阙
- D. 太冲
- E. 脾俞

【答案】C

38. 针灸治疗痛经虚证应主取的是

- A. 带脉、中极、阴陵泉、十七椎
- B. 三阴交、足三里、次髎、十七椎
- C. 足三里、肝俞、脾俞、十七椎
- D. 三阴交、足三里、关元、十七椎
- E. 关元、三阴交、肾俞、十七椎

【答案】D

39. 针灸治疗遗尿，常选的耳穴是(助理医师不考)

- A. 肾、膀胱、尿道、皮质下、脑点
- B. 膀胱、三焦、脾、肺、肾
- C. 尿道、肾、三焦、肺、交感
- D. 内分泌、膀胱、脾、肺、三焦
- E. 肾、脾、肺、尿道、脑点

【答案】A

40. 治疗产后乳少，或见乳房胀满疼痛，或见乳房柔软无胀感，针灸治疗应选用

- A. 乳根、太冲、期门
- B. 乳根、膻中、少泽
- C. 肝俞、太冲、期门



英杰医学  
JINYINGJIE.COM

- D. 乳根、脾俞、足三里
- E. 中脘、天枢、期门

【答案】B

41. 下列有关扭伤的针灸辨证论治的叙述，不正确的是

- A. 扭伤多为关节伤筋，属经筋病
- B. 以受伤局部腧穴为主
- C. 可配合循经远取
- D. 可在扭伤部位上下循经邻近取穴
- E. 陈旧性损伤不宜用灸法

【答案】E

42. 治疗耳聋实证，应主选的是

- A. 足少阴、手太阳经穴
- B. 足少阳、手少阳经穴
- C. 足少阴、手少阴经穴
- D. 足少阳、手少阴经穴
- E. 足少阴、手少阳经穴

【答案】B

43. 治疗心绞痛的主穴是

- A. 内关、血海、太冲、膻中
- B. 内关、孙门、阴郄、膻中
- C. 外关、郄门、阴郄、膻中
- D. 外关、血海、太冲、神门
- E. 心俞、血海、膻中、神门

【答案】B

44. 属于手少阴心经起止穴的是

- A. 极泉、少府
- B. 中府、少冲
- C. 天池、中冲
- D. 极泉、少冲
- E. 中府、少泽

【答案】D


45. 不属于足少阳胆经的腧穴是

- A. 风市
- B. 风门
- C. 风池
- D. 足临泣
- E. 头临泣

【答案】B

46. 位于足趾，第4趾末节外侧，趾甲根角侧后方0.1寸的腧穴是

- A. 足窍阴
- B. 足临泣
- C. 侠溪
- D. 至阴
- E. 束骨



金英杰医学  
JINTONGJIE.COM



【答案】A

47. 循行“环阴器”的经脉是

- A. 足太阴脾经
- B. 足阳明胃经
- C. 足太阳膀胱经
- D. 足厥阴肝经
- E. 足少阳胆经

【答案】D

48. 期门穴位于胸部，前正中线旁开4寸

- A. 第3肋间隙
- B. 第4肋间隙
- C. 第5肋间隙
- D. 第6肋间隙
- E. 第7肋间隙

【答案】D

49. 下列各组腧穴中，相距不是1寸的是

- A. 中极、关元
- B. 下腕、中腕
- C. 中腕、上腕
- D. 内关、间使
- E. 外关、支沟

【答案】B

50. 夹脊穴位于脊柱区，后正中线旁开0.5寸

- A. 第1颈椎至第12胸椎棘突下两侧
- B. 第7颈椎至第5腰椎棘突下两侧
- C. 第1胸椎至第5腰椎棘突下两侧
- D. 第1胸椎至第12胸椎棘突下两侧
- E. 第1胸椎至骶管裂孔棘突下两侧

【答案】C

1. “危害公共卫生罪”是依据哪部法律定罪

- A. 《中华人民共和国宪法》
- B. 《中华人民共和国刑法》
- C. 《中华人民共和国传染病防治法》
- D. 《中华人民共和国食品安全法》
- E. 《中华人民共和国执业医师法》

【答案】B

2. 医师甲经执业医师注册，在某医疗机构执业。一年后，该医师受聘到另一预防机构执业，对其改变执业地点和类别的行为

- A. 预防机构允许即可
- B. 无须经过准予注册的卫生行政部门办理变更注册手续
- C. 应到准予注册的卫生行政部门办理变更注册手续



- D. 任何组织和个人无权干涉
- E. 只要其医术高明，就不受限制

【答案】C

3. 全社会应当尊重医师，医师依法履行职责时应受

- A. 全社会监督
- B. 法律保护
- C. 医疗机构的保护
- D. 卫生行政部门保护
- E. 群众支持

【答案】B

4. 下列的乙类传染病中依法采取甲类传染病的预防控制措施的是

- A. 病毒性肝炎
- B. 伤寒和副伤寒
- C. 淋病、梅毒
- D. 淋病、艾滋病
- E. 肺炭疽、传染性非典型性肺炎

【答案】E

5. 因紧急抢救未能及时填写病历的，有关义务人员应当据实补记，其时限是在抢救结束后

- A. 10 小时内
- B. 9 小时内
- C. 8 小时内
- D. 7 小时内
- E. 6 小时内

【答案】E

6. 下列各项，不属丙型肝炎传播途径的是

- A. 静脉注射
- B. 粪-口
- C. 输血
- D. 母婴传播
- E. 性接触

【答案】B

7. 下列慢性乙型肝炎治疗措施，最主要的是

- A. 一般治疗
- B. 对症治疗
- C. 抗病毒治疗
- D. 保肝治疗
- E. 抗肝纤维化治疗

【答案】C

8. 对人禽流感医学观察病例进行医学观察的时间是

- A. 3 日
- B. 7 日
- C. 10 日
- D. 2 周
- E. 1 个月



金英杰医学

JIN YING JIE .COM

【答案】B

9. 下列有关 AIDS 临床分期的叙述，正确的是

- A. 潜伏期、前驱期、艾滋病期、恢复期
- B. 急性感染期、慢性感染期、机会性感染期
- C. 急性感染期、无症状感染期、艾滋病期
- D. 窗口期、艾滋病前期、艾滋病期
- E. 急性感染期、慢性感染期

【答案】C

10. 下列有关乙脑抽搐的处理，错误的是

- A. 高热以物理降温为主
- B. 中枢性呼吸衰竭者可用呼吸兴奋剂
- C. 脑实质病变引起者首选巴比妥钠镇静剂
- D. 脑水肿以甘露醇脱水治疗为主
- E. 呼吸道分泌物堵塞者以吸痰、给氧为主

【答案】C

11. 下列有关流脑与其他化脓性脑膜炎鉴别的叙述，最有意义的是

- A. 发病季节
- B. 皮肤黏膜瘀斑瘀点
- C. 发病年龄
- D. 有无脑膜刺激征
- E. 血白细胞升高

【答案】B

12. 下列霍乱患者静脉补液的原则，不恰当的是

- A. 早期，快速，足量
- B. 先盐后糖
- C. 先快后慢
- D. 积极补钾
- E. 及时补碱

【答案】D

13. 下列关于霍乱的叙述，错误的是

- A. 是由霍乱弧菌引起的烈性肠道传染病
- B. 属于我国乙类传染病
- C. 起病急，腹泻剧烈，多伴呕吐
- D. 严重者可发生循环衰竭和急性肾衰竭
- E. 在亚、非、拉、美等地高发


【答案】B

14. 空洞性肺结核有巨大空洞时的听诊表现是

- A. 带金属调的空瓮音
- B. 支气管呼吸音
- C. 细湿啰音
- D. 呼吸音降低
- E. 局限性哮鸣音

【答案】A

15. 饮食不节可导致的病理变化是



金苗杰医学  
WWW.YINGJIE.COM

- A. 经络阻塞，气血凝滞
- B. 脾胃功能失调，湿热火毒内生
- C. 脏腑气血受损，阴阳失和
- D. 局部气血凝滞，郁久化热，热胜肉腐
- E. 阴液受损，咽喉干燥

【答案】B

16. 阳证的皮肤颜色主要是

- A. 红赤
- B. 晦暗
- C. 青紫
- D. 苍白
- E. 皮色不变

【答案】A

17. 痰肿的临床特点是

- A. 肿势高突，根盘收束
- B. 坚硬如石，皮色不变
- C. 肿势软如棉或硬如馒
- D. 皮紧内软，喜怒有变
- E. 皮肤漫肿，其色青紫

【答案】C

18. 中年男性患者，久居南方湿地，长期从事体力劳动，出现下肢静脉曲张 20 余年，5 年来自觉体力下降明显，肢体静脉曲张团明显增大，近 2 年来，下肢出现凹陷性水肿，并发左小腿胫皮肤反复破溃，周围皮肤色晦暗，自觉肢体沉胀明显，查舌淡、苔白、脉细涩。辨证选方宜

- A. 普济消毒饮加减
- B. 桃红四物汤加减
- C. 四妙丸合补阳还五汤加减
- D. 八珍汤
- E. 当归四逆汤

【答案】C

19. 有头疽初起的局部症状是

- A. 粟粒样脓头
- B. 肿硬如钉丁
- C. 漫肿而无头
- D. 腐烂如莲蓬
- E. 腐烂大于尺

【答案】A

20. 肉瘤可能发生于什么组织

- A. 胃黏膜
- B. 纤维组织
- C. 鳞状上皮
- D. 基底细胞
- E. 移行上皮

【答案】B



金英杰医学

JINYINGJIE.COM

21. 皮肤病的常见自觉症状不包括

- A. 瘙痒
- B. 疼痛
- C. 恶寒
- D. 灼热
- E. 麻木

【答案】C

22. 肛漏的主要症状是

- A. 便血，便秘，脱出
- B. 肛门肿物，剧痛，不出血
- C. 周期性疼痛，便血，便秘
- D. 肛周流脓，疼痛，瘙痒
- E. 肛门异物感，肿胀，疼痛

【答案】D

23. 患者，男，28岁，大便带血，血色鲜红，便后脱出，不能自行回纳，须用手送回，无疼痛，可能的诊断是

- A. 脱肛（I度脱垂）
- B. 脱肛（II度脱垂）
- C. 脱肛（III度脱垂）
- D. 内痔三期
- E. 内痔二期

【答案】D

24. 下列关于阴茎痰核的外治法，错误的是

- A. 理疗
- B. 阳和解凝膏外敷
- C. 局部注射氢化可的松
- D. 黑虎丹外敷
- E. 黑退消外敷

【答案】D

25. 老年男性病人，75岁，有高血压、冠心病病史，近5年肢体乏力、发凉呈进行性加重，并有怕冷表现，行走时下肢出现疼痛，稍事休息又可缓解。查体：双下肢肤色苍白，皮肤温度明显降低，趺阳脉搏动弱。舌淡、苔白腻、脉沉细。此患者主病、主证应为

- A. 股肿湿热下注证
- B. 臁疮气虚血瘀证
- C. 脱疽寒湿阻络证
- D. 青筋腿外伤瘀滞证
- E. 脱疽热毒伤阴证

【答案】C

26. 某男性患者，56岁，患冠心病多年，3小时前突然出现双下肢剧烈疼痛，行走困难，局部皮肤苍白，查双下肢股动脉搏动消失，双膝以下皮温低，肌力4级，中医诊断初步为

- A. 青筋腿
- B. 股肿
- C. 脱疽
- D. 臁疮

E. 血瘤

【答案】C

27. 老年消渴患者，病史近 20 年，10 年前出现足部麻木、发凉不适，近 5 年症状加重，下肢乏力，伴有足趾疼痛，三周前洗脚后出现左足破溃，近一周足部溃疡发展迅速，伴脓性分泌物，肉色灰暗，周围组织红肿，昼夜疼痛，查舌红、苔黄腻、脉弦数，辨证用方宜选

A. 黄芪鳖甲汤加减

B. 温胆汤加减

C. 四妙勇安汤加减

D. 八珍汤加减

E. 阳和汤加减

【答案】C

28. 持“阳非有余，阴常不足”学术观点的医家是

A. 薛己

B. 陈自明

C. 赵献可

D. 陈修园

E. 张介宾

【答案】E

29. 阴道的功能是

A. 排出月经的通道

B. 排恶露之出口

C. 防御外邪入侵的第一道门户

D. 阴阳交合的入口

E. 娩出胎儿的产门

【答案】A

30. 下列各项，不属于外热导致的妇科疾病是

A. 月经过多

B. 产后发热

C. 恶阻

D. 阴疮

E. 子淋

【答案】E

31. 下列各项，不属于肾阴亏虚，虚热内生，热伏冲任所导致的疾病是

A. 崩漏

B. 经间期出血

C. 胎漏

D. 月经过多

E. 胎动不安

【答案】D

32. 妊娠恶阻患者口腔有烂苹果味，其辨证是

A. 脾胃虚弱证

B. 肝胃不和证

C. 气阴两虚证

D. 肝经湿热证



金英杰医学

JINYINGJIE.COM

E. 脾虚痰浊证

【答案】C

33. 下列各项，属月经过少痰湿证临床表现的是

- A. 经色淡，质稀
- B. 胸闷呕恶
- C. 小腹空坠
- D. 面色青白
- E. 腰膝酸软

【答案】B

34. 治疗经期延长血瘀证，应首选的方剂是

- A. 失笑散加味
- B. 桂枝茯苓丸合失笑散加味
- C. 逐瘀止血汤合失笑散加味
- D. 桃红四物汤合失笑散加味
- E. 血府逐瘀汤合失笑散加味

【答案】D

35. 崩漏的常见病因是

- A. 脾虚、肾虚、肝郁、血热
- B. 湿热、肾虚、血热、血瘀
- C. 脾虚、肾虚、血热、血瘀
- D. 脾虚、肾虚、血热、气滞
- E. 气虚、肾虚、瘀热、血虚

【答案】C

36. 治疗经行感冒风寒证，应首选的方剂是

- A. 银翘散
- B. 桑菊饮
- C. 小柴胡汤
- D. 九味羌活汤
- E. 荆穗四物汤

【答案】E

37. 妊娠恶阻脾胃虚弱证的中医治法是

- A. 健脾养阴，和胃止呕
- B. 健脾祛湿，豁痰止呕
- C. 清肝和胃，降逆止呕
- D. 健脾益气，降逆止呕
- E. 健脾和胃，降逆止呕

【答案】E

38. 下列各项，不属胎漏、胎动不安肾虚证临床表现的是

- A. 妊娠期阴道少量下血，色淡暗
- B. 腰酸、腹痛、下坠
- C. 曾屡孕屡堕
- D. 小腹空坠而痛
- E. 头晕耳鸣，夜尿多

【答案】D



金英杰医学  
YINGJIE.COM

39. 堕胎、小产的治疗原则是

- A. 下胎益母
- B. 调养气血
- C. 治病与安胎并举
- D. 祛瘀下胎
- E. 活血祛瘀

【答案】A

40. 胎儿期易发生先天畸形的是

- A. 妊娠早期 4 周
- B. 妊娠早期 12 周
- C. 妊娠中期 10 周
- D. 妊娠中期 15 周
- E. 妊娠晚期 13 周

【答案】B

41. 按公式计算，6 岁小儿正常体重是

- A. 15kg
- B. 16kg
- C. 18kg
- D. 20kg
- E. 22kg

【答案】D

42. 随着小儿年龄增长，其脉搏、血压变化规律是

- A. 同步增加
- B. 同步减低
- C. 基本不变
- D. 脉搏增加、血压减低
- E. 脉搏减低、血压增加

【答案】E

43. 儿科发病率居于第二位的疾病是

- A. 肺系疾病
- B. 脾系疾病
- C. 心系疾病
- D. 肝系疾病
- E. 肾系疾病

【答案】B

44. 下列各项，不属于肺炎喘嗽主要表现的是

- A. 发热
- B. 咳嗽
- C. 痰壅
- D. 喘哮
- E. 肺部闻及中细湿啰音

【答案】D

45. 患儿，5 岁。发热咳嗽 7 天。咳喘持久，低热盗汗，手足心热，干咳少痰，面色潮红，口干便结，舌红少津，苔少，脉细数。其证候是



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



- A. 风寒闭肺
- B. 风热闭肺
- C. 阴虚肺热
- D. 肺脾气虚
- E. 毒热闭肺

【答案】C

46. 患儿，1岁。面色苍白，神疲乏力，发黄稀疏，消瘦4个月，诊断为“营养性缺铁性贫血”。选用铁剂治疗时，正确的停药时间为

- A. 血红蛋白开始升高时
- B. 血红蛋白恢复正常时
- C. 血红蛋白恢复至正常后2个月左右
- D. 血红蛋白恢复至正常后4个月左右
- E. 血红蛋白恢复至正常后6个月左右

【答案】C

47. 治疗病毒性心肌炎气阴亏虚证应首选方剂是

- A. 八珍汤
- B. 归脾汤
- C. 黄芪桂枝五物汤
- D. 荆防败毒散
- E. 炙甘草汤合生脉散

【答案】E

48. 下列各项，不属于小儿水肿水毒内闭证的主要症状的是

- A. 尿少尿闭
- B. 恶心呕吐
- C. 头晕头痛
- D. 嗜睡昏迷
- E. 烦躁抽搐

【答案】E

49. 治疗水痘邪伤肺卫证，应首选的方剂是

- A. 桑菊饮
- B. 银翘散
- C. 桑杏汤
- D. 宣毒发表汤
- E. 五味消毒饮

【答案】B

50. 患儿，4岁。病程迁延，紫癜反复出现，瘀点、瘀斑颜色淡紫，面色少华，神疲气短，食欲不振，头晕心悸，舌质淡，苔薄，脉细无力。治疗首选方剂是

- A. 小建中汤
- B. 大建中汤
- C. 八珍汤
- D. 归脾汤
- E. 四物汤

【答案】D



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM