

月度考试

- 1、(A2型题)患者,男性,55岁,尿毒症,肾移植术后。术后24小时内应给予患者的护理是
- A.三级护理
 - B.二级护理
 - C.一级护理
 - D.24小时监护护理
 - E.特别护理
- 2、(A2型题)患者,男性,70岁,肺癌晚期,昏迷。患者骶尾部皮肤有2cm×3cm压疮,水疱破溃,创面脓性分泌物较多。判断该患者压疮的临床分期是
- A.淤血红润期
 - B.炎性浸润期
 - C.淤血浸润期
 - D.浅度溃疡期
 - E.坏死溃疡期
- 3、(A2型题)患者,女性,54岁。发热待查入院,护士在观察其口腔时,发现一感染溃烂处,此时应选用的口腔护理溶液为
- A.0.9%生理盐水
 - B.0.1%醋酸溶液
 - C.0.02%氯己定溶液
 - D.1%~3%过氧化氢溶液
 - E.1%~4%碳酸氢钠溶液
- 4、(A2型题)患者,女性,34岁。今早主诉昨晚夜间多梦易醒。下午医生开出医嘱:地西洋9mgPC。当晚患者睡觉良好,该项医嘱未执行,值班护士应在次日上午,在该项医嘱栏内
- A.用红笔写上“失效”
 - B.用蓝笔写上“失效”
 - C.用红笔写上“未用”
 - D.用蓝笔写上“未用”
 - E.用红笔写上“作废”
- 5、(A2型题)患者,男性,76岁,需输液500ml,点滴系数为20的输液器,每分钟40滴,输液需用
- A.2.1h
 - B.2.5h
 - C.3.5h
 - D.4.2h
 - E.5.2h
- 6、(A2型题)患儿,1岁,因腹泻脱水入院。经补液,脱水基本纠正,但患儿精神萎靡、四肢无力、心音低钝、腹胀、腱反射减弱。应考虑为
- A.低血糖
 - B.低钙血症
 - C.低镁血症
 - D.低钾血症
 - E.酸中毒
- 7、(A2型题)十二指肠球部溃疡患者原疼痛节律消失,变为持续上腹痛,伴频繁呕吐隔夜食物。推断患者出现的并发症是
- A.溃疡出血
 - B.溃疡穿孔
 - C.多发性溃疡

- D.溃疡癌变
- E.幽门梗阻

8、(A2型题) 患儿, 7岁。腮腺明显肿大, 局部皮肤紧张发高, 张口、咀嚼时胀痛加剧, 诊断为流行性腮腺炎, 则对其腺肿的护理不正确的是

- A.可进食水果、果汁和补充维生素 C 片
- B.腺肿处可冷敷
- C.腺肿处可用醋调青黛散外敷
- D.用温盐水漱口, 保持口腔清洁
- E.宜进易消化和清淡的软食

9、(A2型题) 患者, 男, 35岁。既往体健, 近1年来发现 HBsAg 阳性, 但无任何症状, 肝功能正常。该患者目前病情所处状态是

- A.轻度慢性乙型肝炎
- B.中度慢性乙型肝炎
- C.重度慢性乙型肝炎
- D.无症状性 HBsAg 携带者
- E.急性无黄疸型乙型肝炎

10、(A2型题) 患者, 女性, 42岁, 3年前曾行“胃大部分切除术”。近一年常觉头晕、心悸, 体力下降, 入院诊断为缺铁性贫血。患者口服铁剂的过程中, 护士向其强调的护理要点应除外

- A.多进食动物铁
- B.可与维生素 C 同服
- C.餐后不要即刻饮茶
- D.如有消化道反应, 可与牛奶同服
- E.消化不良者可少食多餐

11、(A2型题) 患者, 男性, 29岁, 行甲状腺大部切除术。护士观察到患者术后发音时音调低钝, 但饮水时并不出现误咽、呛咳, 该护士怀疑术中可能损伤了患者的

- A.喉上神经内侧支
- B.喉头水肿
- C.喉上神经外侧支
- D.单侧喉返神经
- E.声带损伤

12、(A2型题) 患者, 男, 63岁。慢性胃炎, 幽门螺杆菌 (+)。需采用抗菌药物治疗。其用药原则是

- A.剂量宜大
- B.宜静脉给药
- C.联合用药
- D.宜长期使用
- E.药物种类不受限制

13、(A2型题) 患者, 男, 28岁。酗酒后突发剧烈上腹部绞痛 10h 伴呕吐、冷汗、面色苍白入院。查体: T39.1℃, P110 次/分, BP83/69mmHg。腹上区压痛及反跳痛阳性、腹肌紧张, Grey-Turner 征 (+)。实验室检查: 血清淀粉酶增高, 血钙降低。最可能的诊断是

- A.急性水肿型胰腺炎
- B.出血坏死型胰腺炎
- C.急性胃穿孔
- D.胃溃疡
- E.胆石症

14、(A1型题) 肺炎球菌型肺炎病人出现哪种表现时提示有并发症发生

- A.咳铁锈色痰
- B.胸痛

- C.寒战、高热
- D.体温退后复升
- E.口唇疱疹

- 15、(A2型题)患者,女性,35岁,甲状腺囊肿切除术后。护士为患者采取半坐卧位的主要目的是
- A.有利于伤口愈合
 - B.减轻颈部肿胀
 - C.减少伤口出血
 - D.减轻缝合处张力
 - E.利于呼吸
- 16、(A1型题)肺炎出现下列症状提示有中毒型肺炎可能的是
- A.体温 38.5~39.5℃
 - B.血压多在 80/60mmHg 以下
 - C.脉搏>90次/分
 - D.四肢温暖、潮湿
 - E.白细胞 10×10⁹/L
- 17、(A2型题)某支气管扩张患者,胸片提示病变位于左肺下叶外底段,体位引流选择的合适体位是
- A.取坐位或健侧卧位
 - B.左侧卧位
 - C.右侧卧位
 - D.左侧卧位,床脚抬高 30~50cm
 - E.右侧卧位,床脚抬高 30~50cm
- 18、(A1型题)符合慢性阻塞性肺气肿的体征是
- A.叩诊呈鼓音
 - B.单侧语颤减弱
 - C.单侧呼吸运动减弱
 - D.气管偏移
 - E.呼气时间延长
- 19、(A2型题)3岁幼儿,未患过水痘。现该幼儿班级里出现水痘患儿,该幼儿应在家隔离观察的时间是
- A.1周
 - B.2周
 - C.3周
 - D.4周
 - E.5周
- 20、(A2型题)患儿,4岁,高热3小时伴抽搐4次入院。患儿意识不清,初步诊断为中毒性痢疾,为了确诊须做的检查是
- A.粪便培养
 - B.血常规
 - C.肛门拭子检查便常规
 - D.头颅CT
 - E.结肠镜检查
- 21、(A2型题)某新生儿出生时四肢青紫,四肢伸展,呼吸不规则,心率80次/分,喉反射消失。Apgar评分为
- A.6分
 - B.5分
 - C.4分
 - D.3分
 - E.2分

22、(A2型题)患者,男性,27岁,从事园林工作,给果树喷药时不慎将农药污染衣服,农药通过接触皮肤黏膜吸收而发生中毒。此时应立即

- A.脱离现场、脱去污染衣服
- B.肥皂水清洗皮肤
- C.用热水擦洗皮肤
- D.酒精清洗皮肤
- E.现场抢救

23、(A2型题)患者,男性,55岁,诊断为 Colles 骨折。请问该患者可出现的典型畸形是

- A.缩短畸形
- B.局部肿胀
- C.正面看呈银叉样
- D.侧面看呈鹰爪样
- E.正面看呈枪刺刀样

24、(A2型题)患者,女性,23岁。外伤后出现肘部关节肿胀,可以帮助鉴别桡骨髁上骨折和肘关节脱位的表现是

- A.肘部剧烈疼痛
- B.手臂功能障碍
- C.肘后三角关系失常
- D.是否触摸到尺骨鹰嘴
- E.跌倒后因手掌撑地而受伤

25、(A2型题)患者,女,26岁。尿频、尿急、尿痛8天,以“急性尿路感染”在门诊应用抗生素治疗,进行尿细菌培养。检查前,应嘱患者停用抗生素

- A.1天
- B.2天
- C.3天
- D.4天
- E.5天

26、(A2型题)患者阴道分泌物呈大量泡沫状,灰黄色,质稀薄伴腥臭味,最可能为

- A.老年性阴道炎
- B.念珠菌性阴道炎
- C.外阴炎
- D.滴虫性阴道炎
- E.宫颈糜烂

27、(A2型题)患者,女,29岁,单位妇科普查时确诊“子宫颈II度糜烂”,护士应告知她疗效较好、疗程最短的治疗方法是

- A.宫颈上药
- B.阴道冲洗
- C.物理疗法
- D.手术治疗
- E.局部用硝酸银

28、(A2型题)患者,女,产后4周体温升高,左侧乳房疼痛,局部红肿,有波动感,最主要的处理措施是

- A.全身应用抗生素
- B.托起患侧乳房
- C.39%硫酸镁溶液湿敷
- D.局部物理疗法
- E.及时切开引流

- 29、(A1型题)胰腺癌的临床表现哪项不确切
- A.上腹痛是首发症状
 - B.疼痛夜间较白天明显
 - C.胰头癌主要体征是黄疸
 - D.胰体癌主要症状是腹痛
 - E.晚期癌浸润神经丛，病人疼痛常取半坐位
- 30、(A2型题)李先生，54岁，食管癌手术后第三天拔除胃管后口服流质饮食，第五天体温升高到39℃，脉速、胸痛、呼吸困难，胸透发现手术侧胸腔积液，应首先考虑并发了
- A.肺炎
 - B.胸膜炎
 - C.癌肿播散
 - D.切口感染
 - E.食管吻合口瘘
- 31、(A2型题)患者，男性，45岁。以急性白血病入院化疗，化疗后一周，复查血象：血小板计数 $15 \times 10^9/L$ 。此时最主要的护理措施是预防和观察
- A.口腔溃疡
 - B.脑出血
 - C.尿道出血
 - D.尿酸性肾病
 - E.药物不良反应
- 32、(A2型题)一妇女近年来月经量多，经期长，白带增多，感头晕乏力，腰背酸痛，疑为黏膜下肌瘤，最主要的依据应当是
- A.月经改变
 - B.贫血
 - C.腰背酸痛
 - D.窥器检查宫口有瘤体
 - E.白带增多
- 33、(A2型题)患者，女性，30岁，甲状腺手术后声音嘶哑，是下列哪项损伤引起
- A.甲状旁腺误切
 - B.喉上神经损伤
 - C.甲状腺切除过多
 - D.气管误伤
 - E.喉返神经损伤
- 34、(A1型题)磺脲类降糖药主要适合于哪种患者
- A.饮食控制无效的II型糖尿病
 - B.I型糖尿病伴眼底病变
 - C.糖尿病酮症酸中毒
 - D.I型糖尿病
 - E.肥胖且饮食控制无效的糖尿病
- 35、(A2型题)患儿刘某因被确诊为流脑转入传染病房，其原住的病房需要用食醋空气消毒，病房高4m，宽4m，长5m，食醋用量是
- A.50ml
 - B.100ml
 - C.200ml
 - D.300ml
 - E.400ml
- 36、(A1型题)发生艾滋病职业暴露时，局部的处理措施中不正确的是
- A.皮肤污染时，用肥皂液和流动水清洗污染局部
 - B.黏膜污染时，用生理盐水反复冲洗

- C.损伤严重流血不止时，应立即包扎止血，稍后再冲洗消毒
- D.冲洗后的伤口，用 75%乙醇或 0.5%碘伏进行消毒
- E.发生破损时，先从近心端向远心端轻轻挤压，尽可能挤出伤处的血液

37、(A1 型题) 下列脉搏与病情不符的是

- A.交替脉见于左心衰竭患者
- B.丝脉见于休克患者
- C.缓脉见于高钾血症者
- D.奇脉见于心包积液患者
- E.间歇脉见于房颤患者

38、(A1 型题) 剧毒药及麻醉药的最主要的保管原则是

- A.药名应用中、外文对照
- B.应加锁，专人管理并认真交班
- C.装密封瓶中保存，放于阴凉处
- D.药瓶上应有明显标签，用黑色边
- E.与内服药、外用药分别放置

39、(A1 型题) 下列静脉补钾原则中错误的是

- A.成人静脉滴入不超过 60 滴/分
- B.氯化钾浓度一般不超过 0.3%
- C.尿量要在 40mL/h 以上
- D.滴速随意调节
- E.严重缺钾者，每天补钾不宜超过 6~8g/d

40、(A2 型题) 患者男，40 岁。汉族，教师。以“心慌、气短、乏力”为主诉入院。护士入院评估：P120 次/分，BP70/46mmHg，脉搏细弱；口唇发绀，呼吸急促，患者自述便秘。此外还收集了患者的既往病史、家族关系、排泄等资料。以下属于患者主观资料的是

- A.P120 次/分、心慌、气短
- B.心慌、气短、脉搏细弱
- C.P120 次/分，BP70/46mmHg、脉搏细弱
- D.心慌、疲乏、口唇发绀
- E.心慌、气短、乏力

41、(A2 型题) 患者，男性，30 岁。因腹泻、腹痛拟行乙状结肠镜检查，护士应指导患者采取的体位是

- A.右侧卧位
- B.左侧卧位
- C.膝胸卧位
- D.截石位
- E.蹲位

42、(A2 型题) 患者，男，36 岁。因肺炎收入院，持续发热 2 日，每日口腔温度波动范围在 39.3~40.0℃，并伴有脉搏、呼吸明显增快，该患者的热型属于

- A.间歇热
- B.弛张热
- C.波浪热
- D.稽留热
- E.不规则热

43、(A2 型题) 患者刘某，女，56 岁。因持续性上腹疼痛被诊断为慢性胰腺炎，患者宜选择的饮食种类是

- A.高蛋白饮食
- B.低蛋白饮食
- C.低脂肪饮食

- D.低盐饮食
- E.高纤维饮食

44、(A2型题)李先生因患慢性胆囊炎,向护士复述胆囊造影检查前饮食方法,其中应予以纠正的是

- A.检查前一日中午进高脂肪餐
- B.检查前一日晚餐进无脂低蛋白餐
- C.检查当日早晨应清淡饮食
- D.检查前一日晚餐后口服造影剂及禁食
- E.首次摄片胆囊显影良好可进高脂肪餐

45、(A2型题)某肺炎患者,男性,74岁。在输液时突发呼吸困难,咳嗽、咳粉红色泡沫样痰,听诊肺部布满湿啰音。出现上述症状,我们应该立即采取的措施不包括

- A.立即停止输液并通知医生,进行紧急处理
- B.给予低流量氧气吸入
- C.病情允许时可使病人端坐,双腿下垂
- D.遵医嘱给予镇静剂,平喘、强心、利尿药物
- E.必要时进行四肢轮流结扎,阻断静脉血流

46、(A2型题)患者男性,45岁。初步诊断为“糖尿病”,需做尿糖定量检查,为保持尿液化学成分不变,尿标本中需加入

- A.浓盐酸
- B.甲苯
- C.甲醛
- D.草酸
- E.乙醇

47、(A2型题)患者,女性,52岁。得知自己的确诊为食管癌后,表现为沉默,食欲下降,夜间入睡困难,易怒。护理工作中最应重视的问题是

- A.增加巡视的频次
- B.鼓励患者自我表达,宣泄情绪
- C.可利用治疗效果好的患者现身说法,正面宣教
- D.防自杀、防伤人、防出走
- E.向家属询问患者的心理情况

48、(A3/A4型选择题)护士插入胃管后检查胃管是否在胃内,其中错误的方法是

- A.注入少量空气,同时听胃部有气过水声
- B.抽吸出液体用石蕊试纸测试呈红色
- C.注入少量温开水,同时听胃部有水泡声
- D.胃管末端放入水杯内无气体逸出
- E.抽吸出胃液

49、(A2型题)患者,女,65岁。高血压病史20余年,长期服用硝苯地平降压,可出现的症状为

- A.干咳
- B.心动过缓
- C.支气管哮喘
- D.低血钾
- E.胫前水肿

50、(A1型题)心电图P-R间期的测量是

- A.从P波起始到QRS波的终末
- B.从P波终末到QRS波的开始
- C.从P波起始到QRS波的开始
- D.从P波终末到QRS波的终末
- E.从P波起始到R波的开始

- 51、(A2型题)患者,男,70岁。因“慢性咳嗽、咳痰20年,进行性呼吸困难3年,症状加重1周”,拟诊为“慢性阻塞性肺疾病、肺心病”收入院。提示患者并发右心衰竭的体征是
- A.半坐卧位
 - B.肝颈静脉回流征阳性
 - C.双肺弥漫性湿啰音
 - D.眼睑浮肿
 - E.口唇发绀
- 52、(A2型题)患儿,3岁。出生4个月后开始出现发绀,发育比同龄儿童差,平时经常感冒。查体:杵状指,口唇明显发绀;心前区2~4肋间可闻及收缩期喷射样杂音。X线示右心室增大。最可能的临床诊断是
- A.房间隔缺损
 - B.室间隔缺损
 - C.动脉导管未闭
 - D.法洛四联症
 - E.肺动脉狭窄
- 53、(A1型题)心肺复苏中,“C”代表的是
- A.人工呼吸
 - B.判断意识与反应
 - C.摆好复苏体位
 - D.胸外按压
 - E.气道开放
- 54、(A1型题)风湿性心瓣膜病二尖瓣狭窄患者易并发脑栓塞,其原因为
- A.肺静脉淤血
 - B.下肢静脉淤血
 - C.肺动脉淤血
 - D.血管本身病变
 - E.房颤易致栓子脱落
- 55、(A3/A4型选择题)同理,法洛四联症患者缺氧时,应采取的适宜体位为
- A.俯卧位
 - B.平卧位
 - C.半坐卧位
 - D.膝胸卧位
 - E.侧卧位
- 56、(A1型题)急性心肌梗死的病理改变主要是由于
- A.冠状动脉狭窄
 - B.冠状动脉堵塞
 - C.主动脉供血不足
 - D.冠状动脉痉挛
 - E.肺动脉供血不足
- 57、(A2型题)患者,男性,56岁。突然心悸、气促,咳粉红色泡沫痰,病人被迫端坐位,大汗淋漓,护士应首先准备哪组药物
- A.西地兰,硝酸甘油,异丙肾上腺素
 - B.硝普钠,西地兰,呋塞米
 - C.毒毛花苷K,硝普钠,普萘洛尔
 - D.胍乙啶,酚妥拉明,西地兰
 - E.硝酸甘油,西地兰,多巴胺
- 58、(A1型题)听诊时于心尖部闻及舒张期隆隆样杂音为
- A.二尖瓣狭窄

- B.二尖瓣关闭不全
- C.主动脉瓣狭窄
- D.主动脉瓣关闭不全
- E.肺动脉瓣关闭不全

59、(A1型题)风湿性心脏病最常见的并发症为

- A.二尖瓣返流
- B.充血性心力衰竭
- C.房颤
- D.室性心动过速
- E.主动脉血管瘤

60、(A1型题)急性心包炎早期表现中具有诊断价值的是

- A.发热
- B.血压下降,脉压减小
- C.心包摩擦音
- D.呼吸深大
- E.胸痛

61、(A1型题)X线检查心影呈靴形提示

- A.心包积液
- B.二尖瓣狭窄
- C.二尖瓣关闭不全
- D.主动脉瓣狭窄
- E.主动脉瓣关闭不全

62、(A1型题)以下哪种药物抑制胃酸分泌作用最强

- A.奥美拉唑
- B.法莫替丁
- C.氢氧化铝镁
- D.枸橼酸铋钾
- E.硫糖铝

63、(A1型题)2份生理盐水、3份10%葡萄糖、1份1.4%碳酸氢钠所组成的溶液的张力是

- A.1/4张
- B.1/3张
- C.1/2张
- D.2/3张
- E.1/6张

64、(A1型题)肠套叠患儿大便性状为

- A.黏液血便
- B.脓血便
- C.果酱样血便
- D.柏油便
- E.白陶土色便

65、(A1型题)毕II式胃大部切除术,与残胃吻合的器官是

- A.空肠近端
- B.空肠远端
- C.十二指肠
- D.回肠远端
- E.结肠远端

66、(A2型题)患者,女,56岁。胃窦部多发溃疡,今日患者在硬膜外麻醉下行胃大部切除术,术后送返病房。病区护士在术后的12小时内,应特别注意观察

- A.吻合口瘘
- B.吻合口梗阻
- C.十二指肠残端破裂
- D.腹腔内出血和引流情况
- E.有无肛门排气

67、(A2型题)患者,女,49岁。胃溃疡行胃大部切除术。术后第10天,护士发现患者进午餐后半小时出现头晕、心悸、出汗,伴恶心、呕吐,护士立即为患者采取平卧位,数分钟后症状缓解,该护士考虑患者出现了

- A.吻合口水肿
- B.吻合口梗阻
- C.倾倒综合征
- D.吻合口破裂
- E.远侧空肠段梗阻

68、(A2型题)患者,男,47岁,肝硬化6年,入院一周。2天前患者突然神志恍惚、举止反常、言语不清。判断患者可能出现的情况是

- A.脑栓塞
- B.尿毒症
- C.脑出血
- D.高血压脑病
- E.肝性脑病

69、(A2型题)患者,男,50岁。肝硬化病史5年。1小时前突然呕血约600mL,昏倒,急送医院。体检:血压70/50mmHg,脉搏125次/分,此时最有效的止血措施是

- A.冷盐水冲洗
- B.立即补充血容量
- C.三腔二囊管压迫止血
- D.禁食、胃肠减压
- E.服用血管加压素

70、(A2型题)患者,女,43岁。患胆石症6年,2天前因腹痛、寒战、高热和黄疸发作,门诊用抗生素输液治疗无效入院,来院时发现患者神志不清,血压75/50mmHg,考虑

- A.急性坏疽性胆囊炎
- B.急性梗阻性化脓性胆管炎
- C.慢性胆囊炎急性发作
- D.胆道蛔虫伴感染
- E.胆囊穿孔

71、(A3/A4型选择题)该患儿的脱水程度属于

- A.轻度
- B.介于轻度和中度之间
- C.中度
- D.重度
- E.极重度

72、(A3/A4型选择题)为该患者口腔护理时,最适宜的漱口液是

- A.生理盐水
- B.0.1%醋酸
- C.朵贝尔液
- D.0.02%呋喃西林
- E.2%碳酸氢钠

73、(A2型题) 患儿,男,3岁。1周来发热、咳嗽,近2天加重,曾用青霉素治疗3天无效。查体:体温40℃,双肺可闻及湿啰音,呼吸音降低,胸片可见双肺大片状阴影。该患儿应考虑为

- A.呼吸道合胞病毒肺炎
- B.肺炎支原体肺炎
- C.大叶性肺炎
- D.金黄色葡萄球菌肺炎
- E.腺病毒肺炎

74、(A1型题) 为一胸腔闭式引流的患者拔管,拔管时应嘱患者

- A.深吸气后屏气
- B.深呼气后屏气
- C.正常呼吸
- D.浅呼气后屏气
- E.浅吸气后屏气

75、(A1型题) 小儿鼻咽炎时易并发中耳炎的原因下列不正确的是

- A.咽鼓管较宽
- B.咽鼓管较短
- C.咽鼓管较直
- D.咽鼓管呈水平位
- E.咽鼓管血管丰富

76、(A2型题) 患者,男性,28岁。查体:气管向左侧移位,右侧胸廓饱满,触诊语颤减弱,叩诊浊音,你考虑最可能的原因是

- A.肺气肿
- B.气胸
- C.胸腔积液
- D.肺炎
- E.肺脓肿

77、(A2型题) 患者,男,38岁。患大叶性肺炎。病人出现发热、呼吸困难、咳嗽、咳痰,今日查房时在患侧听到胸膜摩擦音。是因为

- A.肺泡炎症
- B.呼吸动作太快
- C.胸膜受累发炎
- D.支气管发炎
- E.胸腔积液

78、(A2型题) 患者,男,28岁。胸外伤后出现呼吸困难、发绀、脉快,体检时见胸壁有一约3cm长伤口,呼吸时伤口处有气体进出,伤侧呼吸音消失。首先考虑

- A.闭合性气胸
- B.开放性气胸
- C.张力性气胸
- D.损伤性血胸
- E.机化性血胸

79、(A1型题) 糖皮质激素用于治疗哮喘的主要作用是

- A.降低痰液黏稠度
- B.抑制气道炎症反应
- C.舒张支气管平滑肌
- D.抑制咳嗽中枢
- E.兴奋呼吸中枢

80、(A1型题) 无并发症麻疹患儿具有传染性的时段为

- A.出疹前10天至出疹后5天

- B.出疹前 5 天至出疹后 5 天
- C.出疹前 10 天至出疹后 10 天
- D.出疹前 5 天至出疹后 10 天
- E.出疹前 5 天至出疹后 10 天

81、(A2 型题) 患儿, 女性, 7 岁。约半小时前误服农药, 被急送入院, 现意识清醒, 能准确回答问题。护士首选的处理方法是

- A.灌肠
- B.催吐
- C.注洗器洗胃
- D.电动吸引器洗胃
- E.导泻

82、(A2 型题) 患者, 女性, 32 岁。急性有机磷中毒, 使用阿托品治疗, 出现以下那种情况时应减少阿托品剂量

- A.口干
- B.心率加快
- C.颜面潮红
- D.瞳孔较前扩大
- E.以上都是

83、(A1 型题) 下列那类镇静催眠药可用氟马西尼解毒

- A.巴比妥类
- B.苯二氮类
- C.水合氯醛
- D.非巴比妥非苯二氮类
- E.吩噻嗪类

84、(A2 型题) 患者, 男性, 65 岁。饮酒史 30 余年, 每天饮酒约半斤, 近日出现眼球震颤、步态不稳、精神错乱, 显示无欲状态, 考虑酒精慢性中毒的

- A.Wernicke 脑病
- B.Korsakoff 综合征
- C.周围神经麻痹
- D.震颤谵妄反应
- E.酒精性幻觉反应

85、(A2 型题) 患者, 男性, 41 岁。炎热夏天, 天气闷热, 在外面连续工作数小时, 由于大量出汗导致失水、失钠等引起的周围循环灌注不足, 体温基本正常, 该患者发生了

- A.热痉挛
- B.热衰竭
- C.热射病
- D.日射病
- E.中暑痉挛

86、(A2 型题) 患者, 男性, 39 岁。深 II 度烧伤后 4 周, 伤口无感染。护士判断该患者此时的烧伤临床分期属于

- A.急性体液渗出期
- B.休克期
- C.感染期
- D.修复期
- E.肉芽增生期

87、(A2 型题) 患者, 女性, 41 岁。开水烫伤 1 小时。检查见面、胸腹部、右上肢、臀部 II 度及 III 度烫伤, 左下肢三个手掌大小面积 II 度烫伤。该患者烧伤面积约为

- A.43%
- B.33%

- C.34%
- D.35%
- E.47%

- 88、(A2型题)患者,女性,32岁。踏青时不慎被毒蛇咬伤,下列急救措施哪项是不正确的
- A.局部热敷
 - B.患肢制动并下垂
 - C.自上而下挤压伤口
 - D.锐器挑开咬痕处排毒
 - E.伤口近心端环形缚扎
- 89、(A2型题)患者,男性,46岁。因破伤风抽搐发作而牙关紧闭,引起该患者发病的毒素是
- A.链激素
 - B.杀白细胞素
 - C.痉挛毒素
 - D.溶血毒素
 - E.血浆凝固酶
- 90、(A2型题)患者,女性,65岁。因外伤造成左侧胸部4~7肋骨多处骨折,呼吸时患处可能出现
- A.呼气时外凸,吸气时正常
 - B.吸气和呼气,时均外凸
 - C.吸气时外凸,呼气时内陷
 - D.吸气和呼气时均内陷
 - E.吸气时内陷,呼气时外凸
- 91、(A2型题)患者,女性,32岁。孕2产1,2年前分娩后无人照顾,产后2周即开始参加体力劳动,最近半年感腰背酸痛并有下坠感,清洗外阴可触及一肿物。入院查体:宫颈和部分宫体已脱出阴道口。该患者最可能的诊断是
- A.子宫脱垂I度轻型
 - B.子宫脱垂I度重型
 - C.子宫脱垂II度轻型
 - D.子宫脱垂II度重型
 - E.子宫脱垂III度
- 92、(A1型题)急性型再生障碍性贫血早期最突出的表现是
- A.出血和感染
 - B.进行性贫血
 - C.进行性消瘦
 - D.肝、脾、淋巴结大
 - E.黄疸
- 93、(A1型选择题)该患者出血的原因是
- A.血小板减少
 - B.血管损伤
 - C.纤维蛋白合成障碍
 - D.血小板减少性紫癜
 - E.发生了弥散性血管内凝血(DIC)
- 94、(A1型题)甲状腺性甲亢中最多见的是
- A.多结节性毒性甲状腺肿
 - B.Graves病
 - C.毒性腺瘤
 - D.甲状腺癌
 - E.碘甲亢

95、(A1型题)患者,女性,18岁。因双侧甲状腺肿大住院。甲状腺扫描可见弥漫性甲状腺肿,均匀分布。医生诊断为单纯性甲状腺肿,支持诊断的实验室检查结果是

- A. T₃、T₄升高, TSH降低
- B. T₃、T₄降低, TSH升高
- C. T₃、T₄升高, TSH正常
- D. T₃、T₄降低, TSH正常
- E. T₃、T₄正常, TSH正常

96、(A1型题)糖尿病的基础治疗包括

- A. 饮食治疗和合适的体育锻炼
- B. 口服降糖药物治疗
- C. 胰岛素治疗
- D. 胰腺移植
- E. 胰岛细胞移植

97、(A2型题)患者,女,45岁。确诊糖尿病经治疗后出院,需长期应用诺和笔进行短效胰岛素治疗,健康教育护士在教育中下列哪项不正确

- A. 注射时不在有炎症、化脓、硬结处进针
- B. 注射部位选脐周、大腿外侧
- C. 皮肤要严格消毒
- D. 每日餐前15~30分钟注射
- E. 针头与皮肤成30°~40°角

98、(A3/A4型选择题)患者治疗原则中一般治疗措施描述不正确的是

- A. 控制饮食总热量,适当运动,防止超重、肥胖
- B. 控制饮酒和高嘌呤饮食
- C. 避免诱因和积极治疗相关疾病
- D. 多饮水,每天2000mL以上
- E. 用抑制尿酸排泄的药物

99、(A2型题)患者,女性,24岁。工作中不慎发生头皮撕脱伤,转运过程中不正确的是

- A. 加压包扎止血
- B. 扩充血容量
- C. 伤口用无菌纱布覆盖
- D. 撕脱的头皮不做任何处理
- E. 直接放入带有冰块的容器保存

100、(A2型题)患者,女性,41岁。头部外伤后昏迷约20分钟,苏醒2小时候再次昏迷,首先考虑

- A. 急性硬脑膜外血肿
- B. 急性硬脑膜下血肿
- C. 急性脑内血肿
- D. 急性帽状腱膜下血肿
- E. 颅骨骨膜下血肿

101、(A2型题)患者,女性,42岁。近日在刷牙时出现左侧面部突然剧痛,入院诊断为三叉神经痛。护士给患者介绍关于三叉神经痛时,下列描述不正确的是

- A. 多发于中老年
- B. 多为单侧发病
- C. 特征表现为骤然发生的闪电式剧烈面部疼痛
- D. 神经系统检查无阳性体征
- E. 治疗首选药物为泼尼松

102、(A1型题)帕金森病的典型症状是

- A. 肌强直
- B. 运动减少

- C.言语障碍
- D.静止性震颤
- E.日常活动受限

103、(A3/A4 型选择题) 下列护理该患儿的措施不正确的是

- A.体温 $>38.5^{\circ}\text{C}$ 时给予物理降温
- B.病情稳定后, 及早进行肢体功能锻炼
- C.对昏迷或吞咽困难的患儿, 应尽早给予鼻饲
- D.患儿取头低足高位
- E.密切观察瞳孔及呼吸的变化

104、(A1 型题) 放置宫内节育器的时间是在月经干净后

- A.11 天
- B.10 天
- C.9 天
- D.8 天
- E.7 天

105、(A1 型题) “未病先防”的特点, 应除外

- A.顺应自然
- B.锻炼身体
- C.调节饮食
- D.人工免疫
- E.早期诊治

106、(A1 型题) 因故被吊销护士执业证书后, 不得申请执业注册的年限是

- A.10 年
- B.7 年
- C.5 年
- D.2 年
- E.1 年

107、(A2 型题) 王某, 女, 护理学专业大专学历。2012 年通过护士执业资格考试。她申请护士执业注册的时间最迟不能超过

- A.2012 年
- B.2013 年
- C.2014 年
- D.2015 年
- E.2016 年

108、(A1 型题) 患者, 女性, 34 岁。因“不孕症”就诊。行各项检查后, 发现患者患有梅毒。门诊护士将此信息告知了科室的其他护士和其他来就诊的患者。该护士的行为属于

- A.侵犯了患者的公平权
- B.侵犯患者的隐私权
- C.侵犯患者的同意权
- D.侵犯患者的生命健康权
- E.侵犯患者风险知情权

109、(A2 型题) 患者女, 28 岁。因消化性溃疡入院治疗, 住院期间得知女儿生病, 随即出院照顾女儿, 该患者的行为属于

- A.角色行为的冲突
- B.角色行为的消退
- C.角色行为的强化
- D.角色行为的异常
- E.角色行为的缺如

110、(A2 型题) 患者男, 48 岁。因急性胃肠炎收治入院, 患者经治疗后症状缓解, 精神状态良好, 遂叫来朋友在病房斗地主, 吵闹声严重影响病房其他患者的休息, 护士予以劝诫, 患者以“病人就是上帝”为由拒绝听从。患者该行为违反了哪项义务

- A. 积极配合医疗护理的义务
- B. 自觉遵守医院规章制度的义务
- C. 自觉维护医院秩序的义务
- D. 保持和恢复健康的义务
- E. 保护医院财产不被损坏的义务

111、(A1 型题) 关于脑室引流的护理, 下列叙述错误的是

- A. 引流里每日不超过 500 mL
- B. 如引流不畅, 不可用盐水冲洗
- C. 拔除引流管前先做 CT, 夹管 1~2 天
- D. 妥善固定, 引流管开口低于侧脑室平面
- E. 夹管期间注意观察病人神志、瞳孔、生命体征

112、(A2 型题) 患者女, 50 岁。因心力衰竭入院。诊断为心功能 II 级。患者应表现为

- A. 不能从事任何体力活动
- B. 日常活动后出现呼吸困难, 休息后缓解
- C. 轻微活动后出现呼吸困难, 休息后不易缓解
- D. 一般活动不引起疲乏, 呼吸困难
- E. 休息时即有呼吸困难

113、(A2 型题) 患者, 女, 41 岁。患有肥厚型心肌病, 因胸痛 1 小时急诊入院, 首要的护理措施是

- A. 预防呼吸道感染
- B. 建立静脉通路
- C. 给予高热里饮食
- D. 给予 1~2L/min 吸氧
- E. 立即停止活动, 卧床休息

114、(A2 型题) 患者李某, 70 岁, 患有右心衰。其出现心源性水肿时, 实施的护理措施, 下列哪项不妥

- A. 保证身心休息, 减轻心脏负荷
- B. 限制钠盐的摄入
- C. 保持皮肤清洁、干燥, 防止破损和感染
- D. 使用强效排钾利尿剂后应注意观察血钠的变化
- E. 控制输液速度, 不可太快

115、(A2 型题) 患者, 女性, 50 岁。既往高血压病史 10 年, 近日出现劳力性呼吸困难, 经休息后缓解, 经诊断为心力衰竭, 首先出现

- A. 左心室衰竭
- B. 左心房衰竭
- C. 右心室衰竭
- D. 右心房衰竭
- E. 全心衰竭

116、(A1 型题) 护士夜间巡视病房发现一高血压病人突然憋醒, 被迫坐起, 胸闷、咳嗽, 烦躁不安, 听诊两肺满布湿啰音。护理此病人应迅速采取的护理措施是

- A. 安慰病人稳定情绪
- B. 补充水分稀释痰液
- C. 置病人两腿下垂坐位
- D. 给予氧气吸入
- E. 观察血压变化

117、(A2 型题) 男性, 28 岁。自诉突然心慌、胸闷, 听诊心率 200 次/分, 心律齐, 血压正常。若用心电监护该病人时, 荧光屏上突然出现完全不规则的大波浪状曲线, 且 QRS 波与 T 波消失。考虑下列哪项处理措施不妥

- A. 严密观察病情变化
- B. 可给予心内注射利多卡因
- C. 可施行同步电除颤
- D. 可施行非同步电除颤
- E. 立即做胸外心脏按压和口对口人工呼吸

118、(A2 型题) 患者, 女, 25 岁。上消化道出血入院 2 天, 已行三腔管止血, 今晨护士接班时, 注意到患者出血已停止, 接下来可采取的处理措施是

- A. 放气数分钟再注气加压
- B. 可进行鼻饲
- C. 遵医嘱拔管
- D. 放气留观 24 小时
- E. 拔出三腔二囊管, 改为静脉点滴奥美拉唑

119、(A2 型题) 患者, 女性, 62 岁。今晨起床穿衣时发现右侧半身活动不灵活来诊。医生诊断为脑血栓形成, 决定给予溶栓治疗。护士应知道脑血栓形成患者, 最佳溶栓时机是

- A. 病后 6 小时
- B. 病后 10 小时
- C. 病后 12 小时
- D. 病后 24 小时
- E. 病后 48 小时

120、(A1 型选择题) 中医饮食上的“五味”是 (2015)

- A. 酸、苦、甘、辛、咸
- B. 酸、苦、甘、甜、涩
- C. 酸、苦、麻、辣、甜
- D. 甜、辣、苦、涩、咸
- E. 甜、辣、苦、酸、辛

答案

1、正确答案: D

答案解析: 器官移植术后 24 小时应给予严密监护。要求: 监护室居住, 专人护理; 24 小时仪器监护, 严密观察病情及生命体征变化; 严格执行各项诊疗及护理措施; 及时准确填写特护记录; 备齐抢救药品和物品; 做好基础护理, 防止并发症。

2、正确答案: D

答案解析: 该患者压疮为浅度溃疡期, 表现是水疱扩大、破溃形成溃疡, 创面局部感染。

3、正确答案: D

答案解析: 口腔感染有溃烂坏死组织者, 应用 1%~3% 过氧化氢溶液进行口腔护理, 答案选 D。

4、正确答案: C

答案解析: 临时备用医嘱未执行应在医嘱后用红笔注明“未用”两字。

5、正确答案: C

答案解析: $\text{输液时间 (小时)} = (\text{液体总量 (ml)} \times \text{点滴系数}) / (\text{每分钟滴数} \times 60 (\text{分钟})) = (500 \times 20) / (40 \times 60) \approx 4.2$

6、正确答案: D

答案解析： 【解析】低钾血症：血钾 $<3.5\text{mmol/L}$ ，主要表现为①神经肌肉兴奋性降低：精神不振、无力、腱反射减弱或消失，腹胀、肠鸣音减弱或消失；②心脏损害：心音低钝，心律失常，心电图出现U波等。

7、正确答案：E

答案解析： 消化性溃疡的并发症：幽门梗阻：以“痛、呕、胀”为主，严重呕吐可致失水或低氯、低钾性碱中毒，大量呕吐后症状可暂缓解，呕吐物含发酵酸性宿食，不含胆汁。

8、正确答案：A

答案解析： 对于流行性腮腺炎的病人应给予富含营养、易消化的半流食或软食。忌食酸、辣、硬而干燥的食物，以免引起唾液分泌增多，肿痛加剧。

9、正确答案：D

答案解析： 患者近一年来发现HBsAg阳性，但无肝功能异常表现，且无既往病史，所以患者属于HBsAg携带者。

10、正确答案：D

答案解析： 提示：食用含维生素C的食品，有利于铁吸收。另外，餐后不要即刻饮浓茶、牛奶、咖啡因为茶叶中含鞣酸，与铁结合后形成沉淀物质，牛奶中含磷较高，均影响铁的吸收。

11、正确答案：C

答案解析： 喉上神经外支损伤会使环甲肌瘫痪，引起声带松弛、音调降低，内支损伤则使喉部黏膜感觉丧失，容易出现误咽、呛咳。

12、正确答案：C

答案解析： 幽门螺杆菌引起的慢性胃炎常联合治疗。

13、正确答案：B

答案解析： 患者为典型的急性胰腺炎的表现，出现Grey-Turner征(+)提示出血坏死。

14、正确答案：D

答案解析： 提示：患者出现体温下降有升高，白细胞升高，提示病情加重，需密切观察加强监护。

15、正确答案：C

答案解析： 面部及颈部手术后采取半坐卧位可减轻头颈部充血，减少伤口局部出血。

16、正确答案：B

答案解析： 提示：出现下列情况时应考虑中毒型肺炎：①出现精神症状。②体温不升或过高。③心率 >140 次/分。④血压逐步下降或降至正常以下。⑤脉搏细弱，四肢厥冷，血压下降、冷汗多、发绀，一般情况差。⑥白细胞过高($>3.0 \times 10^9/L$)或过低($<4 \times 10^9/L$)

17、正确答案：E

答案解析： 提示：患肺处于高位，引流支气管口朝下。患者病变部位为左肺，右侧卧位，床脚抬高30~50cm。

18、正确答案：E

答案解析： 提示：COPD的体征有桶状胸，语音震颤减弱或消失，叩诊过清音，呼吸音减弱，呼气时间延长，心音遥远，感染时可有湿罗音。

19、正确答案：C

答案解析： 易感人群接触水痘病人后应隔离三周。

20、正确答案：A

答案解析： A

21、正确答案：C

答案解析：【解析】四肢青紫计 1 分，四肢伸展计 1 分，呼吸不规则计 1 分，心率 80 次/分计 1 分，喉反射消失计 0 分。Apgar 评分为 4 分。

22、正确答案：A

答案解析：提示：喷洒农药中毒者应立即脱离现场，脱去污染衣服，用肥皂水冲洗皮肤、眼睛，口服中毒者要用清水、生理盐水、2%碳酸氢钠(敌百虫禁用)或 1:5000 高锰酸钾溶液(1605 禁用)反复洗胃。

23、正确答案：E

答案解析：提示：桡骨远端骨折的临床表现：局部疼痛、肿胀、压痛、功能障碍，典型畸形表现是侧面可见“银叉样”畸形，正面见“枪刺样”畸形。

24、正确答案：C

答案解析：提示：肱骨髁上骨折和肘关节脱位主要的表现是肘后三角关系失常。

25、正确答案：E

答案解析：提示：在使用抗生素之前或停用抗生素 5 天后留取标本。

26、正确答案：D

答案解析：提示：滴虫性阴道炎典型的症状是稀薄泡沫状的分泌物增多及外阴瘙痒，分泌物可呈现脓性、黄绿色，有臭味，瘙痒部位主要为阴道口及外阴，间或有灼热、疼痛、性交痛等。

27、正确答案：C

答案解析：提示：急性宫颈炎给予全身抗生素治疗，同时禁止性生活；慢性宫颈炎以局部治疗为主，可采用物理治疗、药物治疗及手术治疗，以物理治疗最常用且疗效最稳定。进行治疗前需先排除早期宫颈癌。

28、正确答案：E

答案解析：提示：有波动感证明已经出现了脓肿。处理及时做脓肿切开引流，切口呈放射状至乳晕处，乳晕部脓肿可沿乳晕边缘做弧形切口。

29、正确答案：E

答案解析：提示：胰体部癌则以腹痛为主要症状，晚期癌浸润神经丛，使腹痛加剧，日夜不止。

30、正确答案：E

答案解析：提示：胸透发现手术侧胸腔积液提示为食管吻合口瘘。

31、正确答案：B

答案解析：提示：血小板计数 $15 \times 10^9/L$ ，提示血小板低。因预防出血，特别是脑出血。血小板计数 20 乘以 10 的 9 次方每升，出血严重者，应输浓缩血小板悬液或新鲜血；。

32、正确答案：D

答案解析：提示：1. 超声检查：了解肌瘤大小、生长部位，数量及血流有无变性。2. 宫腔镜检查：观察黏膜下肌瘤的大小、位置。3. 腹腔镜检查：观察肌壁间肌瘤和浆膜下肌瘤的大小、位置。

33、正确答案：E

答案解析：提示：甲状腺癌的护理措施：喉返神经损伤主要是手术时损伤所致，少数由于有血肿或瘢痕组织压迫或牵拉引起。一侧喉返神经损伤，引起声音嘶哑，可由健侧声带代偿性地向患侧过渡内收而恢复发音；两侧喉返神经损伤则导致两侧声带麻痹，引起失声、呼吸困难，引起窒息，多需立即气管切开。

34、正确答案：A

答案解析：磺脲类：如格列本脲、格列齐特等，其作用机制为直接刺激胰岛 B 细胞释放胰岛素，适用于轻中度 II 型糖尿病、尚有一定残存胰岛功能者，饭前半小时口服，主要不良反应是低血糖，其次是体重增加。

35、正确答案：E

答案解析：无

36、正确答案：C

答案解析：医务人员发生艾滋病病毒职业暴露后，应当立即实施以下局部处理措施：1)用肥皂液和流动水清洗污染的皮肤，用生理盐水冲洗粘膜。2)如有伤口，应当在伤口旁端轻轻挤压，尽可能挤出损伤处的血液，再用肥皂液和流动水进行冲洗（E错误）；禁止进行伤口的局部挤压。3)受伤部位的伤口冲洗后，应当用消毒液，如：75%酒精或者0.5%碘伏进行消毒，并包扎伤口；被暴露的粘膜，应当反复用生理盐水冲洗干净。

37、正确答案：E

答案解析：在心律失常中，脉有间歇之多见者，包括早搏、房颤、房室传导阻滞（II度）和病窦等

38、正确答案：B

答案解析：剧毒药及麻醉药，不同于其他药物，其副作用很大，会直接危及患者的生命，因此其最主要的保管原则是加锁保管，用专本登记，专人管理并列入交班的内容，以确保用药安全。

39、正确答案：D

答案解析：静脉补钾应注意以下事项：①尿量：尿量要在40 mL/h以上；②浓度：氯化钾浓度一般不超过0.3%；③速度不可过快，成人不超过60滴/分；④总量：严重缺钾者，不宜超过6~8 g/d。

40、正确答案：E

答案解析：心慌、气短、乏力均为患者的主观感受为主观资料。

41、正确答案：C

答案解析：【解析】膝胸卧位适用范围主要有四种情况：矫正子宫后倾或胎位不正；促进产后子宫复原；肛门、直肠及乙状结肠镜检查和治疗；法洛四联症患者缺氧发作时。

42、正确答案：D

答案解析：【解析】稽留热体温在39℃以上，昼夜间体温变动范围较小，24小时内波动幅度不超过1℃。常见于伤寒、肺炎链球菌肺炎、大叶性肺炎等疾病。

43、正确答案：C

答案解析：【解析】低脂肪饮食适用于肝、胆、胰疾病的病人，以及高脂血症、动脉粥样硬化、冠心病、肥胖症和腹泻病人。

44、正确答案：C

答案解析：【解析】检查前1日中午进食高脂肪餐，以刺激胆囊收缩和排空；晚餐进食无脂肪、低蛋白、高碳水化合物清淡饮食；晚餐后服造影剂，服药后禁食、禁水、禁烟至次日上午；检查当日早晨禁食；第一次摄X线片后，如胆囊显影良好，进食高脂肪餐，半小时后第二次摄X线片观察。

45、正确答案：B

答案解析：急性肺水肿应给予高流量氧气吸入，并在湿化瓶内加入30%的酒精，以提高肺泡内氧分压，降低肺泡内泡沫的表面张力，增加氧的弥散，改善低氧血症。

46、正确答案：B

答案解析：甲醛用于尿液艾迪计数；浓盐酸用于测定17-羟类固醇、17-羟类固醇；甲苯用于尿蛋白、尿糖、肌酐等定量检查。

47、正确答案：B

答案解析：此时应鼓励患者自我表达，宣泄情绪

48、正确答案：C

答案解析：第一种：回抽胃液。将胃管插入后，用无菌注射器接于导管末端回抽，看是否可抽出胃液。第二种：将导管末端放入盛有凉开水或生理盐水的碗中，看有无气泡溢出。第三种：听气过水声。用无菌注射器注入10-20ml空气于胃管内，将听诊器放在病人上腹部，听有无气过水声。

49、正确答案：E

答案解析：硝苯地平的主要副作用有颜面潮红、头痛，长期服用硝苯地平可出现胫前水肿。

50、正确答案：C

答案解析：P-R 间期的测量是从 P 波起始到 QRS 波的开始

51、正确答案：B

答案解析：【解析】右心衰体征为水肿、颈静脉怒张、肝颈静脉回流征阳性、肝大、发绀。

52、正确答案：D

答案解析：【解析】3 岁。出生 4 个月开始出现症状，发育比同龄儿童差，平时经常感冒符合先心病发病时间及表现；发绀说明是青紫型先心病，即法洛四联症；而心前区 2~4 肋间可闻及收缩期喷射样杂音，X 线示右心室增大是法洛四联症的表现。

53、正确答案：D

答案解析：C：胸外按压；A：气道开放；B：人工呼吸。

54、正确答案：A

答案解析：【解析】二尖瓣狭窄患者往往伴有房颤，房颤时缺乏心房有效收缩，血液淤积于右心房，易致血栓形成，增加卒中的危险性。

55、正确答案：D

答案解析：法洛四联症患儿喜蹲踞，适合采取膝胸位缓解缺氧。

56、正确答案：B

答案解析：【解析】急性心肌梗死的基本病因是冠状动脉粥样硬化，造成管腔严重狭窄和心肌供血不足，但侧支循环未及时充分建立。发病机制可因冠状动脉粥样斑块破溃、出血、管腔内血栓形成，使冠状动脉完全堵塞；或冠状动脉粥样斑块内或其下出血、血管持续痉挛，致冠状动脉完全闭塞。使心肌严重而持久的急性缺血发生急性心肌梗死。因此其主要病理改变是冠状动脉堵塞。

57、正确答案：B

答案解析：患者为急性肺水肿病人，此时重要的是强心、利尿和扩血管。强心药应选用静脉给予的西地兰，扩血管药物应给予可同时扩张动、静脉血管的药物硝普钠，利尿剂应选用呋塞米。

58、正确答案：A

答案解析：【解析】①二尖瓣狭窄：心尖部舒张期隆隆样杂音；②二尖瓣关闭不全：心尖区全收缩期粗糙、吹风样杂音；③主动脉瓣狭窄：主动脉瓣区响亮、粗糙的收缩期吹风样杂音；④主动脉瓣关闭不全：第二主动脉瓣区舒张早期叹气样杂音。

59、正确答案：B

答案解析：【解析】充血性心力衰竭是风湿性心脏病最常见的并发症，是致死的主要原因。

60、正确答案：C

答案解析：急性心包炎是心包疾病最常见的一种，早期表现为心包脏层和壁层的炎症反应，出现含有纤维蛋白沉积和多核白细胞聚集组成的黏稠液体，称为纤维蛋白性心包炎。随病程进展，渗出液增加，以后出现量多少不等的心包积液，后期可完全吸收，亦可能机化或钙化发展成为缩窄性心包炎(根据病因不同而异)。因此早期的主要症状是胸痛，主要体征是心包摩擦音，而到以后因大量心包积液出现而发生呼吸困难和心包积液的体征，心包摩擦音则消失。

61、正确答案：E

答案解析：靴型心是主动脉型心影，是指左心室扩大时胸片上表现为心尖圆隆下移。可见于主动脉瓣狭窄、主动脉瓣关闭不全、高血压、法洛四联症。

62、正确答案：A

答案解析：奥美拉唑属质子泵抑制剂，是目前治疗慢性胃炎和消化性溃疡抑制胃酸作用最强、止痛效果最好的药物。

63、正确答案：C

答案解析：与血浆渗透压相等的液体为等渗液，即为1张液，生理盐水的渗透压与血浆渗透压相等，属于1张液；葡萄糖溶液进入人体后很快被氧化分解，属于0张液；1.4%碳酸氢钠渗透压与血浆渗透压相当，也是1张液。按照题意2份生理盐水、3份10%葡萄糖、1份1.4%碳酸氢钠所组成的溶液是2:3:1液，总共2+3+1=6份液体，其中的3份为1张液，混合后得到的液体 $\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$ 张液。

64、正确答案：C

答案解析：小儿肠套叠三大表现：腹痛、果酱样血便、腊肠样腹部包块。

65、正确答案：A

答案解析：胃大部切除术包括毕I式和毕II式两种。①胃溃疡患者首选毕I式——胃大部切除+胃、十二指肠吻合；②十二指肠溃疡患者首选毕II式——胃大部切除+胃、近端空肠吻合+十二指肠残端缝闭。

66、正确答案：D

答案解析：【解析】消化道疾病术后1~3天，最重要的是观察①有无内出血（血压、脉搏）；②引流情况（引流管是否通畅，引流液的颜色、性状和量）。

67、正确答案：C

答案解析：早期倾倒综合征多于术后1~3周开始进食时发生，症状出现在餐后1小时之内，而禁食状态下则无症状出现，流质以及富含糖类的食物尤其不易耐受，症状的程度轻重不同，临床症状可分为全身性躯体症状和胃肠道症状。全身性躯体症状：头晕、心悸、心动过速、极度软弱、大量出汗、颤抖、面色苍白或潮红，重者有血压下降、晕厥；胃肠道症状：上腹部温热感、饱胀不适、恶心、呕吐、暖气、肠鸣、腹泻，有时有排便急迫感。通常持续1小时左右可自行缓解，餐后平卧可避免发作。重症患者可因惧怕进食而体重下降，常有营养不良的表现。

68、正确答案：E

答案解析：无

69、正确答案：C

答案解析：【解析】本病例为肝硬化门脉高压、食管胃底静脉曲张破裂引起的上消化道大出血，对这类出血量大、易反复，最有效的止血措施依次为：内镜止血→三腔二囊管压迫止血→手术。药物是配合措施，首选药物为生长抑素（静脉点滴）。

70、正确答案：B

答案解析：①肝外胆管结石/急性胆管炎(轻型)：夏克三联征——腹痛、寒战高热、黄疸。②急性梗阻性化脓性胆管炎：雷诺儿五联征——夏克三联征+休克+意识障碍。（注意：胆管炎的黄疸为梗阻性黄疸，休克类型为感染性休克）。

71、正确答案：D

答案解析：①依据以下指标判断脱水程度观察指标轻度中度重度精神状态稍差略烦躁烦躁或萎靡昏睡甚至昏迷皮肤弹性稍差差极差口腔黏膜稍干燥干燥极干燥眼窝、前囟稍凹陷深凹陷眼睑不能闭合眼泪有少无尿量稍少少无休克无有有②依据血钠浓度判断脱水性质低渗性等渗性高渗性血钠(mmol/L)<130130~150>150③依据以下指标判断血容量恢复脱水基本纠正①皮肤弹性及前囟眼窝凹陷恢复；②输液3-4h开始排尿。

72、正确答案：E

答案解析：鹅口疮是常见的口炎类型，多发生于婴幼儿或长期大量应用糖皮质激素/广谱抗生素的患者，临床表现为口腔黏膜白色乳凝块样物，强行擦拭易出血。鹅口疮的病原体是真菌(白色念珠菌)，可于餐后1小时用1%~4%碳酸氢钠溶液清洁口腔，每日2~4次，局部涂抹制霉菌素鱼肝油混悬液，每日2~3次，涂抹前擦净口腔内唾液，涂抹后闭口10分钟。

73、正确答案：D

答案解析：青霉素治疗3天无效，发热40℃，双肺大片状阴影提示金黄色葡萄球菌肺炎。

74、正确答案：A

答案解析：拔管时取半卧位或坐在床沿，鼓励患者咳嗽，挤压引流管后夹闭，嘱患者深吸一口气后屏住再拔管。

75、正确答案：E

答案解析：小儿咽鼓管宽、短、直，呈水平位，鼻咽炎易并发中耳炎

76、正确答案：C

答案解析：右侧肺气肿、气胸以及胸腔积液都可以把气管向左侧推移，右侧胸廓饱满，触诊语颤减弱，叩诊浊音提示为胸腔积液。

77、正确答案：C

答案解析：胸膜摩擦音为胸膜炎的体征。

78、正确答案：B

答案解析：胸壁有一约3 cm长伤口，呼吸时伤口处有气体进出，提示胸腔与外界相通，为开放性气胸。

79、正确答案：B

答案解析：糖皮质激素：控制哮喘最有效的抗炎药物。主要通过抑制气道变应性炎症，降低气道高反应性。

80、正确答案：B

答案解析：出疹前5天至出疹后5天均有传染性，如合并肺炎，传染性可延长至出疹后10天。

81、正确答案：B

答案解析：患儿误服农药时间不长，清醒、能主动配合，催吐法适用。洗胃主要用于催吐无效，有意识障碍、不合作者。灌肠用于服毒6 h以上。

82、正确答案：E

答案解析：急性有机磷中毒使用阿托品治疗时，出现“阿托品化”，即瞳孔较前扩大，颜面潮红、口干、皮肤干燥、肺部湿啰音减少或消失、心率加快等，应减少阿托品剂量或停药。

83、正确答案：B

答案解析：氟马西尼是苯二氮类药物竞争性拮抗剂。氟马西尼的主要作用机制是与苯二氮受体结合拮抗苯二氮类药物的效应。

84、正确答案：A

答案解析：【解析】长期酗酒可发生Wernicke脑病：眼部可见眼球震颤、外直肌麻痹，有类似小脑变性的共济失调和步态不稳。

85、正确答案：B

答案解析：热衰竭，又称中暑衰竭，是最常见的中暑类型。大量出汗导致失水、失钠，血容量不足而引起循环衰竭为主，体温基本正常。

86、正确答案：D

答案解析：烧伤根据病理生理特点，病程大致分为3期：①急性体液渗出期（休克期）：伤后48小时内易出现低血容量性休克。②感染期：创面从渗出转为吸收，创面毒素和坏死组织分解产物被吸收入血，引起中毒。③修复期：深Ⅱ度烧伤无并发症，约3~4周愈合，留有瘢痕；Ⅲ度烧伤或严重感染的深Ⅱ度烧伤需进行皮肤移植修，复留有瘢痕。

87、正确答案：C

答案解析： $3+13+(5+6+7)\times 1/2+6+3=34$ ，女性臀部为6%，一个手掌面积约为1%。

88、正确答案：A

答案解析：局部冷敷→血管收缩→毒素吸收减少。

89、正确答案：C

答案解析：破伤风杆菌→产生外毒素（痉挛毒素和溶血毒素）致病。痉挛毒素引起症状和体征的主要毒素：①运动神经元兴奋性增强→全身横纹肌持续性收缩或阵发性痉挛；②交感神经兴奋→血压升高、心率加快、体温升高、出汗。溶血毒素可引起局部组织坏死（加重伤口局部的无氧环境）和心肌损害。

90、正确答案：E

答案解析：多根、多处肋骨骨折因局部胸壁失去完整肋骨的支撑而软化，产生反常呼吸运动：即吸气时，软化区的胸壁内陷；呼气时，该区胸壁向外鼓出；此类胸廓称为连枷胸。

91、正确答案：D

答案解析：子宫脱垂分三度，I度轻型：宫颈外口距离处女膜缘小于4cm，但未达处女膜缘；I度重型：宫颈已达处女膜缘，但未超出，检查时在阴道口可见宫颈；II度轻型：宫颈已脱出阴道口，但宫体仍在阴道内；II度重型：宫颈和部分宫体已脱出阴道口；III度宫颈和宫体全部脱出阴道口外。

92、正确答案：A

答案解析：急性再障早期即可出现出血、感染。

93、正确答案：E

答案解析：

94、正确答案：B

答案解析：Graves病是甲亢中最常见的类型，约占全部甲亢的80%~85%。

95、正确答案：E

答案解析：单纯性甲状腺肿是机体缺碘、存在致甲状腺肿物质，以及甲状腺激素合成酶缺陷而引起代偿性甲状腺增生肿大，一般无甲状腺功能异常，所以本题T₃、T₄和TSH都是正常的。；

96、正确答案：A

答案解析：饮食治疗和合适的体育锻炼

97、正确答案：E

答案解析：针头与皮肤成90°角

98、正确答案：E

答案解析：

99、正确答案：E

答案解析：现场急救止血和止痛，防止休克。创面用无菌敷料覆盖后加压包扎，并将断脱的头皮不做任何处理用无菌敷料包好隔水低温保存。

100、正确答案：A

答案解析：硬膜外血肿典型的意识障碍是伤后昏迷有“中间清醒”，即昏迷—清醒—再昏迷。

101、正确答案：E

答案解析：迅速有效地止痛是治疗的关键，首选药物治疗，首选的药物是卡马西平。

102、正确答案：D

答案解析：静止性震颤、肌强直、运动减少和体位不稳为帕金森病的主要特征，其中最典型的症状是静止性震颤。

103、正确答案：D

答案解析：【解析】病毒性脑膜炎颅内压稍高，应抬高床头15~30°，利于静脉回流，以降低颅内压。

104、正确答案：E

答案解析：宫内节育器放置和取出的时间都是月经干净后3~7天。

105、正确答案：E

答案解析：未病先防，即病防变。这是中国医学《黄帝内经》提出的预防思想，原文是：“夫圣人不可不治已病治未病，不治已乱治未乱；夫病已成而后药之，乱已成而后治之，譬犹渴而穿井，斗而铸锤，岂不晚乎？”一代医圣张仲景在《伤寒杂病论》中说：“见肝之病知肝传脾，当先实脾，四季脾旺不受邪。”这都是中国最早的预防思想。《内经》上说：正气内存，邪不可干，邪之所凑，其气必虚。是说人只所以得病内因是主要的，外因只是诱发条件。所以我们要内强素质，保持安泰的心情，平时多注意锻炼身体，疾病就很难入侵。

106、正确答案：D

答案解析：因故被吊销护士执业证书后，不得申请执业注册的年限是2年

107、正确答案：D

答案解析：护士首次执业注册应当自通过护士执业资格考试之日起3年内提出执业注册申请。

108、正确答案：B

答案解析：护士有保护患者隐私的义务，患者有个人隐私和个人尊严被保护的权力。病人有权要求对其医疗计划，包括病例讨论、会诊、检查和治疗都应审慎处理，不允许未经同意而泄露，不允许任意将病人姓名、身体状况、私人事务公开，更不能与其他不相关人员讨论病人的病情和治疗，否则就是侵害公民名誉权，受到法律的制裁。

109、正确答案：B

答案解析：角色行为缺如指没有进入角色，不承认自己是病人；角色行为冲突指因为与其他角色矛盾无法进入病人角色；角色行为强化指安于角色，无法脱离；角色行为消退指已经适应病人角色，因为其他角色需求，不得不终止病人角色。

110、正确答案：C

答案解析：医院是救死扶伤、实行人道主义的场所。医院需要保持一定的秩序。病人应该自觉维护医院秩序，包括安静、清洁、保证正常的医疗活动以及医院财产不受损坏。

111、正确答案：D

答案解析：脑室引流的护理：①引流管应高于侧脑室平面10~15cm，有利于颅内静脉回流；②引流液每日不超过500mL；③引流时间一般为1~2周，开颅术后脑室引流不超过3~4天；④拔管前先行头颅CT检查，并夹住引流管1~2天，注意病人生命体征变化，拔管后要注意观察有无脑脊液漏出。

112、正确答案：B

答案解析：心功能II级为体力活动受到轻度的限制，休息时无自觉症状，但一般体力活动下可出现疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。

113、正确答案：E

答案解析：肥厚型心肌病患者出现胸痛是因为心肌收缩力增强所致，故应立即卧床休息。

114、正确答案：D

答案解析：使用排钾利尿剂后会导致血钾降低，加上病人往往会使用强心苷类正性肌力药物，故应特别观察血钾的变化。

115、正确答案：A

答案解析：绝大多数心力衰竭是以左心衰竭开始的。

116、正确答案：C

答案解析：病人出现急性左心衰表现，采取半坐卧位，双腿下垂，利用重力作用将部分血液滞留在下肢和盆腔，使静脉回心血量减少，从而减轻肺部淤血和心脏负担。

117、正确答案：C

答案解析：心室颤动发生时心电图表现为QRS波群与T波消失，呈现形状、频率、振幅高低各异，完全无规则的波浪状曲线。此时应该立即给予非同步直流电复律除颤，同时配合胸外心脏按压和口对口

人工呼吸，以及经静脉注射心肺复苏药物和抗心律失常药物等抢救措施。而同步电除颤适用于存在 R 波
的快速型心律失常的复律，而非心室颤动时应使用的除颤方式。

118、正确答案：D

答案解析： 本题重点考察三腔二囊管的护理：①插管后在床旁备剪刀，以防气囊破裂造成窒息时急用；②留管期间定期测气囊内压力，以防压力不足达不到止血目的或压力过高压迫组织引起坏死；③定期抽吸食管引流管和胃管，观察出血是否停止，并记录引流液的性状、颜色和量；④留管期间应定时放气，每 24 小时食管囊应放气 15~30 min，以解除胃底贲门压力，避免局部黏膜糜烂坏死；⑤保持插管侧鼻腔清洁湿润，可以每天用液状石蜡涂抹鼻腔；⑥3~4 天为限，若出血停止可考虑拔管，放气留管观察 24 小时后无出血者即可拔管。

119、正确答案：A

答案解析： 脑血栓形成发病后 6 小时内为最佳溶栓时机。

120、正确答案：A

答案解析： 所谓五味，是指药物有酸、苦、甘、辛、咸五种不同的味道，因而具有不同的治疗作用。

+ 微信 YK23543